I المستقيم

DÉFINITION

يعين المستقيم

نرمز إلى المستقيم بـ:

- حرف بين قوسين (C)، (P)، (A) ....
- الرمز دالتا (Δ).
- نقطتين (D_1)، (B_1)، (D_2)، (B_2) ... فنقول عندئذ مستقيمات.

DÉFINITION

المقاطعة

نقول عن نقطة أنها تنتمي إلى نفس المستقيم.

EXEMPLES

- النقطة B_2 و C_1 على استقامة واحدة لأنها تنتمي إلى المستقيم (D).
- النقطة B_1 و M_2 ليست على استقامة واحدة لأن M لا تنتمي إلى (D).



المستقيم هو خط مستقيم ليس لديه حدود من الجهتين.	
تصف المستقيم هو خط مستقيم يكون محدود من جهة واحدة فقط.	
قطعة المستقيم هو خط مستقيم محدود من طرفيه بحيث يمكن قياس طوله.	 طول القطعة $[AB]$ هو نكتب: $AB = 2,8\ cm$

1 الأوضاع النسبية لمستقيم

DÉFINITION

مستقيمان يكونان إما متقاطعان أو متوازيان

(أ) مستقيمان متقاطعان

متقاطعان غير متعامدان	المستقيمان المختلفان هما مستقيمان اثنان يشتركان في نقطة واحدة تسمى نقطة التقاطع.
متعامدان	يكون مستقيمان متعامدان إذا كانا متقاطعين ويحدثان زاوية قائمة.



(ب) مستقيمان متوازيان

المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان غير متقاطعين.	
ملاحظة: المستقيمان هما أيضا مستقيمان متوازيان	

A RETENIR

إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإن هذه المستقيمات متوازيان.

2 إنشاء مستقيم يشمل نقطة معلومة ويعامد مستقيم معلوم

MÉTHODE

يمكننا أن نستخدم الكوس أو المدور

• باستعمال الكوس

لتكن (X) مستقيم و A نقطة لا تنتمي إليه.	
نضع الكوس على المستقيم بحيث يشكل زاوية قائمة ويمر من A.	
نرسم المستقيم الذي يشمل النقطة A باستعمال الكوس.	
نتحصل على المستقيم (AB) الذي يعامد (X) في النقطة B. نقول (AB) هو المسافة بين A والمستقيم (X).	

• باستعمال المدور

نشئ القوس الأصغر من الدائرة التي مركزها A وتقطع المستقيم(X) في النقطتين B و C.	
نشئ القوس الأكبر من الدائرة التي مركزها النقطة B	
نشئ القوس الأزرق من الدائرة التي مركزها C بطبق قدمة المدور عليها والتي يقطع القوس الأخضر في نقطة نسميها M.	
نصل بين النقطتين A و M ونسمي المستقيم(Y) فنتحصل على: $(Y) \perp (X)$	

3 المستقيمين العموديين على نفس المستقيم

لقد تأكدنا سابقا أن المستقيمين العموديين على نفس المستقيم متوازيين، لدينا:

$(D_1) \perp (D)$

$(D_2) \perp (D)$

إذن $(D_1) \parallel (D_2)$

ملاحظة يمكن إنشاء مستقيمان متوازيان بإتباع هذه الخاصية، وذلك بإستعمال الكوس



3 كيفية إنشاء مستقيم يشمل نقطة معلومة و يوازي مستقيم معلوم باستعمال المدور

لتكن (X) مستقيم و A نقطة لا تنتمي إليه	
أولا نشئ قوس من الدائرة التي مركزها A بحيث يقطع المستقيم (X) في النقطة B	
نشئ قوسين الدائرة التي مركزها B بنفس قيمة المدور بحيث يقطع المستقيم(X) في النقطة C.	
نشئ قوس من الدائرة التي مركزها C بنفس قيمة المدور التي طبقت الدائرة التي مركزها A في نقطة نسميها M	
نصل بين النقطتين A و M فنحصل على المستقيم(Y) الذي يوازي (X) ويمر من النقطتين A و M. نكتب: $(Y) \parallel (X)$	

II المضلعات الخاصة

1 المثلثات

أنواع المثلثات

المثلث القائم	المثلث الذي هو أحد مثلثاته الثلاثة زاوية قائمة. أوتر هو الضلع في المثلث المقابل للزاوية القائمة.	BC>AC>AB
المثلث متساوي الساقين	المثلث متساوي الساقين هو المثلث الذي يكون له ضلعان لهما نفس الطول. A هو رأس الأساسي. $AB = AC$ و AC و AB هما الضلعان المتقايسان.	
المثلث المتقايس الأضلاع	المثلث المتقايس الأضلاع هو المثلث الذي طول أضلاعه متساوية أي لهم نفس الطول. $AB = AC = BC$ كل رأس يمثل رأسا لمثلث كل ضلع يمثل قاعدة	

2 الرباعيات

تميز بين شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع

شبه المنحرف	شبه المنحرف هو رباعي له ضلعان متقابلان متوازيان والضلعان الآخران متقاطعان غير متوازيان. $[AB]$ و $[DC]$ هما القاعدتان. $[AD]$ و $[BC]$ هما الضلعان المتقايسان.
متوازي الأضلاع	متوازي الأضلاع هو رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متساويا القياس متوازيان. $AB = DC$ $AD = BC$

3 أشباه المنحرف الخاصة

يوجد نوعين هما

شبه المنحرف القائم هو شبه منحرف حاملي ضلعيه المتقايسين عموديين على القاعدتين. $\widehat{BAD} = \widehat{ABC} = 90°$ $(AB) \perp (AD)$ $(AB) \perp (CB)$	
شبه منحرف متقايس الساقين هو شبه منحرف له ضلعان متقايسان $[AD]$ و $[BC]$ أحد قاعدتيه $[AB]$ والقاعدة الأخرى $[CD]$ هي قطعة المستقيم التي تحمل القاعدة $[AB]$ والضلعان المتقايسان.	

4 متوازيات الأضلاع الخاصة

المستطيل هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة. نلاحظ أن: $AB = CD$ $BC = DA$ $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$	
المربع هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان. نلاحظ أن: $AB = BC = CD = DA$ و: $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$	
المعين هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان. نلاحظ أن: $AB = BC = CD = DA$ $AC \perp BD$	

الأستاذة