
وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية سكيكدة

الفرض المحروس رقم :3 — متقن القل

المستوى : الثانية شعبة العلوم التجريبية — التاريخ : 2017/02/02

القسم : 2ع ت2 — **الأستاذ : بوالريش أحمد** — المدة: ساعة


لابراز العلاقة بين المبيضين والغدة النخامية نقدم لك المعطيات التالية :
تمثل الوثيقة (1) بنيات مبيضية ملاحظة بالمجهر خلال خلال دورة جنسية بـ 28 يوما.



الوثيقة1

1 – سم الاشكال الممثلة في الوثيقة (1).
2 – رتب هذه البنى وفق التسلسل الزمني لظهورها.

لدراسة تأثير المبيض على الغدة النخامية ، نجري سلسلة من التجارب على انثى قرد المكاك :
التجربة1 : نزع المبيضان
التجربة2 : حقن الاستيروجينات بتراكيز متزايدة ؛ الجرعات تبقى أقل من 300 pg/m .
($1pg = 10^{-9}$ g).
التجربة3 : حقن الاستيروجينات بجرعات أكبر من 300 pg/m.
التجربة4 : حقن البروجسترون.
التأثيرات على مستوى انتاج هرمون LH ممثلة في الوثيقة (2)
3- ماهي المعلومات المستخرجة من **تحليلك** لنتائج الوثيقة2 ؟



الوثيقة2

4 – بالاستعانة بالمعارف التي توصلت اليها ومعلوماتك المكتسبة ، **اكمل** الجدول التالي بعد نقله على ورقة إجابتك.

البنيات	نوع المراقبة الرجعية	التعليل
البنية F		
البنية G		
البنية C		

التصحيح

عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
1 – تسمية الاشكال الممثلة في الوثيقة1 : A: جريب ثانوي B: جريب أولي C: جسم أصفر D: جريب ابتدائي E: انفجار الجريب وتحرير البويضة F: جريب اجوف G: جريب دوغراف (ناضج)	7X0.5	3.5ن
2 – ترتيب البنيات المبيضية وفق التسلسل الزمني لظهورها : 1: B 2: D 3: A 4: F 5: G 6: E 7: C	7X0.5	3.5ن
3 – المعلومات المستخرجة من تحليل نتائج الوثيقة2 : **التحليل :** ➢ التجربة1 : استئصال المبيضان أدى إلى ارتفاع كبير في تركيز LH من القيمة 10ng/ml إلى قيمة قصوى تقدر بـ 50ng/ml. ➢ التجربة2 :الحقن المتزايد وبتراكيز منخفضة من الاستيروجينات أدى إلى انخفاض في تركيز LH المفرزة من القيمة 50ng/ml على قيمة دنيا تقدر بـ 10ng/ml. ➢ التجربة3 : الحقن المتزايد وبتراكيز مرتفعة من الاستيروجينات أدى إلى ارتفاع سريع في تركيز LH من القيمة 10ng/ml إلى قيمة قصوى تقدر بـ 60ng/ml. ➢ التجربة4 : حقن البروجستيرون أدى الى انخفاض افراز LH إلى أقل من 10ng/ml **المعلومات المستخرجة:** ➢ من التجربة1 :المبيض يمارس **مراقبة رجعية سلبية** على إفراز LH (كبح او تثبيط). ➢ من التجربة2 : التركيز الضعيفة من الاستيروجينات تمارس **مراقبة رجعية سلبية** على إفراز LH. ➢ من التجربة3 : التركيز المرتفعة من الاستيروجينات تمارس **مراقبة رجعية إيجابية** على إفراز LH. ➢ من التجربة4 : البروجيستيرون يمارس **مراقبة رجعية سلبية** على إفراز LH.	4X0.5 4X01	6ن
4 – تكملة الجدول : **البنية F** | مراقبة رجعية سلبية | افراز تراكيز ضعيفة من الاستيروجينات **البنية G** | مراقبة رجعية موجبة | افراز تراكيز مرتفعة من الاستيروجينات **البنية C** | مراقبة رجعية سلبية | افراز البروجيسترون	6X01	6ن