الأنشطة العدديــــــــــــة

• الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

1- القاسم المشترك الأكبر PGCD: توجد طرق عديدة من بينها

طريقة القسمة الإقليدية : وهي أحسن طريقة	**طريقة الطرح المتتالي :**
مثال : PGCD(15 ;10)=5 **5** **5**	**مثال :** PGCD(15 ;10)=5 **5 5**

2- العددان الأوليان فيما بينهما : هما عددان قاسمهما الأكبر يساوي 1 أي PGCD(a ;b)=1

3- الكسر الغير قابل للإختزال : هو الكسر الذي بسطه و مقامه أوليان فيما بينهما و للحصول عليه نقسم كل من البسط و المقام على PGCD

مثال : $\frac{10}{} = \frac{10 \div 5}{} = \frac{2}{}$ إذن الكسر $\frac{2}{}$ غير قابل للإختزال لأن PGCD(3 ;2)=1

4- كما انه يمكن إستعمال PGCD في بعض المسائل المقترحة (الكتاب المدرسي الصفحة 20)

• الحســـــــاب على الجذور

1- حل معادلة من الشكل $x^2 = b$: توجد ثلاثة حالات

- إذا كان $b > 0$ فإن للمعادلة $x^2 =$ حلين مختلفين هما $x = +\sqrt{b}$ و $x = -\sqrt{b}$.
- إذا كان $b = 0$ فإن للمعادلة حلا و حيدا هو 0 .
- إذا كان $b < 0$ في هذه الحالة ليس للمعادلة حل .

مثال :

حل المعادلة :	حل المعادلة :	حل المعادلة :
ومنه 4>0 إذن للمعادلة حلين مختلفين هما $+\sqrt{4}$ و $-\sqrt{4}$	إذن للمعادلة حل وحيد هو	و منه 4-<0 إذن المعادلة لا تقبل أي حل

2- خواص الجذور :

ليكن a و b أعداد طبيعية غير معدومة

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{\quad} \quad ، \quad \sqrt{-} = \frac{\sqrt{}}{\sqrt{b}} \quad ، \quad \sqrt{b} \qquad \sqrt{\quad}$$

ملاحظـــــات : $\sqrt{\quad} \quad \sqrt{} \quad \sqrt{}$ و $\sqrt{\quad} \quad \sqrt{} \quad \sqrt{}$

3- العمليات على الجذور : نأخذ بعض الأمثلة المختلفة لتبسيط الجذور

$\sqrt{175}$ $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{25} \quad \sqrt{}$ $5\sqrt{7}$	$\sqrt{\quad} \qquad \sqrt{28}$ $\sqrt{\quad} \qquad \sqrt{4\quad}$ $\sqrt{} \qquad \sqrt{7} + \sqrt{4} \times \sqrt{}$ $\sqrt{} \qquad 2\sqrt{7}$ $(5+2)\sqrt{7}$ $7\sqrt{7}$	$\sqrt{3}(\sqrt{3} \qquad \sqrt{2})$ $(5\sqrt{3} \times \sqrt{3}) - (5\sqrt{3} \times 2\sqrt{2})$ $(5 \times 3) \qquad (5 \times 2 \times \sqrt{3 \times 2})$ $10\sqrt{6}$	$(2\sqrt{5} + \sqrt{2})$ نستعمل المتطابقة الشهيرة 1 $(2\sqrt{5}) \quad + (2\sqrt{5} \times \sqrt{2}) + (\sqrt{2})$ $2\sqrt{5}$ $\sqrt{\quad}$ $2\sqrt{10}$

4- تنطيق مقام نسبة : (جعل مقام نسبة عدد ناطق)

الحالة 1: النسبة مقامها من الشكل $\sqrt{b}$ (حد واحد) إذن نضرب كل من البسط و المقام في $\sqrt{b}$ أي: $\frac{a\sqrt{b}}{} \quad \frac{\sqrt{}}{\sqrt{}\ \sqrt{}} \quad \frac{}{\sqrt{b}}$ **مثال :** $\frac{\sqrt{}}{} \quad \frac{5\sqrt{3}}{} \quad \frac{\sqrt{}}{2\sqrt{}\ \sqrt{}} \quad \frac{}{\sqrt{3}}$	**الحالة 2:** النسبة مقامها من الشكل $\sqrt{\quad}$ (حدين) إذن نضرب كل من البسط والمقام في المرافق وهو c $\sqrt{b}$ لتصبح المتطابقة الشهيرة 3 أي : $\frac{a\sqrt{b}-}{(\sqrt{b})} \quad \frac{\times(\sqrt{b}-c)}{(\sqrt{b}\quad c)\times(\sqrt{b}-c)} \quad \frac{}{\sqrt{b}}$ **مثال :** $\frac{\sqrt{}}{} \quad \frac{5\sqrt{2}}{} \quad \frac{5\sqrt{2}}{(\sqrt{2})} \quad \frac{\times(\sqrt{2}-3)}{(\sqrt{2}+3)\times(\sqrt{2}-3)} \quad \frac{}{\sqrt{2}}$

- ## الحساب الحرفي

1- نشر و تبسيط عبارات جبرية :

• **المتطابقات الشهيرة :** و هي	• **خاصية التوزيع :** و هي
• $(a+b)$ • $(a-b)$ • $(a+b)(a-b)$	• $a(c-b)$ • $(a+b)(c+d)$

نشر و تبسيط العبارة الجبرية

لنشر و تبسيط العبارة E نتبع الخطوات التالية:	**مثال :**
• معرفة عدد الحدود • نشر كل حد على حدى مع وضعها في أقواس • نزع الأقواس مع مراعات الإشارة • و في الأخير نتحصل على النتيجة	$(2x-3)^2-(2-x)(2x-3)$ $[(2x)^2-(2\times 2x\times 3)+(3)^2]-[(2\times 2x)-(2\times 3)-(x\times 2x)+(x\times 3)]$ $[4x \qquad 9]-[4x \qquad 3x]$

2- تحليل عبارة جبرية إلى جداء عاملين :

التحليل بإستعمال خاصية التوزيع :		**مثال :**
نتبع الخطوات التالية (إذا وجد العامل المشترك) • معرفة عدد الحدود • إستخراج العامل المشترك وكتابة مابقي بين قوسين • تبسيط ما بقي مع مراعات الإشارة	ac+ab=a(c+b)	$(2x \quad 3) \qquad (2 \quad x)(2x-3)$ $(2x \quad 3)[(2x \quad 3)-(2-x)]$ $(2x \quad 3)[2x \qquad x]$ $(2x \quad 3)(3x \quad 5)$ و في الأخير تحصلنا على جداء عاملين

المتطابقات الشهيرة :

التحليل بإستعمال المتطابقات الشهيرة:		**مثال :**
نتبع الخطوات التالية (إذا لم نجد العامل المشترك) • معرفة عدد الحدود • معرفة المعاملات a و b • تحديد المتطابقة المناسبة حسب عدد الحدود و الإشارة	$(a+b)$ $(a-b)$ $(a+b)(a-b)$	$(3x)$ المتطابقة 1 أي $b=2$ و و منه $(3x+2)$

مثال : تحليل عبارة جبرية بإستعمال المتطابقات و خاصية التوزيع

$$(2 \quad x)(2x \quad 3)$$
$$(2x) \qquad (3) \qquad (2 \quad x)(2x-3)$$
$$(2x \quad 3)(2x \quad 3) \qquad (2-x)(2x-3)$$
$$(2x \quad 3)[(2x \quad 3) \qquad (2-x)]$$
$$(2x \quad 3)[2x \qquad x]$$
$$(2x \quad 3)(3x \quad 1)$$

- ## المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

1- **حل معادلة** يعني إيجاد المجهول الذي يحقق المساوات $ax+b=0$ حلها هو —

2- **ترييض مسألة :** نتبع الخطوات التالية :

أ- قراءة المسألة و فهمها جيدا

ب- إختيار المجهول

ج- كتابتها على شكل معادلة

د- حل المعادلة و الإجابة عن السؤال

3- معادلة الجداء المعدوم :

من الشكل :	**مثال :**
$(ax+b)(cx+d)$ cx أو 0 و منه حلول المعادلة هي : $x=\frac{-d}{}$ و —	$2x(x+3)$ x أو 0 *و منه للمعادلة حلين مختلفين هما :* $x=-3$ و

• المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

1- كل عبارة من الشكل $; ax > b ;$ تسمى متراجحة من الدرجة لأولى بمجهول واحد

2- حل متراجحة يعني إيجاد مجموعة حلولها مع مراعات خواصها (إذا ضربنا أو قسمنا طرفي المتباينة بعدد سالب نقلب المتباينة)

3- تمثل مجموعة حلول المتراجحة على مستقيم مدرج مع مراعات الشروط

تمثيل حلول المتراجحة على مستقيم مدرج :	مثال: حل المتراجحة التالية :
	$-$ $-$ ومنه حلول المتراجحة هي القيم الأكبر من أو تساوي 3

• جملة معادلتين من الدرجة الأولى الأولى بمجهولين

1- جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجولين x و y هي جملة من الشكل $\{$

2- حل جملة معادلتين يعني إيجاد الثنائية $(x; y)$ التي تقق المعادلتين في آن واحد

3- لحل الجملة جبريا نتبع أحد الطرق :

I. طريقة التعويض

II. طريقة الجمع

III. طريقة الجمع و التعويض

4- أو يمكن حل لجملة بيانيا و ذلك بتمثيل المستقيمين و الحل هو حداثية نقطة التقاطع(x)

ب- طريقة التعويض :	مثال : طريقة الجمع و التعويض
نقوم بتعويض $y = 1$ في المعادلة (1) و منه حل الجملة هو الثنائية $(x;) = (-1; 1)$	$\{$ $\dots(1)$ $\dots(2)$ أ- طريقة الجمع: نضرب طرفي المعادلة (2) في 3 نحصل على $(-x + 2y)$ $\dots(3)$ نقوم بجمع كل من المعادلتين (1) و (3)

5- الحل البياني

التمثيل البياني :



مثال: حل الجملة بيانيا

$\{$ $\dots(1)$

$\dots(2)$

نكتب y بدلالة x كل من المعادلتين (1)و(2)

$\{$ $\dots(3)$

$-$ $-$ $\dots(4)$

نقوم برسم المستقيم ذو المعادلة (3)

-2	0	
-2	4	

$(0; 4); (- \quad 2)$

نقوم برسم المستقيم ذو المعادلة (4)

$-$ $-$

1	0	
2	1.5	

$(0 ; 1.5); (1 ; 2)$

و منه حل الجملة هي إحداثية نقطة التقاطع

$(x; y) = (- \quad 1)$

الأنشطة الهندسيــــــــــــــــــة

- **التذكير بخاصية التوازي : أو (التعامد)**

تستعمل للبرهان على التوازي أو التعامد

إذا كان لدينا : $\begin{matrix}(d)\perp(\Delta)\\(d)\perp(\Delta')\end{matrix}$ **فإن** $(\Delta) \parallel (\Delta')$	

نظرية طالس و العكسية لطالس

نظرية طالس: تستعمل لحساب الأطوال و شرطها الأساسي التوازي . **إذا كان** $(AC) \parallel (DE)$ **حسب طالس فإن النسب متساوية** — — —	**النظرية العكسية لطالس :** تستعمل للبرهان على التوازي **إذا كانت النقط** $C.B.D$ **و** $A.B.E$ **على نفس الترتيب و النسب متساوية** — — — **إذن حسب النظرية العكسية لطالس فإن المستقيمان** $(AC) \parallel (DE)$

تطبق النظرية على أحد الشكلين:





النسب المثلثية في المثلث القائم

نظرية فيثاغورس : شرطها المثلث قائم و تستعمل لحساب الأطوال

النظرية العكسية لفيثاغورس : تستعمل للبرهان على أن المثلث قائم

النسب المثلثية: تستعمل في المثلث القائم

ABC مثلث قائم في A **لديناً** $\sin \widehat{B} = —$ **أي المقابل لـ** $\widehat{B}$**على الوتر** — $\cos \widehat{B}$ **أي المجاور لـ** $\widehat{B}$ **على الوتر** $\tan \widehat{B} = —$ **أي المقابل لـ**$\widehat{B}$ **على المجاور لـ** $\widehat{B}$ **و تستعمل لحساب الأطوال و أقياس الزوايا المثلث**	

العلاقات بين النسب المثلثية

توجد علاقتين و هما ——— **و تستعمل لحساب النسب و أقياس الزوايا**	**مثال: حساب القيمة المضبوطة لـ$\sin \beta$ و** **إذا علمنا أن** – **نستعمل العلاقة الأولى** $(-)$ – – – $\sqrt{3}$	——— $\sqrt{\ }$ —— – $\sqrt{3}$ — $\sqrt{\ }$ – $\sqrt{3}$ **ومنه** $\sqrt{3}$ **و** $\sqrt{\ }$

● الأشعة و الإنسحاب :

مفهوم شعاع : الإنسحاب الذي A يحول B يعرف شعاعا *و نرمزله* بـ$\overrightarrow{AB}$ (منحى – طول –إتجاه)

تساوي شعاعين : يتساوى شعاعان إذا كان لهما نفس المنحى (التوازي) و نفس الطول و نفس الإتجاه

الشعاعان المتعاكسان : هما شعاعان لهما نفس المنحى ونفس الطول و يختلفان في الإتجاه

قراءة إحداثية شعاع : تكون وفق إزاحتين متتاليتين (أفقية و عمودية)

● المعالم :

الشعاعان المتساويان في المعلم : يعني انه لهما نفس الفاصلة و نفس الترتيبة أي

$\vec{V}(x_{\vec{v}}\ ;\ y_{\vec{v}})$ و $\vec{U}(x_{\vec{u}}\quad _{\vec{u}})$ متساويان إذن : $x_{\vec{u}} = x_{\vec{v}}$ و $_{\vec{u}} = y_{\vec{v}}$

إحداثية شعاع : ليكن و A نقطتان حيث $A(x_{\vec{A}}\quad y_{\vec{A}})$ و $B(x_{\vec{B}}\ ;\ y_{\vec{B}})$

إحداثية شعاع $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB}(x_{\vec{B}}\qquad _{\vec{A}}\quad y_{\vec{B}} - y_{\vec{A}})$	مثال : $A(-1\ ;\ 4)$ و $B(3\qquad 2)$ $\overrightarrow{AB}(\qquad(-1)\ ;\ -2-4\ )$ $\overrightarrow{AB}(3\qquad\qquad)$ $\overrightarrow{AB}(4\qquad)$
إحداثية C منتصف قطعة [AB] : $\left(\frac{x_{\vec{B}}\quad x_{\vec{A}}}{}\quad\frac{y_{\vec{B}}\quad y_{\vec{A}}}{}\right)$	مثال : $A(-1\ ;\ 4)$ و $B(3\qquad 2)$ $C\left(\frac{}{}\qquad\frac{}{}\right)$ $C(1\quad 1)$
المسافة بين نقطتين AB : $\sqrt{(x_{\vec{B}} - x_{\vec{A}})^2 + (y_{\vec{B}} - y_{\vec{A}})}$	مثال : $A(-1\ ;\ 4)$ و $B(3\qquad 2)$ $\sqrt{(3\quad(-1))\ +(-2-4)}$ $\sqrt{(4)^2+(-6)}$ $\sqrt{16}$ $\sqrt{\ }\qquad\sqrt{4}\qquad\sqrt{\ }$

● الــــــــدوران :

إنشاء صورة شكل بالدوران : يكون وفق مركز الدوران و زاوية الدوران و الإتجاه

علما أن الإتجاه **الموجب** يكون **عكس** عقارب الساعة

الزاوية المركزية و الزاوية المحيطية :

إذا كانت الزاوية المركزية و المحيطية يحصران نفس القوس $\widehat{AB}$: 1- تكون الزاوية المركزية ضعف المحيطية و نكتب $\widehat{AOC} = 2\widehat{ABC}$ 2- أو نقول أن الزاوية المحيطية نصف المركزية و نكتب $\widehat{ABC} = -\widehat{AOC}$	

ملاحظة : كل الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس لها نفس القيس

المضلعات المنتظمة : يتم إنشائها بالدوران الذي مركزه O و أي إتجاه تختار أما زاوية الدوران تختلف حسب نوع المظلع

أي إذا كان المضلع يتكون من n ضلع تكون الزاوية ——

• الهندسة في الفضاء

نتطرق في هذا الوحدة إلى قوانين المحيطات و المساحات و حجوم بعض الأشكال

1- المحيط و المساحة :

	المحيط P	المساحة A	ملاحظة
المربع			طول ضلع المربع
المستطيل	$(a+b)$		طول و عرض المستطيل a و
الدائرة و القرص			نصف القطر و
المثلث		——	أطوال المثلث a ; طول الإرتفاع المتعلق بالقاعدة
شبه المنحرف	مجموع أضلاعه	$\frac{(a+b)}{}$	طول القاعدة الصغرى a طول القاعدة الكبرى b الإرتفاع التعلق بالقاعدة

2- الحجم و المساحة الجانبية :

	الحجم	المساحة الجانبيةS	ملاحظة
المكعب			طول أحد الأضلاع
متوازي المستطيلات			محيط القاعدة (a + b)
الكرة و الجلة	–		نصف القطر و
المخروط	——	//////////	مساحة القاعدة
الهرم	——	////////////	مساحة القاعدة A حسب نوع القاعدة
الأسطوانة			مساحة القاعدة محيط القاعدة
الموشور القائم			محيط القاعدة P مساحة القاعدة A حسب نوع القاعدة


PARALLELEPIPEDE RECTANGLE
متوازي المستطيلات
h
L
ℓ
$\mathcal{V} = L \times \ell \times h$
CUBE
المكعب
c
$\mathcal{V} = c \times c \times c = c^3$
CYLINDRE DE REVOLUTION
الأسطوانة
h
PRISME DROIT
الموشور القائم
h
$\mathcal{V} = \mathcal{A}_{Base} \times h$


CONE DE REVOLUTION
مخروط دوراني
h
PYRAMIDE
الهرم
h
$\mathcal{V} = \frac{\mathcal{A}_{Base} \times h}{3}$
SPHERE-BOULE
الكرة
$\mathcal{A} = 4\pi r^2$
$\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi r^3$

ملاحظة : $\mathcal{A}_{Base}$ تعني مساحة القاعدة و تختلف حسب النوع (هرم ، مخروط ، أسطوانة ....)

أستاذ المادة : حمرالعين زكريا

الدوال و تنظيم المعطيات

الدالة الخطية و الدالة التآلفية

نصنفها في جدول

- **الدالة الخطية :** هي كل عبارة من الشكل

أو من الشكل $f(x) = ax$ حيث x هو العدد و ax هي الصورة

مثال 1: حساب صورة العدد 3 بالدالة $2x$

$f(x)$

إذن صورة العدد 3 بالدالة f هي -6

مثال 2: حساب العدد الذي صورته 2 بالدالة

إذن العدد الذي صورته 2 بالدالة f هو -1

- **تعيين دالة خطية:** يعني إيجاد العدد

أي $\frac{f(x)}{}$

مثال : إيجاد عبارة الدالة الخطية حيث – $f(3)$

حساب – – – $\frac{-}{-}$ $\frac{f(x)}{}$

ومنه عبارة الدالة هي – $f(x)$

ملاحظة : كل دالة خطية هي دالة تآلفية لأن 0

- **التمثيل البياني لدالة خطية :** هو عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ يكفي تعيين نقطة واحدة

مثال : تمثيل الدالة $f(x)$

1	0		العدد
1	0	$f(x)$	الصورة

- **الدالة التآلفية :** هي كل عبارة من الشكل

أو من الشكل $f(x)$ حيث x هو العدد و $f(x)$ هي الصورة

مثال 1 : حساب صورة العدد 3 بالدالة

$f(x)$

إذن صورة العدد 3 بالدالة f هي –

مثال 2 : حساب العدد الذي صورته 2 بالدالة

إذن العدد الذي صورته 2 بالدالة f هو -3

- **تعيين دالة تآلفية :** يعني إيجاد المعاملين

و

أي $a = \frac{f(x_1)-f(x_2)}{}$ و b بتعويض أحد الشرطين

مثال : إيجاد عبارة الدالة التآلفية حيث

$f(0)$ و $f(-1) = -2$

(-4)

بتعويض أحد الشرطين نجد

و منه عبارة الدالة هي 4 $f(x)$

- **التمثيل البياني لدالة التآلفية :** هو عبارة عن خط مستقيم لا يمر من المبدأ يكفي تعين نقطتين

مثال : تمثيل الدالة $g(x)$

1	0	
2	1	

ملاحظة : يمكن تعيين عبارة الدالة الخطية و التآلفية من البيان

- **الدالة الثابتة :** وهي من الشكل $f(x) = a$ و تمثيلها عبارة عن خط مستقيم يوازي محور الفواصل في النقطة
- **النسبة المؤوية:** حساب P% معناه —

زيادة x بـ P% معناه : $x\left(1 + —\right)$

تخفيض x بـ P% معناه: $x\left(1 - —\right)$

تنظيم المعطيات (الإحصاء)

- **التكرار المجمع الصاعد(المتزايد):** في سلسلة إحصائية التكرار المجمع الصاعد لقيمة يحصل عليه بجمع تكرار هذه القيمة و تكرار القيمة السابقة لها
- **التكرار المجمع النازل(المتناقص) :** في سلسلة إحصائية التكرار المجمع النازل لقيمة يحصل عليه بجمع تكرار هذه القيمة و تكرار القيمة الأكبر منها
- **التكرار النسبي المجمع الصاعد و النازل : (التواتر)**

$\frac{\text{التكرار}}{\text{التكرار الكلي}}$ التواتر

$\frac{\text{التكرار المجمع الصاعد}}{\text{التكرار الكلي}}$ التواتر المجمع الصاعد

$\frac{\text{التكرار المجمع النازل}}{\text{التكرار الكلي}}$ التواتر المجمع النازل

- الوسط الحسابي لسلسلة :

الوسط الحسابي لسلسلة إحصائية هو مجموع قيم هذه السلسلة على عدد قيمها

الوسط الحسابي المتوازن لسلسلة إحصائية هو مجموع جداء القيمة بتكرارها على مجموع معاملات التكرار

مثال: $\sqrt{3}$

المجموع	8	7	6	5	3	2	1	0	القيمة X
13	2	2	1	2	1	1	1	3	تكرارها

الوسط الحسابي ———————— —

الوسط الحسابي المتوازن $\frac{(0 \times 3) + (1 \times 1) + (2 \times 1) + (3 \times 1) + (5 \times 2) + (6 \times 1) + (7 \times 2) + (8 \times 2)}{}$ —

- الوسيط : في سلسلة إحصائية مرتبة

إذا كان عدد قيم هذه السلسلة فردي الوسيط هو القيمة التي تتوسط السلسلة .

إذا كان عدد قيم هذه السلسلة زوجي نجمع القيمتين التي في الوسط ثم نقسم على 2

إذا كانت السلسلة مجمعة في فئات نبحث عن الفئة التي تنتمي إليها الفئة الوسيطية

مثال: فردي : 1.1.2.2.**3**.5.6.6.8 إذن الوسيط هو 3

زوجي : 1.1.2.**2**.**3**.5.6.6 إذن الوسيط هو —

- **المدى :** هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة مثال :
- **المنوال :** هي القيمة التي يقابلها أكبر تكرار

مثال شامل : $\sqrt{3}$

المجموع	8	7	6	5	3	2	1	0	القيمة
13	2	2	1	2	1	1	1	3	التكرار
//////	13	11	9	8	6	5	4	3	التكرار المجمع الصاعد
///////	2	4	5	7	8	9	10	13	التكرار المجمع النازل
—	—	—	—	—	—	—	—	—	التواتر
////////	—	—	—	—	—	—	—	—	التواتر المجمع الصاعد
//////////	—	—	—	—	—	—	—	—	التواتر المجمع النازل

المنوال : هو 0

التذكير بالكتابة العلمية:

الكتابة العلمية: هي كل كتابة من الشكل $a \times 10^{p}$ حيث p عدد نسبي صحيح و a عدد عشري مكتوب برقم واحد قبل الفاصلة غير معدوم مثال :	مثال : ———————— ———————— ——

التدوير إلى الوحدة : إذا كان الرقم الأول بعد الفاصلة أقل تماما من 5 نأخذ الجزء الصحيح فقط و إذا كان الرقم الأول بعد الفاصلة أكبر من أو يساوي 5 نأخذ الجزء الصحيح و نضيف إليه 1 مثال: أو

{مع تمنيات أستاذ المادة لكم بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط راجين من الله عز وجل تقبل سائر أعمالنا}