

4.2 Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine *schiefssymmetrische* Matrix, d.h. $A^T = -A$. Zeige, dass A nicht invertierbar ist. Gilt dies auch für gerade n ? Gib einen Beweis oder ein Gegenbeispiel an.

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} & A^T = -A \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow a_{jk} = -a_{kj} \\ &\Rightarrow (m \in \mathbb{N}; m \leq n) : a_{mm} = -a_{mm} \Rightarrow a_{mm} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{n1} \\ -a_{12} & 0 & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Für n ungerade:

Für n gerade (Gegenbeispiel):

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

4.3 (a) Berechne

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n-1 & n-1 \\ 1 & 2 & \dots & n-1 & n \end{vmatrix}$$

(b) Finde Matrizen A, B , so dass $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

4.4 Berechne die *Vandermonde-Determinante*

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

für $n \in \mathbb{N}$ und $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$.

4.5 Berechne das charakteristische Polynom, die Eigenwerte und Eigenvektoren von

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & -6 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

A:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda E) \\ &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 3 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 2 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} + (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= -2 + 2\lambda - 6 + (2-\lambda)((2-\lambda)(1-\lambda) - 6) + 4 - 2\lambda + 4 \\ &= -4\lambda + (-4-\lambda)(2-3\lambda+\lambda^2) \\ &= -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 2\lambda - 8 \\ \Rightarrow \lambda_1 &= -1, \\ \lambda_2 &= 2, \\ \lambda_3 &= 4 \end{aligned}$$

$$\text{Eig}(A, \lambda) := (A - \lambda E_n)x = 0$$

$\text{Eig}(A, \lambda_1):$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\text{Eig}(A, \lambda_2):$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\text{Eig}(A, \lambda_3):$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gauß-Algorithmus:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} & \Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} \right\} & \Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Eig}(A, \lambda) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} \right\}$$

B:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda E) \\ &= \begin{vmatrix} -5 - \lambda & 0 & 7 \\ 6 & 2 - \lambda & -6 \\ -4 & 0 & 6 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda) \begin{vmatrix} -5 - \lambda & 7 \\ -4 & 6 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(-\lambda^2 + \lambda + 2) \\ \Rightarrow \lambda_1 &= \lambda_2 = 2, \\ \lambda_3 &= -1 \end{aligned}$$

$$\text{Eig}(A, \lambda) := (A - \lambda E_n)x = 0$$

$$\text{Eig}(A, \lambda_1) = \text{Eig}(A, \lambda_2):$$

$$\begin{pmatrix} -7 & 0 & 7 \\ 6 & 0 & -6 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Eig}(A, \lambda_3):$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & 7 \\ 6 & 3 & -6 \\ -4 & 0 & 7 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \right\}$$