

2.5 Bestimme die reellen Lösungen der Gleichungen

(a) $\sqrt{x+1} - \sqrt{9-x} = \sqrt{2x-12}$

$$\begin{aligned} & \sqrt{x+1} - \sqrt{9-x} = \sqrt{2x-12} && |^2 \\ \Leftrightarrow & (\sqrt{x+1} - \sqrt{9-x})^2 = 2x-12 \\ \Leftrightarrow & (x+1) - 2\sqrt{x+1}\sqrt{9-x} + (9-x) = 2x-12 \\ \Leftrightarrow & x+1-x+9-2\sqrt{(x+1)(9-x)} = 2x-12 \\ \Leftrightarrow & 10-2\sqrt{(x+1)(9-x)} = 2x-12 && |/-2 \\ \Leftrightarrow & -5+\sqrt{(x+1)(9-x)} = -x+6 && |+5 \\ \Leftrightarrow & \sqrt{(x+1)(9-x)} = -x+11 && |^2 \\ \Leftrightarrow & (x+1)(9-x) = (-x+11)^2 \\ \Leftrightarrow & -x^2+8x+9 = 11^2-22x+x^2 && |-x^2; +22x; -11^2 \\ \Leftrightarrow & -2x^2+30x-112 = 0 && |/(-2) \\ \Leftrightarrow & x^2-15x+56 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_{1/2} &= -\frac{-15}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-15}{2}\right)^2 + 56} = 7.5 \pm 0.5 \\ &\Rightarrow x_1 = 7 \wedge x_2 = 8 \end{aligned}$$

(b) $|x-3| + |x+2| - |x-4| = 3$

Wenn man $|x-3|$, $|x+2|$ und $|x-4|$ als drei separate Abbildungen $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ begreift, so ergibt sich für:

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} x-3 & x \geq 3 \\ -x-3 & x < 3 \end{cases} \\ g(x) &= \begin{cases} x+2 & x \geq -2 \\ -x-2 & x < -2 \end{cases} \\ h(x) &= \begin{cases} x-4 & x \geq 4 \\ -x+4 & x < 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Wenn man $gh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $gh(x) := g(x) - h(x)$ definiert, folgt:

$$gh(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 4 \\ 2x-7 & 3 < x < 4 \\ -1 & x \leq 3 \end{cases}$$

Definiert man weiter $fgh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $fgh(x) := gh(x) + f(x)$, folgt:

$$fgh(x) = \begin{cases} x+3 & x \geq 4 \\ 3x-5 & 3 < x < 4 \\ x+1 & -2 \leq x \leq 3 \\ -x-3 & x < -2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x+3=3 &\Leftrightarrow x=0, & 0 \not\geq 4 | \times \\ 3x-5=3 &\Leftrightarrow x=\frac{8}{3}, & \frac{8}{3} \not\geq 4 | \times \\ x+1=3 &\Leftrightarrow x=2, & -2 \leq 2 \leq 3 | \checkmark \\ -x-3=3 &\Leftrightarrow x=-6, & -6 < -2 | \checkmark \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_1 = 2 \wedge x_2 = -6$$

2.6 bestimme sämtliche reellen Lösungen der Ungleichungen

(a) $\frac{2}{x+1} < \frac{1}{x-3}$

(b) $(x+2)(4-x)(x-2)^2 > 0$

da x^2 für $x \in \mathbb{R}$ immer ≥ 0 , kann der Term nur negativ werden, wenn $(x+2)$ oder $(4-x)$ negativ sind.

Die Bedingung erfüllen alle Elemente von $M\{x \in \mathbb{R}; x \neq 2, (x+2)(4-x) > 0\}$

$$\begin{aligned} &(x+2)(4-x) > 0 \\ \Leftrightarrow &-x^2 + 2x + 8 > 0 & | * (-1) \\ \Leftrightarrow &x^2 - 2x - 8 < 0 \end{aligned}$$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := x^2 - 2x - 8$ stellt eine nach oben geöffnete Parabel da. Somit müssen alle Werte zwischen den beiden Nullstellen < 0 sein.

Die Nullstellen lassen sich direkt aus der Parameterform oben ablesen.

$$\Rightarrow x_1 = (-2) \wedge x_2 = 4$$

Somit gilt $\forall x \in \mathbb{R}; (-2 < x < 4, x \neq 2) : ((x+2)(4-x)(x-2)^2 > 0)$