

A medida que avanza su enfermedad, Miguel se acerca a la fase terminal de la





- \*Los medicamentos para la DT2 pueden incluir insulina, biguánidos (metformina), agonistas del receptor del GLP-1 e inhibidores del SGLT2.<sup>1</sup>
- <sup>†</sup> Se considera que la microalbuminuria tuvo un "aumento moderado" cuando el RACU es de 30 a 300 mg/g. Se considera que la microalbuminuria tuvo un "aumento grave" cuando el RACU es >300 mg/g.<sup>2</sup>

ARA: antagonista del receptor de angiotensina; ACC: antagonista de los canales de calcio; ERC: enfermedad renal crónica; CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; TFGe: tasa de filtración glomerular estimada; GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; SGLT2: cotransportador sodio-glucosa tipo 2; DT2: diabetes tipo 2; RACU: relación albúmina creatinina urinaria

**Referencias: 1.** FIRIALTA® Información para Prescribir en México. **2.** Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int. 2022;102(5S):S1-S127. doi:10.1016/j.kint.2022.06.008.



Integre Firialta para lograr una reducción de 30% en el nivel de albuminuria, lo cual se asocia con una reducción del 22% en el riesgo de ERCT<sup>1</sup>



