



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)



ANÁLISIS DE ALGORITMOS

NOMBRE DEL ALUMNO:

- SANTOS MÉNDEZ ULISES JESÚS

EJERCICIO 08:

- RECURRENCIAS LINEALES

FECHA DE ENTREGA:

- 15/04/2022

GRUPO:

- 3CM14



Recurrencias Lineales

Objetivo:

Para los siguientes 4 modelos recurrentes determinar el modelo equivalente sin recurrencia mediante el método de sustitución.

Ejercicio 01:

$$T(n) = 4T(n-2) + T(n-1) + T(n-3) + 3T(n-4)$$

Con $T(n) = 1$ para toda $n \leq 4$

$$T(n) - T(n-1) - 4T(n-2) - T(n-3) - 3T(n-4)$$

$$k = 4$$

$$x^4 - x^3 - 4x^2 - x - 3 = 0$$

La ecuación no es factorizable y no tiene solución por el método de división sintética entonces se hizo uso del método de Newton-Raphson

Las raíces son:

$$r_1 = -1.67341 \quad r_2 = 2.73937$$

$$T(n) = C_1(-1.67)^n + C_2(-1.67)^n + C_3(2.73)^n + C_4(2.73)^n$$

$$T(0) = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

$$T(1) = C_1(-1.67) + C_2(-1.67) + C_3(2.73) + C_4(2.73)$$

$$T(2) = C_1(2.78) + C_2(2.78) + C_3(7.45) + C_4(7.45)$$

$$T(3) = C_1(-4.65) + C_2(-4.65) + C_3(20.34) + C_4(20.34)$$

Al intentar resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las constantes se tiene que no hay solución entonces es posible que el modelo presentado no es correcto.

Ejercicio 02:

$$T(n) = T(n-1) + 3$$

$$\text{Con } T(0) = 4$$

$$T(n) - T(n-1) = 3 \quad d = 0 \quad b = 1$$

$$(x-1)(x-1) = 0$$

$$(x-1)^2 = 0$$

$$r_1 = 1 \quad r_2 = 1$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^m C_k n^{(i-1)} r^n$$

$$T(n) = C_1 n^{1-1} 1^n + C_2 n^{2-1} 1^n$$

$$T(n) = C_1 + C_2 n$$

$$T(0) = C_1 + C_2(0)$$

$$T(0) = C_1 = 4$$

$$T(1) = 3 + T(0) = 3 + 4 = 7$$

$$T(2) = 3 + T(1) = 3 + 7 = 10$$

$$10 = 4 + 2C_2$$

$$C_2 = 3$$

$$T(n) = 4 + 3n$$

Ejercicio 03:

$$T(n) = -5T(n-1) - 6T(n-2) + (42)(4^n)$$

$$\text{Con } T(0) = 18 \text{ y } T(1) = 61$$

$$T(n) + 5T(n-1) + 6T(n-2) = 4^n * 42$$

$$k = 2 \quad b = 4 \quad d = 0$$

$$(x^2 + 5x + 6)(x - 4) = 0$$

$$(x + 3)(x + 2)(x - 4) = 0$$

$$r_1 = -3 \quad r_2 = -2 \quad r_3 = 4$$

$$T(n) = C_1(-3)^n + C_2(-2)^n + C_3(4)^n$$

$$T(0) = C_1 + C_2 + C_3$$

$$T(1) = -3C_1 - 2C_2 + 4C_3$$

$$T(2) = -5T(1) - 6T(0) + 42(4^2)$$

$$T(2) = -5(61) - 6(18) + 42(4^2)$$

$$T(2) = 259$$

$$T(2) = C_1(-3)^2 + C_2(-2)^2 + C_3(4)^2$$

$$T(2) = 9C_1 + 4C_2 + 16C_3$$

$$C_1 + C_2 + C_3 = 18$$

$$-3C_1 - 2C_2 + 4C_3 = 61$$

$$9C_1 + 4C_2 + 16C_3 = 259$$

$$C_1 = -1 \quad C_2 = 3 \quad C_3 = 16$$

$$T(n) = -(-3)^n + 3(-2)^n + 16(4)^n$$

Ejercicio 04:

$$T(n) = 5T(n-2) + 3T(n-1)$$

$$\text{Con } T(1) = 2 \quad y \quad T(2) = -3$$

$$T(n) - 3T(n-1) - 5T(n-2) = 0 \quad k = 2$$

$$x^2 + 3x - 5 = 0$$

$$r_1 = \frac{3 + \sqrt{29}}{2}$$

$$r_2 = \frac{3 - \sqrt{29}}{2}$$

$$T(n) = C_1 \left(\frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{3 - \sqrt{29}}{2} \right)^n$$

$$T(1) = C_1 \left(\frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right) + C_2 \left(\frac{3 - \sqrt{29}}{2} \right)$$

$$T(1) = 4.192C_1 - 1.192C_2$$

$$T(2) = 17.57C_1 + 1.42C_2$$

$$C_1 = -0.027 \quad C_2 = -1.77$$

$$T(n) = (-0.027) \left(\frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right)^n + (-1.77) \left(\frac{3 - \sqrt{29}}{2} \right)^n$$

Ejercicio 05:

$$T(n) = 3T(n-2) - 2T(n-3)$$

$$\text{Con } T(0) = -1 \quad T(1) = 4 \quad T(2) = 8$$

$$T(n) + 0T(n-1) - 3T(n-2) + 2T(n-3) = 0 \quad k = 3$$

$$x^3 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-1)^2(x+2) = 0$$

$$r_1 = 1 \quad r_2 = 1 \quad r_3 = -2$$

$$T(n) = C_1 + C_2n + C_3n^2(-2)^n$$

$$T(0) = C_1$$

$$T(1) = C_1 + C_2 - 2C_3$$

$$T(2) = C_1 + 2C_2 + 16C_3$$

$$C_1 = -1 \quad C_2 = \frac{49}{10} \quad C_3 = -\frac{1}{20}$$

$$T(n) = -1 + \frac{49}{10}n - \frac{1}{20}n^2(-2)^n$$