XMAC02 Métodos Matemáticos para Análise de Dados

- É um método de inferência estatística que nos permite inferir sobre um parâmetro populacional com base numa estatística amostral.
- Exemplo:
 - Máquina envasa milhares de perfumes diariamente com média de 150 ml e desvio padrão de 2 ml
 - Observando uma amostra queremos saber se a máquina está funcionando corretamente

Significância Estatística

- Após realizar um teste de hipótese, observa-se que a média de volume envasado mudou para 150,2 ml
- Estatisticamente é possível comprovar que a máquina não está funcionando corretamente
 - $\blacksquare 150 \Rightarrow 150,2$
- Devo parar a máquina imediatamente e realizar ajustes, considerando que isso fará com que a produção seja interrompida por várias horas?

Significância Prática

Situação A

- Máquina fabrica 1 milhão de frascos de perfume por dia, e o custo de cada unidade é elevado
- Neste caso, 0,2 ml em média a mais em cada frasco pode representar um prejuízo considerável para a empresa.
 Então 0,2 ml a mais tem significância prática

Situação B

- Máquina fabrica 1 mil frascos por dia, e o custo de cada unidade é baixo
- Nesta caso, não é conveniente parar a máquina imediatamente. O procedimento de ajuste pode ser feito durante um período de inatividade (fim de semana)

Etapas do Teste de Hipótese

- 1) Definir a hipótese nula
- 2) Definir a hipótese alternativa
- 3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
- 4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
- 5) Definir o valor crítico
- 6) Interpretar resultados

Etapas do Teste de Hipótese

- 1) Definir a hipótese nula
- 2) Definir a hipótese alternativa
- 3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
- 4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
- 5) Definir o valor crítico
- 6) Interpretar resultados

Hipótese Nula vs Alternativa

- Julgamento criminal
- Hipótese nula (H₀): Acusado é inocente
- Hipótese alternativa (H_a): Acusado é culpado. É necessário provar a culpa.
- Conclusão da corte: culpado (há provas) ou não culpado (não há evidências ou provas suficientes)

Hipótese Nula vs Alternativa


- Julgamento criminal
- Hipótese nula (H₀): Acusado é inocente
- Hipótese alternativa (H_a): Acusado é culpado. É necessário provar a culpa.
- Em termos estatísticos:
 - Rejeita a hipótese nula, ou
 - Falha em rejeitar a hipótese nula

Hipótese Nula vs Alternativa Máquina de envasar perfumes

- □ Hipótese nula (H₀): A máquina está preenchendo os frascos com 150 ml
- Hipótese alternativa (H_a): A máquina <u>não</u> está preenchendo os frascos com 150 ml

Hipótese Nula vs Alternativa Máquina de envasar perfumes

- Qual seria a conclusão ao se analisar uma única amostra com:
 - □ 150,2 ml; 147 ml; 156 ml; 140 ml?



Etapas do Teste de Hipótese

- 1) Definir a hipótese nula
- 2) Definir a hipótese alternativa
- 3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
- 4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
- 5) Definir o valor crítico
- 6) Interpretar resultados

Probabilidade de erro


- Toda vez que tiramos conclusões sobre a população com base numa amostra há uma chance da conclusão estar incorreta.
 - A probabilidade de erro, ou erro alpha, nos diz qual é essa chance
 - Geralmente $\alpha = 0.05$
 - Assim, a cada 20 inferências, uma estará errada
 - lacktriangle Se a inferência for mais crítica, fazemos lpha= 0,01
 - \blacksquare Se for pouco crítica, fazemos $\alpha = 0,1$

Probabilidade de erro

		Verdade			
		H ₀ está correta	H _a está correta		
Conclusão	Confirmar H _{0/} Rejeitar H _a	Conclusão Correta	Erro tipo II (β)		
	Confirmar H _{a /} Rejeitar H ₀	Erro tipo I (α)	Conclusão Correta (Potência)		


Erro tipo I (α)

 \square 1 amostra = 155 ml, α = 0.05



Erro tipo II (β)

□ 1 amostra = 152



	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)			
Nome	Risco do produtor/ Nível de significância	Risco do consumidor			
1 – erro é chamado	Nível de confiança	Potência do teste			
Alarme de incêncio	Alarme falso levando a inconveniência	Alarme não soa levando a um desastre			
Julgamento	Inocente declarado culpado	Culpado declarado inocent			
Método de controle	Níveis pré- determinados de 1%, 5% e 10%	Controlado através do tamanho da amostra			
Efeitos	Custo desnecessário	Defeitos / perdas / catástrofes			

	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ Nível de significância	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	Nível de confiança	Potência do teste

- \square Risco do produtor (α)
 - Amostra tem um número anormal de defeitos, mas lote é bom (pode ocorrer com α = 0,05 ou α = 0,1)
- \square Risco do consumidor (β)
 - Amostra tem pouco defeito, mas lote é ruim (pode ocorrer se amostra é pequena)

	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ Nível de significância	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	Nível de confiança	Potência do teste


Nível de confiança

$$\Box$$
 C = 0,90; 0,95; 0,99 (90%, 95%, 99%)

Nível de significância

$$\alpha = 1 - C$$

 $\alpha = 0.10; 0.05; 0.01$



	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ Nível de significância	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	Nível de confiança	Potência do teste

Potência

- Erro tipo II: Falha em rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falha.
- Potência: Probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falha, ou
 - Potência é a capacidade de um teste de rejeitar corretamente a hipótese nula.


Etapas do Teste de Hipótese


- 1) Definir a hipótese nula
- 2) Definir a hipótese alternativa
- 3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
- 4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
- 5) Definir o valor crítico
- 6) Interpretar resultados

- Tomamos um frasco de perfume da linha de produção e ele contém 153,8 ml
- Considerando um nível de confiança de 95%, nossa hipótese nula será verdadeira ou falsa?

 H_0 : $\mu = 150$ ml

 H_a : $\mu \neq 150$ ml






$$H_0$$
: $\mu = 150$ ml

$$H_a$$
: $\mu \neq 150$ ml


$$\sigma = 2$$

C = 0,95
-1,96 σ a + 1,96 σ

Agora foram coletados 4 frascos e a média dos frascos foi 153,8 ml. Devemos rejeitar ou aceitar a hipótese nula?



Agora foram coletados 4 frascos e a média dos frascos foi 153,8 ml. Devemos rejeitar ou aceitar a hipótese nula?




$$z_{cal} = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
 $z_{cal} = \frac{(153.8 - 150)}{2 / \sqrt{4}} = 3.8$

Para α = 0.05 e teste de duas caudas, temos 0.025 em cada cauda.

Z crítico = 1.96

 H_0 : $\mu = 150$ ml

 H_a : $\mu \neq 150$ ml



- $\alpha = 0.01$, duas caudas
 - □ 0,005 em cada cauda
 - Z crítico = 2,575
- $\alpha = 0.05$, duas caudas
 - □ 0,025 em cada cauda
 - Z crítico = 1,96
- $\alpha = 0,10$, duas caudas
 - 0,05 em cada cauda
 - Z crítico = 1,645
- $\alpha = 0.05$ cauda única
 - Z crítico = 1,645

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	.0062 .0047 .0035 .0026	.0060 .0045 .0034 .0025 .0018	.0059 .0044 .0033 .0024 .0018	.0057 .0043 .0032 .0023 .0017	.0055 .0041 .0031 .0023 .0016	.0054 .0040 .0030 .0022 .0016	.0052 .0039 .0029 .0021 .0015	.0051 .0038 .0028 .0021 .0015	.0049 .0037 .0027 .0020 .0014	.0048 .0036 .0026 .0019 .0014
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4	.0013 .0010 .0007 .0005 .0003	.0013 .0009 .0007 .0005 .0003	.0013 .0009 .0006 .0005	.0012 .0009 .0006 .0004 .0003	.0012 .0008 .0006 .0004 .0003	.0011 .0008 .0006 .0004 .0003	.0011 .0008 .0006 .0004 .0003	.0011 .0008 .0005 .0004 .0003	.0010 .0007 .0005 .0004 .0003	.0010 .0007 .0005 .0003 .0002
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	.0002 .0002 .0001 .0001 .0000	.0002 .0002 .0001 .0001 .0000	.0002 .0001 .0001 .0001	.0002 .0001 .0001 .0001	.0002 .0001 .0001 .0001	.0002 .0001 .0001 .0001 .0000	.0002 .0001 .0001 .0001	.0002 .0001 .0001 .0001 .0000	.0002 .0001 .0001 .0001 .0000	.0002 .0001 .0001 .0001 .0000