

# Lista Ejercicios Análisis Matemático IV

Cristo Daniel Alvarado

10 de junio de 2024

# Índice general

1. Lista 4
------------

2
---

# Capítulo 1

## Lista 4

### Ejercicio 1.0.1

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ . Defina  $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  como:

$$P(x_1, \dots, x_n) = e^{-\sum_{k=1}^n |x_k|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Fije  $\nu \in \mathbb{N}$ , **demuestre** la fórmula:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x) P\left(\frac{x}{\nu}\right) dx = (2\nu)^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{(1 + \nu^2 x_1^2) \cdots (1 + \nu^2 x_n^2)} dx_1 \cdots dx_n$$

- ii. **Deduzca** que si  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \cap \mathcal{L}_\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$  y  $\mathcal{F}f \geq 0$ , entonces  $\mathcal{F}f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ .

*Sugerencia.* Aplique el teorema de Beppo-Levi.

### Demostración:

De (i): Defina  $g(x) = P\left(\frac{x}{\nu}\right)$ , para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ . Veamos que  $g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ . En efecto, se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} P\left(\frac{x}{\nu}\right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} P\left(\frac{x_1}{\nu}, \dots, \frac{x_n}{\nu}\right) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\sum_{k=1}^n \left|\frac{x_k}{\nu}\right|} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{1}{\nu} \sum_{k=1}^n |x_k|} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x_1|}{\nu}} \cdots e^{-\frac{|x_n|}{\nu}} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|x_1|}{\nu}} dx_1\right) \cdots \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|x_n|}{\nu}} dx_n\right)}_{n\text{-veces}} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|t|}{\nu}} dt\right)^n \\ &< \infty \end{aligned}$$

Usando Fubini para funciones medibles no negativas. Por tanto, por el Teorema de transferencia se sigue que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x) P\left(\frac{x}{\nu}\right) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x) g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \mathcal{F}g(x) dx \end{aligned}$$

Calculemos  $\mathcal{F}g(x)$ . Como  $g(x) = P\left(\frac{x}{\nu}\right)$  para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ , entonces

$$\mathcal{F}g(x) = \nu^n \mathcal{F}P(\nu x)$$

(por una proposición), donde

$$\begin{aligned} \mathcal{F}P(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y \rangle} P(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i \sum_{k=1}^n x_k y_k} e^{-\sum_{k=1}^n |y_k|} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\sum_{k=1}^n (|y_k| + i x_k y_k)} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|y_1| - i x_1 y_1} \cdots e^{-|y_n| - i x_n y_n} dy_1 \cdots dy_n \\ &= \underbrace{\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|y_1| - i x_1 y_1} dy_1 \right) \cdots \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|y_n| - i x_n y_n} dy_n \right)}_{n\text{-veces}} \\ &= \underbrace{\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t| - i x_1 t} dt \right) \cdots \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t| - i x_n t} dt \right)}_{n\text{-veces}} \\ &= \mathcal{F}h(x_1) \cdots \mathcal{F}h(x_n) \end{aligned}$$

donde  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es la función tal que  $t \mapsto e^{-|t|}$  y, se sabe que

$$\mathcal{F}h(x) = \frac{2}{1+x^2}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}P(x) &= \frac{2^n}{(1+x_1^2) \cdots (1+x_n^2)} \\ \Rightarrow \mathcal{F}P(\nu x) &= \frac{2^n}{(1+\nu^2 x_1^2) \cdots (1+\nu^2 x_n^2)} \end{aligned}$$

Se sigue que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x) P\left(\frac{x}{\nu}\right) dx &= \nu^n \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \mathcal{F}P(\nu x) dx \\ &= \nu^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{2^n f(x_1, \dots, x_n)}{(1+\nu^2 x_1^2) \cdots (1+\nu^2 x_n^2)} dx_1 \cdots dx_n \\ &= (2\nu)^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{(1+\nu^2 x_1^2) \cdots (1+\nu^2 x_n^2)} dx_1 \cdots dx_n \end{aligned}$$

De (ii): Para cada  $\nu \in \mathbb{N}$  defina la función  $g_\nu : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$  como sigue:

$$g_\nu(x) = \mathcal{F}f(x) P\left(\frac{x}{\nu}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Esta es una sucesión creciente de funciones en  $\mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ , pues si  $\nu \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\nu+1} \sum_{k=1}^n |x_k| &\leq \frac{1}{\nu} \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\
\Rightarrow -\frac{1}{\nu} \sum_{k=1}^n |x_k| &\leq -\frac{1}{\nu+1} \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\
\Rightarrow e^{\frac{1}{\nu} \sum_{k=1}^n |x_k|} &\leq e^{-\frac{1}{\nu+1} \sum_{k=1}^n |x_k|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\
\Rightarrow P\left(\frac{x}{\nu}\right) &\leq P\left(\frac{x}{\nu+1}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\
\Rightarrow \mathcal{F}f(x)P\left(\frac{x}{\nu}\right) &\leq \mathcal{F}f(x)P\left(\frac{x}{\nu+1}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\
\Rightarrow g_\nu &\leq g_{\nu+1}
\end{aligned}$$

pues,  $\mathcal{F}f \geq 0$ . Además, como  $f \in \mathcal{L}_\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ , entonces

$$f \leq \mathcal{N}_\infty(f) \text{ c.t.p. en } \mathbb{R}^n$$

luego,

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} g_\nu(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x)P\left(\frac{x}{\nu}\right) dx \\
&= (2\nu)^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{(1 + \nu^2 x_1^2) \cdots (1 + \nu^2 x_n^2)} dx_1 \cdots dx_n
\end{aligned}$$

Hagamos el cambio de variable  $(y_1, \dots, y_n) = (\frac{x_1}{\nu}, \dots, \frac{x_n}{\nu})$ , se tiene que

$$\begin{aligned}
(2\nu)^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{(1 + \nu^2 x_1^2) \cdots (1 + \nu^2 x_n^2)} dx_1 \cdots dx_n &= (2\nu)^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(\nu y_1, \dots, \nu y_n)}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{\nu^n} \\
&= 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(\nu y_1, \dots, \nu y_n)}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)} dy_1 \cdots dy_n \\
&= 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathcal{N}_\infty(f)}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)} dy_1 \cdots dy_n \\
&= 2^n \mathcal{N}_\infty(f) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)} \\
\Rightarrow \left| \int_{\mathbb{R}^n} g_\nu(x) \right| &= 2^n \mathcal{N}_\infty(f) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)}
\end{aligned}$$

pues  $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{(1+y_1^2) \cdots (1+y_n^2)} < \infty$  y  $\int_{\mathbb{R}^n} g_\nu(x) \geq 0$ . Por tanto, por Beppo-Levi se sigue que existe una función  $g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$  tal que

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} g_\nu = g \text{ c.t.p. en } \mathbb{R}^n$$

Pero, también se tiene que

$$\begin{aligned}
\lim_{\nu \rightarrow \infty} g_\nu(x) &= \lim_{\nu \rightarrow \infty} \mathcal{F}f(x)P\left(\frac{x}{\nu}\right) \\
&= \mathcal{F}f(x) \lim_{\nu \rightarrow \infty} P\left(\frac{x}{\nu}\right) \\
&= \mathcal{F}f(x)P(0, \dots, 0) \\
&= \mathcal{F}f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n
\end{aligned}$$

Entonces  $\mathcal{F}f = g$  c.t.p. en  $\mathbb{R}^n$ , luego  $\mathcal{F}f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ . Más aún,

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(x) dx &= \lim_{\nu \rightarrow \infty} 2^n \mathcal{N}_\infty(f) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)} \\
&= 2^n \mathcal{N}_\infty(f) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{(1 + y_1^2) \cdots (1 + y_n^2)}
\end{aligned}$$

**Ejercicio 1.0.2 (Problema 2 Lista 6 Análisis Matemático II)**

Pruebe que si  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ , entonces

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} f \right| = \int_{\mathbb{R}^n} |f|$$

si y sólo si existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  fijo tal que  $f = e^{i\alpha} |f|$  c.t.p. en  $\mathbb{R}^n$ .

*Sugerencia.* Suponiendo que  $|\int_{\mathbb{R}^n} f| = \int_{\mathbb{R}^n} |f|$ , existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que  $\int_{\mathbb{R}^n} f = e^{i\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |f|$ . Escriba

$$e^{-i\alpha} f = g + ih$$

donde  $g$  y  $h$  son funciones reales.

**Demostración:****Ejercicio 1.0.3**

Sea  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ . Se supone que  $f(x) > 0$ , para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ . **Pruebe** que si  $x \neq 0$ , entonces

$$\mathcal{F}f(0) > |\mathcal{F}f(x)|$$

*Sugerencia.* Una vez que ha demostrado  $|\mathcal{F}f(x)| \leq \mathcal{F}f(0)$ , para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ , Para demostrar la desigualdad estricta para  $x \neq 0$  proceda por reducción al absurdo y use el Problema 2 de la Lista 6 de Análisis Matemático II.

**Demostración:**

Notemos que como  $f(x) > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , se tiene en particular que  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

Sea  $x \in \mathbb{R}^n$ . Primero probaremos que

$$\mathcal{F}f(0) \geq |\mathcal{F}f(x)|$$

es decir:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle 0|y\rangle} f(y) dy &\geq \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) dy \right| \\ \iff \int_{\mathbb{R}^n} f(y) dy &\geq \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) dy \right| \\ \iff \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy &\geq \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) dy \right| \end{aligned}$$

pues  $f(x) > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ . Veamos que

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) dy \right| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-i\langle x|y\rangle} f(y)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-i\langle x|y\rangle}| |f(y)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \end{aligned} \tag{1.1}$$

lo que prueba el resultado. Para la desigualdad estricta suponga que existe  $x \in \mathbb{R}^n$  no cero tal que

$$\mathcal{F}f(x) = \mathcal{F}f(0)$$

esto es

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) dy \right| &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-i\langle x|y\rangle} f(y)| dy \end{aligned}$$

Por el ejercicio anterior existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  fijo tal que

$$e^{-i\langle x|y\rangle} f(y) = e^{i\alpha} |f(y)| = e^{i\alpha} f(y)$$

para casi todo  $y \in \mathbb{R}^n$ . En particular, tenemos que

$$f(y) (e^{-i\langle x|y\rangle} - e^{i\alpha}) = 0$$

para casi todo  $y \in \mathbb{R}^n$ . Como  $f(y) > 0$  para todo  $y \in \mathbb{R}^n$ , entonces

$$e^{-i\langle x|y\rangle} - e^{i\alpha} = 0$$

nuevamente para casi todo  $y \in \mathbb{R}^n$ . Como las dos funciones involucradas son continuas y coinciden c.t.p. en  $\mathbb{R}^n$ , debe tenerse pues que

$$e^{-i\langle x|y\rangle} = e^{i\alpha}, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

lo cual ocurre si y sólo si

$$e^{i(\langle x|y\rangle + \alpha)} = 1, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

es decir que

$$\langle x|y\rangle + \alpha = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

como  $x \neq 0$  en particular se tiene que

$$\langle x|x\rangle = -\alpha$$

y, además (tomando  $y = 2x$ ):

$$2\langle x|x\rangle = -\alpha$$

pero esto sólo puede suceder si  $\langle x|x\rangle = 0$ , es decir que  $x = 0_{\#c}$ . Luego entonces

$$|\mathcal{F}f(x)| < \mathcal{F}f(0)$$

■

#### Ejercicio 1.0.4

Haga lo siguiente:

- Sean  $a > 0$  y  $\lambda \in \mathbb{R}$ . **Pruebe** que la función  $x \mapsto (\cos \lambda x)/(x^2 + a^2)$  es integrable en  $[0, \infty[$ . **Muestre** que si  $\lambda \neq 0$ , la función  $x \mapsto (x \sin \lambda x)/(x^2 + a^2)$  no es integrable en  $[0, \infty[$ , pero existe la integral impropia

$$\int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx$$

*Sugerencia.* Muestre que

$$\left| \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} \right| \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \left| \frac{\sin \lambda x}{x} \right|$$

Para probar la existencia de la integral impropia use los criterios de Abel.

- Recuerde que la función  $x \mapsto (2a)/(x^2 + a^2)$  es la transformada de Fourier de la función  $x \mapsto e^{-a|x|}$ . Usando el teorema de inversión de Fourier, **demuestre** que

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a|\lambda|}$$

iii. Usando el inciso (ii), calcule la integral impropia

$$\int_0^{\rightarrow\infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx$$

*Sugerencia.* Para  $\lambda \neq 0$  defina

$$\Phi(\lambda) = \int_0^{\rightarrow\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} dx$$

**Calcule**  $\Phi'(\lambda)$  primero suponiendo  $\lambda > \lambda_0$ , donde  $\lambda_0 > 0$  es arbitrario fijo, de forma análoga para  $\lambda < 0$  y finalmente para  $\lambda = 0$ .

### Demostración:

De (i): Para todo  $x \in \mathbb{R}^n$  defina

$$f(x) = \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2}$$

Afirmamos que  $f$  es integrable en  $[0, \infty[$ . Para ello, veamos que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |f| &= \int_0^\infty \frac{|\cos \lambda x|}{x^2 + a^2} dx \\ &\leq \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + a^2} \end{aligned}$$

donde la función de la derecha es integrable en tal intervalo. Por tanto,  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

Sea ahora  $\lambda \in \mathbb{R}$  tal que  $\lambda \neq 0$ . Afirmamos que la función

$$g(x) = \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2}$$

para todo  $x \in \mathbb{R}$  no es integrable en  $[0, \infty[$ . En efecto, veamos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} \right|}{\left| \frac{\sin \lambda x}{x} \right|} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{x^2 + a^2} \right| \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1 + \frac{a^2}{x^2}} \right| \\ &= \frac{1}{1 + 0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

por tanto,

$$\left| \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} \right| \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \left| \frac{\sin \lambda x}{x} \right|$$

Luego entonces, por la proposición 8.53 Análisis Matemático II:

$$\left| \frac{\sin \lambda x}{x} \right| \underset{x \rightarrow \infty}{=} O \left( \left| \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} \right| \right)$$

donde la función  $x \mapsto \left| \frac{\sin \lambda x}{x} \right|$  no es integrable en  $[0, \infty[$ , luego tampoco puede serlo  $g$  (siendo que ambas funciones son integrables en todo subconjunto acotado de  $\mathbb{R}$ ).

Veamos que si existe la integral impropia

$$\int_0^{\rightarrow\infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2}$$



En efecto, defina para cada  $x \in [0, \infty[$  las funciones:

$$G(x) = \int_0^x \sin \lambda x \, dx \quad \text{y} \quad f(x) = \frac{x}{x^2 + a^2}$$

se tienen dos cosas:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  (es claro de la definición de  $f$ ).
- $G$  es una función acotada en  $[0, \infty[$ , pues para cada  $x \in [0, \infty[$ :

$$\begin{aligned} |G(x)| &= \left| \int_0^x \sin \lambda x \, dx \right|, \text{ haciendo el cambio de variable } u = \lambda x \\ &= \left| \frac{1}{\lambda} \cdot \int_0^{\lambda x} \sin u \, du \right| \\ &= \left| \frac{1}{\lambda} \cdot \left[ -\cos u \right]_0^{\lambda x} \right| \\ &= \left| \frac{1}{\lambda} \cdot [-\cos \lambda x + \cos 0] \right| \\ &\leq \frac{2}{|\lambda|} \end{aligned}$$

Por tanto, del primer criterio de Abel se sigue que la integral impropia

$$\int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2}$$

es convergente.

De (ii): Sea  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función dada por

$$h(x) = e^{-a|x|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

se sabe por un ejercicio de las notas que

$$\mathcal{F}h(x) = \frac{2a}{x^2 + a^2}$$

la función  $h$  cumple la condición de Dini en todo punto  $\lambda \in \mathbb{R} \neq 0$  (también lo hace en cero, pero no es relevante), por lo cual se tiene que

$$h(\lambda) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\lambda x} \mathcal{F}h(x) \, dx$$

es decir,

$$\begin{aligned} e^{-a|\lambda|} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\lambda x} \mathcal{F}h(x) \, dx \\ &= \frac{2a}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[ \int_{-R}^R \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx \right] \\ &= \frac{a}{\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[ \int_{-R}^0 \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + \int_0^R \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + i \int_{-R}^0 \frac{\sin \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + i \int_0^R \frac{\sin \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx \right] \\ &= \frac{a}{\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[ \int_0^R \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + \int_0^R \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx - i \int_0^R \frac{\sin \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx + i \int_0^R \frac{\sin \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx \right] \\ &= \frac{2a}{\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx \\ &= \frac{2a}{\pi} \int_0^{\rightarrow \infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} \, dx \end{aligned}$$

pero, de (i) se sabe que  $x \mapsto \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2}$  es integrable en  $[0, \infty[$ , por tanto coincide su valor con el de la integral impropia, así:

$$\begin{aligned} e^{-a|\lambda|} &= \frac{2a}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} dx \\ \Rightarrow \int_0^\infty \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} dx &= \frac{\pi}{2a} e^{-a|\lambda|} \end{aligned}$$

De (iii): Por la parte anterior, para todo  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  tiene que

$$\Phi(\lambda) = \int_0^\infty \frac{\cos \lambda x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a|\lambda|} = \frac{\pi}{2a} e^{-a|\lambda|}$$

Si todo funciona bien, por el Teorema de derivación para funciones definidas por integrales impropias, se tendría para  $\lambda > 0$ :

$$\begin{aligned} - \int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx &= \Phi'(\lambda) \\ &= -\frac{\pi}{2} e^{-a\lambda} \\ &= -\frac{\pi}{2} e^{-a|\lambda|} \\ \Rightarrow \int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx &= \frac{\pi}{2} e^{-a|\lambda|} \end{aligned}$$

y, para  $\lambda < 0$ :

$$\begin{aligned} - \int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx &= \Phi'(\lambda) \\ &= \frac{d}{d\lambda} \left( \frac{\pi}{2a} e^{-a(-\lambda)} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} e^{a\lambda} \\ &= \frac{\pi}{2} e^{-a|\lambda|} \\ \Rightarrow \int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx &= -\frac{\pi}{2} e^{-a|\lambda|} \end{aligned}$$

es decir que

$$\int_0^{\rightarrow \infty} \frac{x \sin \lambda x}{x^2 + a^2} dx = \text{Sgn}(\lambda) \cdot \frac{\pi}{2} e^{-a|\lambda|}$$

■

### Ejercicio 1.0.5

Sea  $H$  una matriz simétrica real  $n \times n$  positiva definida, es decir, la forma cuadrática  $\langle x | Hx \rangle$  sobre  $\mathbb{R}^n$  es positiva definida. Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  la función

$$f(x) = e^{-\langle Hx | x \rangle}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

**Demuestre** que  $f$  es integrable y que

$$\mathcal{F}f(x) = \frac{\pi^{n/2}}{(\det H)^{1/2}} e^{-\frac{1}{4} \langle H^{-1}x | x \rangle}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

*Sugerencia.*  $f$  es medible. Para ver que es integrable, pruebe que  $\langle Hx | x \rangle \geq m \|x\|^2$ , donde

$$m = \min_{x \in S} \{ \langle Hx | x \rangle \} > 0$$

con  $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ . Se sabe de álgebra que existe una matriz ortogonal  $U$  tal que  $U^{-1}HU = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , donde  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  son números estrictamente positivos. En la integral  $\mathcal{F}f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x|y\rangle} e^{-\langle Hx|x\rangle} dy$  haga el cambio de variable  $y = Uz$  siendo tal que  $|\det U| = 1$ ,  $\langle Ur|Us\rangle = \langle r|s\rangle$  (y lo análogo para  $U^{-1}$ ) y observe que  $(1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_n) = U^{-1}H^{-1}U$ .

### Demostración:

Veamos que  $f$  es medible (más aún, es continua). En efecto, considere la matriz  $H$  dada por

$$H = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \dots & h_{1,n-1} & h_{1,n} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & \dots & h_{2,n-1} & h_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ h_{n,1} & h_{n,2} & \dots & h_{n,n-1} & h_{n,n} \end{bmatrix}$$

Se tiene entonces que para cada  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ :

$$\begin{aligned} \langle x|Hx\rangle &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n x_k y_k \end{aligned}$$

donde

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \dots & h_{1,n-1} & h_{1,n} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & \dots & h_{2,n-1} & h_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ h_{n,1} & h_{n,2} & \dots & h_{n,n-1} & h_{n,n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es decir que

$$y_k = \sum_{i=1}^n h_{k,i} x_i$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \langle x|Hx\rangle &= \sum_{k=1}^n x_k \sum_{i=1}^n h_{k,i} x_i \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n x_k x_i h_{k,i} \end{aligned}$$

siendo la aplicación  $x \mapsto \langle x|Hx\rangle$  una aplicación polinomial de  $n$ -variables, luego es continua. Así, la composición con  $t \mapsto e^{-t}$  es continua, es decir que la función  $f$  es continua en  $\mathbb{R}^n$ , luego medible.

Ahora, sea ahora

$$m = \inf_{x \in S} \{\langle Hx|x\rangle\}$$

donde  $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ . Afirmamos que  $m > 0$ . En el caso que  $m = 0$ , como la función  $x \mapsto \langle x|Hx\rangle$  es continua de  $\mathbb{R}^n$  en  $\mathbb{R}$ , se tendría que alcanzaría su máximo y mínimo, luego existiría  $x_0 \in S$  tal que

$$\langle x_0|Hx_0\rangle = 0$$

lo cual contradeciría el hecho de que  $H$  es positiva definida. Por tanto,  $m > 0$ . Más aún,

$$m = \inf_{x \in S} \{\langle Hx|x\rangle\} = \min_{x \in S} \{\langle Hx|x\rangle\}$$

Sea  $x \in \mathbb{R}^n$  no cero, se tiene que

$$\begin{aligned}\langle Hx|x \rangle &= \langle H \left( \|x\| \cdot \frac{x}{\|x\|} \right) \|x\| \cdot \frac{x}{\|x\|} \rangle \\ &= \|x\|^2 \langle H \left( \frac{x}{\|x\|} \right) | \frac{x}{\|x\|} \rangle \\ &\geq m \|x\|^2 \\ \Rightarrow -\langle Hx|x \rangle &\leq -m \|x\|^2\end{aligned}$$

Considere la función ■

**Ejercicio 1.0.6**

Recuerde que si  $f = \chi_{[-a,a]}$ , entonces

$$\mathcal{F}f(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin ax}{x}, \quad \forall x \neq 0$$

**Deduzca** la fórmula

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\sin ax}{x} \right)^2 dx = \pi a$$

**Demostración:** ■

**Ejercicio 1.0.7**

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $f(x) = \left(1 - \frac{|x|}{a}\right) \chi_{[-a,a]}(x)$ , para todo  $x \in \mathbb{R}$ . **Pruebe** que

$$\mathcal{F}f(x) = a \left( \frac{\sin \frac{ax}{2}}{\frac{ax}{2}} \right)^2$$

- ii. Usando  $\mathcal{F}_2 f$  **muestre** la fórmula

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\sin ax}{x} \right)^4 dx = \frac{2}{3} \pi a^3$$

- iii. **Calcule** la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\sin ax}{x} \right)^3 dx$$

*Sugerencia.* Escriba  $f(x) = \left(1 - \frac{|x|}{a}\right) \chi_{[-a,a]}(x)$  y  $g(x) = \chi_{[-a,a]}(x)$ , para todo  $x \in \mathbb{R}$ .  
 Aplique la identidad de Parseval

$$\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_2 f \mathcal{F}_2 g = \langle \mathcal{F}_2 f | \mathcal{F}_2 g \rangle = \langle f | g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f g$$

para deducir el resultado.

**Solución:** □

**Ejercicio 1.0.8**

Sea  $n \geq 2$  y  $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $x \mapsto r(x) = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ . Sea  $f : [0, \infty[ \rightarrow \mathbb{C}$  una función tal que  $f \circ r$  es integrable en  $\mathbb{R}^n$ .

- i. **Pruebe** que la transformada de Fourier  $\mathcal{F}(f \circ r)$  es una función radial.

*Sugerencia.* Si  $U$  es una matriz ortogonal  $n \times n$ , se tiene que  $\mathcal{F}(f \circ r)(Ux) = \mathcal{F}(f \circ r)(x)$ . Dados  $x, y \in \mathbb{R}^n$  tales que  $\|x\| = \|y\|$ , siempre existe una matriz ortogonal  $U$  tal que  $Ux = y$ .

- ii. **Muestre** que se cumple la **fórmula de Bochner**

$$\mathcal{F}(f \circ r)(x) = 2(n-1)\omega_{n-1} \int_0^\infty v_n(u(\|x\|))f(u)u^{n-1} du, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

donde  $\omega_{n-1}$  es el volumen de la bola euclídeana de radio uno en  $\mathbb{R}^{n-1}$  y  $v_n$  se define por la fórmula

$$v_n(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t \cos \theta) \sin^{n-2} \theta d\theta$$

*Sugerencia.* Según el inciso (i),

$$\mathcal{F}(f \circ r)(x) = \mathcal{F}(f \circ r)(\|x\|, 0, \dots, 0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\|y\|) e^{-i\|x\|y_1} dy_1 \cdots dy_n$$

Transforme esta integral por el Teorema de Fubini y exprese la integral con respecto a  $y_2, \dots, y_n$  como una integral simple. La doble integral resultante se transforma a coordenadas polares.

**Solución:**

□

**Ejercicio 1.0.9**

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $h : [0, \infty[ \rightarrow 0\mathbb{C}$  una función integrable en  $[0, \infty[$ . Sea  $a > 0$ , **demuestre** que existe la integral impropia

$$\int_a^{\rightarrow \infty} \frac{dx}{x} \int_0^\infty h(y) \sin xy dy$$

*Sugerencia.* Justifique la inversión del orden de las integraciones.

- ii. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e}x & \text{si } |x| < e \\ \frac{\text{Sgn}(x)}{\log|x|} & \text{si } |x| \geq e \end{cases}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Muestre que, para  $a > 0$  no existe la integral impropia

$$\int_a^{\rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

De este hecho y del inciso (i) **deduzca** que no existe  $g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  tal que  $f = \mathcal{F}g$ . Así pues, la transformación de Fourier no es una aplicación suprayectiva de  $L_1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  en  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ .

**Solución:**

□

**Ejercicio 1.0.10**

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  una función integrable en  $\mathbb{R}$ . Se supone que existe una función  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  localmente integrable en  $\mathbb{R}$  tal que

$$f(x) = f(0) + \int_0^x \varphi, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad |\varphi(x)| \underset{|x| \rightarrow \infty}{=} O\left(\frac{1}{|x|^m}\right)$$

donde  $m > 2$ . **Pruebe** que

$$|f(x)| \underset{|x| \rightarrow \infty}{=} O\left(\frac{1}{x^{m-1}}\right)$$

y que, para todo  $x \in \mathbb{R}$ , existen las sumas

$$\Phi(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(x+k) \quad \text{y} \quad F(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x+k)$$

siendo la convergencia absoluta y uniforme en  $[-1, 1]$ , luego en  $\mathbb{R}$ . **Muestre** finalmente que

$$F(x) = F(0) + \int_0^x \Phi, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$F$  es una función periódica de periodo uno. **Demuestre** que los coeficientes de Fourier de  $F$  respecto al sistema O.N.  $(e^{2\pi i n t})_{n \in \mathbb{Z}}$  son

$$\int_0^1 F(x) e^{-2\pi i n x} dx = \mathcal{F}f(2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

**Deduzca la fórmula Sumatoria de Poisson**

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x+k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}f(x+k), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Aplicando la fórmula sumatoria de Poisson a la función  $x \mapsto e^{-\alpha|x|}$  para  $\alpha > 0$ , obtenga el desarrollo

$$\coth x = \frac{1}{x} + 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + n^2 \pi^2}, \quad \forall x \geq 0$$

Se define la **función theta** por

$$\Theta(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 x}, \quad \forall x > 0$$

Aplicando la fórmula sumatoria de Poisson a la función  $x \mapsto e^{-\alpha x^2}$  para  $\alpha > 0$ , **pruebe** la identidad

$$\Theta(x) = \sqrt{\frac{1}{x}} \Theta\left(\frac{1}{x}\right), \quad \forall x > 0$$

**Solución:**

□

**Ejercicio 1.0.11**

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  tal que  $f(x) = 0$  para todo  $x < 0$ . Para todo  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $\Im z \leq 0$  se define

$$\mathcal{F}f(x) = \int_0^\infty e^{-izx} f(x) dx$$

**Pruebe** que esta definición tiene sentido, que  $\mathcal{F}f$  es continua en el semiplano cerrado  $\{z \in \mathbb{C} \mid \Im z \leq 0\}$  y holomorfa en el semiplano abierto  $\{z \in \mathbb{C} \mid \Im z < 0\}$ .

*Sugerencia.* El teorema de derivación de funciones definidas por integrales continúa siendo válido al sustituir el intervalo  $I$  por un abierto de  $\mathbb{C}$ .

- ii. Sean  $f, g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  tales que  $f(x) = g(x) = 0, \forall x < 0$ . **Muestre** que para todo  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $\Im z \leq 0$  se tiene

$$\mathcal{F}(f * g)(z) = \mathcal{F}f(z)\mathcal{F}g(z)$$

- iii. Sean  $f, g$  como en el inciso (ii). Se supone además que  $\mathcal{F}(f * g) = 0$  c.t.p. en  $\mathbb{R}$ . **Demuestre** que  $f = 0$  c.t.p. en  $\mathbb{R}$  o bien  $g = 0$  c.t.p. en  $\mathbb{R}$ .

*Sugerencia.* Deduzca de (i) y (ii) que  $\mathcal{F}f = 0$  o bien  $\mathcal{F}g = 0$ .

**Solución:**

□

**Ejercicio 1.0.12**

Haga lo siguiente:

- i. Sea  $f \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ . Se define para todo  $z \in \mathbb{C}$ ,

$$F(z) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-izx - \frac{x^2}{2}} \overline{f(x)} dx$$

**Pruebe** que  $F$  es holomorfa en  $\mathbb{C}$  y que, para todo  $n \in \mathbb{N}$  y para todo  $z \in \mathbb{C}$ ,

$$F^{(n)}(z) = (-i)^n \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-izx - \frac{x^2}{2}} \overline{f(x)} dx$$

*Sugerencia.* La misma que la del Problema 11.

- ii. Se supone que  $f$  es ortogonal a todas las funciones de Hermite. Muestre que  $F = 0$  y **deduzca** que  $f = 0$  c.t.p. en  $\mathbb{R}^n$ .

Así pues, el sistema de funciones de Hermite normalizadas es un sistema ortonormal maximal en  $L_2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ .

*Sugerencia.* Observe que  $F^{(n)}(0) = 0$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$ . La condición  $F = 0$  implica que la transformada de Fourier de la función integrable  $x \mapsto e^{-\frac{x^2}{2}} \overline{f(x)}$  es cero.

**Solución:**

□

**Ejercicio 1.0.13**

Haga lo siguiente:

i. **Demuestre** la fórmula.

$$D_x^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} e^{\frac{1}{2}(y-ix)^2} dy = (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} D_x^n e^{\frac{1}{2}(y-ix)^2} dy$$

ii. Se consideran las funciones de Hermite

$$\varphi(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} D^n e^{-x^2}$$

**Pruebe** que  $\mathcal{F}_2 \varphi_n = (-1)^n \varphi_n$ . Así pues, las funciones de Hermite son vectores propios para el operador  $\mathcal{F}_2$ .

*Sugerencia.* Transforme  $\mathcal{F}_2 \varphi_n$  por la “fórmula de integración por partes de orden  $n$ ”.

$$\int_a^b f^{(n)} g = \left[ \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k f^{(n-k-1)} g^{(k)} \right] + (-1)^n \int_a^b f g^{(n)}$$

(al suponer  $f^{(n)}$  y  $g^{(n)}$  continuas en  $[a, b]$ ). Después, use la fórmula del inciso (i).

**Solución:**

□