

Notas de Álgebra Moderna IV.
Módulos.

Cristo Daniel Alvarado

11 de septiembre de 2024

Índice general

1. Módulos Libres y Espacios Vectoriales	2
1.1. Conceptos Fundamentales	2

Capítulo 1

Módulos Libres y Espacios Vectoriales

1.1. Conceptos Fundamentales

No queda de otra más que asumir este resultado de categorías:

Teorema 1.1.1 (Hungerford, Theorem I.7.8)

Si \mathcal{C} es una categoría concreta, F y F' son objetos en \mathcal{C} tales que F es libre en el conjunto X y F' lo es en X' siendo estos conjuntos tales que $|X| = |X'|$, entonces F es equivalente a F' .

En particular, la categoría de R -módulos unitarios es una categoría concreta, donde la equivalencia entre dos objetos de la categoría es un isomorfismo entre ambos R -módulos.

Teorema 1.1.2

Sea R un anillo conmutativo con identidad. Las siguientes condiciones son equivalentes en un R -módulo unitario F :

- I. F tiene base no vacía.
- II. F es la suma interna directa de una familia cíclica de R -módulos, cada uno de los cuales es isomorfo a R como un R -módulo.
- III. F es un R -módulo isomorfo a la suma directa de copias del R -módulo izquierdo R .
- IV. Existe un conjunto no vacío X y una función $i : X \rightarrow F$ con la siguiente propiedad: dado un R -módulo, A y una función $f : X \rightarrow A$ existe un único homomorfismo de R -módulos $\bar{f} : F \rightarrow A$ tal que

$$\bar{f} \circ i = f$$

En otras palabras, F es un objeto libre en la categoría de R -módulos unitarios.

Demostración:

(i) \Rightarrow (iv): Sea X una base no vacía de F y sea $i : X \rightarrow F$ el mapeo inclusión. Sea A un R -módulo y $f : X \rightarrow A$ una función.

Si $u \in F$, entonces existen $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $r_i \in R$ y $x_i \in X$, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ tales que

$$u = \sum_{i=1}^n r_i x_i$$

Definimos la función $\bar{f} : F \rightarrow A$ dada por:

$$\bar{f}(u) = \sum_{i=1}^n r_i f(x_i)$$

Esta función está bien definida, pues F tiene como base a X (por ende, todo elemento se representa de forma única como combinación lineal finita de elementos de X). Además,

$$\begin{aligned}\bar{f} \circ i(x_i) &= \bar{f}(x_i) \\ &= 1_R \cdot f(x_i) \\ &= f(x_i), \quad \forall x_i \in X\end{aligned}$$

por ende, $\bar{f} \circ i = f$.

Veamos que es homomorfismo de R -módulos (no sé como se verifica eso, chécalo porfa Roque).

Ahora, si $g : F \rightarrow A$ es otro homomorfismo de R -módulos tal que

$$g \circ i = f$$

se tiene que

$$\bar{f} \circ i = g \circ i \Rightarrow \bar{f}|_X = g|_X$$

Como X genera F y todo homomorfismo de R -módulos que vaya de F en algún R -módulo, B queda únicamente determinado por X , basta ver que $\bar{f} = g$ en X , lo cual sucede por la igualdad anterior. Por tanto, \bar{f} es único.

(iv) \Rightarrow (iii): Asumiendo (iv), sean $X \subseteq F$ no vacío y una función $i : X \rightarrow F$ que cumplan esta propiedad. Considere el R -módulo

$$A = \sum_{x \in X} R$$

(es decir, es la suma directa de $|X|$ -veces el R -módulo izquierdo R). Sea

$$Y = \left\{ \theta_x \mid x \in X \right\}$$

donde

$$\theta_x(y) = \begin{cases} 1_R & \text{si } y = x \\ 0_R & \text{si } y \neq x \end{cases}, \quad \forall y \in Y$$

Como X es no vacío, entonces Y es no vacío. Por la parte (iii) \Rightarrow (i), se sabe que Y es una base del R -módulo unitario A . En particular, como (iii) \Rightarrow (iv), se tiene que A es un R -módulo libre en la categoría de R -módulos unitarios.

En particular, F y A son R -módulos libres en la categoría de R -módulos unitarios y son tales que $|X| = |Y|$ (por la forma en que se construyó Y), luego por el Teorema anterior son equivalentes en esta categoría, es decir que existe un isomorfismo $f : F \rightarrow A$. Así que

$$F \cong \sum_{x \in X} R$$

lo que prueba el resultado. ■