

Notas Grupos Topológicos

Cristo Daniel Alvarado

22 de abril de 2024

Índice general

2. Compacidad	2
2.1. Grupos compactos y localmente compactos	2

Capítulo 2

Compacidad

En este capítulo se estudiarán algunas de las propiedades más investigadas en grupos topológicos.

2.1. Grupos compactos y localmente compactos

Este primer teorema es una generalización de un teorema de la sección anterior.

Teorema 2.1.1

Sean G un grupo topológico, U una vecindad de e_G y F un subconjunto compacto de G . Entonces, existe una vecindad V de e_G tal que

$$xVx^{-1} \subseteq U \quad \forall x \in F$$

Demostración:

Sea $W \subseteq G$ una vecindad simétrica de e_G , esto es que $W^3 \subseteq U$. Como

$$F \subseteq \bigcup_{x \in F} Wx$$

al tenerse que F es compacto, existen $x_1, \dots, x_k \in F$ tales que

$$F \subseteq \bigcup_{i=1}^k Wx_i$$

Sea $V = \bigcap_{i=1}^k x_i^{-1}Wx_i$. Es claro que V es una vecindad de e_G y que $V \subseteq x_i^{-1}Wx_i$, para todo $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Si $x \in F$ entonces existe $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tal que

$$x \in Wx_i$$

es decir $x = wx_i$ para algún $w \in W$. Luego,

$$\begin{aligned} xVx^{-1} &= wx_iVx_i^{-1}w^{-1} \\ &\subseteq wWw^{-1} \\ &\subseteq W^3 \\ &\subseteq U \end{aligned}$$

■

Se sabe de la sección anterior que si G es un grupo topológico y H es un subgrupo cerrado de G , entonces la función canónica $\pi : G \rightarrow G/H$ es continua y abierta. En el caso en que H sea compacto, este resultado puede mejorarse:

Teorema 2.1.2

Sea G un grupo topológico y H un subgrupo compacto de G . Entonces, la función canónica $\pi : G \rightarrow G/H$ es una función cerrada.

Demostración:

Sea $A \subseteq G$ cerrado. Para probar el resultado bastará con probar que el complemento de $\pi(A)$ es abierto en G/H . Sea $x \in G$ tal que $\pi(x) \notin \pi(A)$. Notemos que

$$\pi(A) = AH$$

donde el conjunto $AH \subseteq G$ es cerrado en G (ya que A es cerrado y H es compacto), luego como $x \notin AH$ existe un abierto $U \subseteq G$ tal que $x \in U$ y

$$U \cap AH = \emptyset$$

Afirmamos que $U^* = \pi(U)$ es un abierto que contiene a $\pi(x)$ ajeno a $\pi(A)$. En efecto, es claro que contiene a $\pi(x)$. Suponga que existe $z \in G$ tal que $\pi(z) = zH \in \pi(U) \cap \pi(A)$, luego existen $u \in U$ y $a \in A$ tales que:

$$zH = uH = aH$$

luego $a^{-1}u \in H$ de donde se sigue que $u \in AH$, es decir que $U \cap AH \neq \emptyset$. Por tanto, $\pi(U) \cap \pi(A) = \emptyset$. Así, el conjunto $G/H \setminus \pi(A)$ es abierto, luego $\pi(A)$ es cerrado. ■

Observación 2.1.1

Note que la condición de que H sea compacto es necesaria para que el conjunto AH sea cerrado.

Las propiedades de compacidad y compacidad local se heredan a espacios cocientes de G entre subgrupos cerrados H .

Teorema 2.1.3

Sean G un grupo topológico y H un subgrupo cerrado de G . Si G es compacto, entonces H y G/H también lo son. Si G es localmente compacto, entonces H y G/H también lo son.

Demostración:

Es claro que la compacidad y la compacidad local se hereda a subgrupos cerrados de G .

Dado que la función canónica $\pi : G \rightarrow G/H$ es continua y sobre, la imagen $\pi(G) = G/H$ es un conjunto compacto en G/H , es decir que G/H es compacto.

Ahora probaremos que si G es localmente compacto, entonces G/H también lo es. En efecto, suponga que G es localmente compacto. Sea $\pi(a) \in G/H$, debemos encontrar una vecindad compacta de $\pi(a)$. Como $a \in G$ existe una vecindad U de a tal que $a \in U \subseteq \bar{U}$, siendo \bar{U} compacto en G .

Como π es continua, se tiene que $\pi(\bar{U})$ es compacto en G/H , en particular, cerrado. Además, como $U \subseteq \bar{U}$, entonces

$$\pi(U) \subseteq \pi(\bar{U}) \Rightarrow \overline{\pi(U)} \subseteq \pi(\bar{U})$$

es decir, que $\pi(U)$ es una vecindad de $\pi(a)$ tal que $\overline{\pi(U)}$ es compacta (por ser un cerrado contenido en un compacto). Luego, G/H es localmente compacto. ■

Hemos usado el hecho de que si $\pi : G \rightarrow G/H$ es la función canónica y $K \subseteq G$ es compacto, entonces $\pi(K)$ es compacto en G/H . El recíproco de este resultado también es cierto con una hipótesis adicional: la imagen inversa de un compacto en el espacio cociente G/H es compacta si H es compacto. Antes de probar este resultado necesitamos de algunos hechos auxiliares.

Definición 2.1.1

Sean X y Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función continua. Decimos que f es **perfecta** si f es cerrada y todas las fibras $f^{-1}(y) \subseteq X$ son compactas para todo $y \in Y$.

El teorema 2.1.2 se puede generalizar al afirmar que la función canónica $\pi : G \rightarrow G/H$ es perfecta si el subgrupo H de G es compacto.

Se harán a continuación la prueba de algunos resultados necesarios para un teorema posterior.

Proposición 2.1.1

Si $f : X \rightarrow Y$ es una función cerrada, entonces para cualquier subespacio $L \subseteq Y$ la restricción $f_L = f|_{f^{-1}(L)} : f^{-1}(L) \rightarrow L$ es cerrada.

Demostración:

Sea $A \subseteq X$ un conjunto cerrado en X , entonces

$$\begin{aligned} f_L(A \cap f^{-1}(L)) &= f(A \cap f^{-1}(L)) \\ &= f(A) \cap L \end{aligned}$$

pues, $f(f^{-1}(L)) = L$. Por ende, como f es cerrada se sigue que $f(A) \cap L$ es cerrado en el subespacio de L de Y . Así, f_L es cerrada. ■

Proposición 2.1.2

Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función perfecta, entonces para cualquier cerrado $A \subseteq X$ y cualquier subespacio $B \subseteq Y$ las restricciones $f|_A : A \rightarrow Y$ y $f_B = f|_{f^{-1}(B)} : f^{-1}(B) \rightarrow B$ son perfectas.

Demostración:

Es claro que la restricción $f|_A$ y f_B son cerradas (siendo la última por la proposición anterior). Sea ahora $y \in Y$, se tiene:

$$f|_A^{-1}(y) = A \cap f^{-1}(y)$$

donde el conjunto de la derecha es un cerrado contenido en el compacto $f^{-1}(y)$, luego compacto. Así, $f|_A$ es perfecta.

Para f_B , veamos que si $y \in B$:

$$f_B^{-1}(y) = f^{-1}(y)$$

donde el conjunto de la derecha es compacto. Por tanto, f_B es perfecta. ■

Teorema 2.1.4

Sean X, Y espacios topológicos. Si $f : X \rightarrow Y$ es una función perfecta, entonces para todo subconjunto compacto $Z \subseteq Y$, su imagen inversa $f^{-1}(Z)$ es compacta en X . En particular, si Y es compacto, X también lo es.

Demostración:

Primero notemos que si $y \in Y$ y $U \subseteq X$ es una vecindad abierta de $f^{-1}(y)$, entonces existe una vecindad $W \subseteq Y$ de y tal que

$$f^{-1}(W) \subseteq U$$

En efecto, tomemos $W = Y \setminus f(X \setminus U)$. Claramente W es cerrada pues f es perfecta (en particular, f es cerrada) y es tal que $y \in W$. Además,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus f(X \setminus U)) &\iff f(x) \in Y \setminus f(X \setminus U) \\ &\iff f(x) \in Y \setminus f(X \setminus U) \\ &\iff f(x) \in Y \text{ y } f(x) \notin f(X \setminus U) \\ &\Rightarrow x \notin X \setminus U \\ &\iff x \in U \end{aligned}$$

por tanto, $f^{-1}(W) \subseteq W$.

Ahora, por el teorema 2.1.3 es suficiente con probar que si Y es compacto, entonces X también lo es (esto pues podemos tomar la restricción de f a U y sería una función $f|_U : U \rightarrow Y$ y el resultado se cumpliría para U). Sea \mathcal{U} una cubierta abierta de X .

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que \mathcal{U} es cerrada bajo uniones finitas (en caso de que no lo sea, podemos crear una cubierta más grande formada por todos los elementos de \mathcal{U} , al extraer la subcubierta abierta finita de esta cubierta más grande tendríamos a su vez una cubierta abierta finita del conjunto formada por una cantidad finita de elementos de \mathcal{U}). Sabemos que para toda $y \in Y$, el conjunto $f^{-1}(y)$ es compacto en X . Por ende, existe un abierto $U_y \in \mathcal{U}$ tal que

$$f^{-1}(y) \subseteq U_y$$

por lo probado anteriormente se tiene que existe un abierto $V_y \subseteq Y$ tal que $y \in V_y$ y:

$$f^{-1}(V_y) \subseteq U_y$$

como Y es compacto y la familia $\{V_y \mid y \in Y\}$ forma una cubierta abierta de Y , entonces existen $y_1, \dots, y_n \in Y$ tales que

$$Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$$

Se sigue entonces que

$$\begin{aligned} X &= f^{-1}(Y) \\ &\subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n V_{y_i}\right) \\ &\subseteq \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{y_i}) \\ &\subseteq \bigcup_{i=1}^n U_{y_i} \end{aligned}$$

luego, X es compacto. ■

Suponga que tenemos un grupo G , un subgrupo H de G y una propiedad topológica \mathcal{P} . Un problema muy conocido en la teoría de grupos topológicos es: si G/H y H tienen la propiedad \mathcal{P} , ¿también G posee la propiedad \mathcal{P} ? En este libro se responderá afirmativamente esta pregunta para varias propiedades \mathcal{P} , por ejemplo, conexidad, compacidad, etc... Comencemos con la compacidad.

Teorema 2.1.5

Sean G un grupo topológico y H un subgrupo compacto de G . Si $Q \subseteq G/H$ es compacto, entonces $P = \pi^{-1}(Q)$ es compacto, donde $\pi : G \rightarrow G/H$ es la función canónica. En particular, si G/H es compacto, entonces G también lo es.

Demostración:

Por el teorema anterior, basta con probar que π es perfecta. De un teorema anterior se tiene que π es cerrada.

Sea $x \in G$, entonces el conjunto $\pi^{-1}(\pi(x)) = xH$ que es compacto. Así, π es perfecta. ■

Corolario 2.1.1

Sea G grupo topológico y H un subgrupo cerrado de G . Entonces, $\pi : G \rightarrow G/H$ es perfecta si y sólo si H es compacto.

Demostración:

Es inmediata de la prueba del teorema anterior, pues:

$$\pi^{-1}(\pi(x)) = xH$$

Existen grupos numerables sin puntos aislados, por ejemplo, el grupo \mathbb{Z} con la p -topología. Demostraremos que tales grupos no pueden ser localmente compactos. ■

Teorema 2.1.6

Todo grupo topológico localmente compacto G tal que $|G| < \mathfrak{c}$ es discreto.

Demostración:

Suponga que G es localmente compacto y no es discreto. Entonces G no puede tener puntos aislados (pues es homogéneo). Sea U una vecindad abierta de e_G tal que $K = \overline{U}$ es compacto. ■

Como todo espacio compacto es localmente compacto, se sigue que todo grupo topológico compacto no discreto tiene cardinalidad no menor que \mathfrak{c} (por el teorema anterior). Lo mismo se cumple para los grupos numerablemente compactos (como se verá en un ejercicio posterior).

El siguiente resultado acerca de subconjuntos compactos de un grupo nos será de utilidad posteriormente.

Teorema 2.1.7

Sean G un grupo topológico, F un subconjunto compacto de G , U un subconjunto abierto de G tal que $F \subseteq U$. Entonces existe una vecindad V de e_G tal que

$$(FV) \cup (VF) \subseteq U$$

Si G es localmente compacto, entonces V se puede elegir de tal forma que ambos conjuntos \overline{FV} y \overline{VF} sean compactos.

Demostración:

Como U es abierto, entonces para cada $x \in F$ existe $W_x \subseteq U$ vecindad abierta de e_G que

$$xW_x \subseteq U$$

además, existe una vecindad V_x de e_G tal que

$$V_x^2 \subseteq W_x$$

Notemos que $\{xV_x\}_{x \in F}$ es una cubierta abierta de F luego, F por ser compacto existen $x_1, \dots, x_n \in F$ tales que

$$F \subseteq \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i}$$

Tomemos:

$$V_1 = \bigcap_{i=1}^n V_{x_i}$$

la cual es una vecindad abierta de e_G . Se tiene que:

$$\begin{aligned} FV_1 &\subseteq \left(\bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i} \right) V_1 \\ &\subseteq \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i} V_{x_i} \\ &= \bigcup_{i=1}^n x_i V_{x_i}^2 \\ &= \bigcup_{i=1}^n x_i W_{x_i} \\ &\subseteq U \\ \Rightarrow FV_1 &\subseteq U \end{aligned}$$

de forma similar obtenemos una vecindad abierta V_2 de e_G tal que $V_2 F \subseteq U$. Sea $V = V_1 \cap V_2$, se obtiene con ello que

$$(FV) \cup (VF) \subseteq U$$

Supongamos que G es localmente compacto

■