

Curso de Lógica Matemática (2024-2)

Cristo Daniel Alvarado

13 de octubre de 2024

Índice general

1. Lógica de primer orden	2
1.1. Notas viejas	2
1.2. Lista de Axiomas Lógicos	5
2. Lógica de primer orden	16
2.1. Fundamentos	16
2.2. Axiomas Lógicos	17

Capítulo 1

Lógica de primer orden

1.1. Notas viejas

Definición 1.1.1

Decimos que una fórmula φ es:

1. **Satisfacible** si existe un modelo m tal que $m \models \varphi$.
2. **Contradictoria** si todo modelo cumple que $m \not\models \varphi$.
3. **Una tautología** si todo modelo m cumple que $m \models \varphi$.

Ejemplo 1.1.1

Tomemos de ejemplo $a \Rightarrow p_1 p_2$, cualquier modelo que haga a p_1 y p_3 verdaderas, o ambas falsas satisfacen la FBF, $p_1, \neg \Rightarrow p_1 p_3$ o $\neg(p_1 \Rightarrow \neg p_1)$. Por lo cual, esta fórmula es satisfacible.

En cambio, $\neg(p_1 \Rightarrow p_1)$ es contradictoria y, por ende $p_1 \Rightarrow p_1$ y $\neg p_1 \Rightarrow \neg p_1$ son tautologías.

Definición 1.1.2

Sea Σ un conjunto de fórmulas. Decimos que Σ es

1. **Satisfacible** si existe un modelo m tal que $m \models \Sigma$.
2. **Contradictoria** si todo modelo cumple que $m \not\models \Sigma$.
3. **Una tautología** si todo modelo m cumple que $m \models \Sigma$.

Ejemplo 1.1.2

El conjunto de fórmulas $\Sigma = \{ \Rightarrow p_1 p_2, p_1, \neg p_2 \}$ no es satisfacible (en este caso, es contradictorio).

Observación 1.1.1

Se tiene lo siguiente:

1. Una tautología \Rightarrow satisfacible.
2. φ es satisfacible $\iff \neg\varphi$ es una contradicción.
3. Satisfacible es lo mismo que no contradictoria.

Definición 1.1.3

Si Σ es un conjunto de FBF y φ es alguna otra fórmula, entonces decimos que φ es **consecuencia lógica** de Σ , o que Σ **implica lógicamente** a φ , escrito como $\Sigma \models \varphi$, si para todo modelo m tal que $m \models \Sigma$ se tiene que $m \models \varphi$.

Ejemplo 1.1.3

El conjunto de FBF $\{\Rightarrow p_1 p_2, p_1\} \models p_2$.

Observación 1.1.2

Se tiene lo siguiente:

1. Un conjunto de FBF $\Sigma \not\models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es satisfacible.
2. Además, un conjunto de FBF $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible.

Lema 1.1.1

Sea Σ un conjunto de fórmulas y sean $\text{Var}(\Sigma)$ el conjunto de las variables p_i que aparecen en las fórmulas de Σ . Si m_1 y m_2 son dos modelos tales que

$$m_1|_{\text{Var}(\Sigma)} = m_2|_{\text{Var}(\Sigma)}$$

entonces, $\overline{m_1}|_{\Sigma} = \overline{m_2}|_{\Sigma}$. En particular, para cada fórmula φ que sea elemento de Σ , entonces $m_1 \models \varphi$ si y sólo si $m_2 \models \varphi$, más aún $m_1 \models \Sigma$ si y sólo si $m_2 \models \Sigma$.

Demostración:

Sin pérdida de generalidad, Σ es cerrado bajo subfórmulas.

Procederemos por inducción sobre $\varphi \in \Sigma$, demostraremos que $\overline{m_1}(\varphi) = \overline{m_2}(\varphi)$. Si φ coincide con algún p_i , entonces $p_i \in \text{Var}(\Sigma)$ y, por tanto

$$\overline{m_1}(p_i) = m_1(p_i) = m_2(p_i) = \overline{m_2}(p_i)$$

Ahora hacemos el paso inductivo.

1. Tenemos el caso en que φ es de la forma $\neg\psi$ y suponemos que $\overline{m_1}(\psi) = \overline{m_2}(\psi)$. Se tiene que $\overline{m_1}(\neg\psi) = F \iff \overline{m_1}(\psi) = V \iff \overline{m_2}(\psi) = V \iff \overline{m_2}(\neg\psi) = F$. Por lo tanto, $\overline{m_1}(\psi) = \overline{m_2}(\psi)$. El caso en que sea verdadero es análogo.
2. Tenemos el caso en que φ es de la forma $\Rightarrow \varphi_1 \psi$ y, supongamos que $\overline{m_1}(\varphi_1) = \overline{m_2}(\varphi_1)$ y $\overline{m_1}(\psi) = \overline{m_2}(\psi)$. Se tiene que $\overline{m_1}(\Rightarrow \varphi_1 \psi) = F \iff \overline{m_1}(\varphi_1) = V$ y $\overline{m_1}(\psi) = F \iff$ (por hipótesis de inducción) $\overline{m_2}(\varphi_1) = V$ y $\overline{m_2}(\psi) = F \iff \overline{m_2}(\Rightarrow \varphi_1 \psi) = F$. El caso en que sean verdaderas es análogo. Por tanto, $\overline{m_1}(\Rightarrow \varphi_1 \psi) = \overline{m_2}(\Rightarrow \varphi_1 \psi)$.

Lo cual completa el paso inductivo. ■

Corolario 1.1.1

Si Σ es un conjunto finito de fórmulas, entonces se puede verificar 'Mecánicamente' si es el caso, que $\Sigma \models \varphi$.

El procedimiento para verificar el modelo, se hace mediante la tabla de verdad de las variables y las FBF de Σ .

Definición 1.1.4

Decimos que un conjunto de fórmulas bien formadas Σ es **finitamente satisfacible** si cualquier subconjunto finito $\Delta \subseteq \Sigma$ es satisfacible.

Teorema 1.1.1 (Teorema de Compacidad de Gödel)

Si Σ es un conjunto (arbitrario) de fórmulas tal que $\Sigma \models \varphi$, entonces existe un $\Delta \subseteq \Sigma$ finito tal que $\Delta \models \varphi$.

El teorema que Gödel probó originalmente fue este:

Teorema 1.1.2 (Teorema de Gödel)

Un conjunto de fórmulas Σ es satisfacible si y sólo si es finitamente satisfacible.

Veamos por qué el teorema de Gödel implica el teorema de compacidad de Gödel. Se tiene que $\Sigma \not\models \varphi \iff$ existe un modelo m tal que $m \models \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$. Es decir, si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es satisfacible, es decir que es finitamente satisfacible (por el teorema de Gödel), es decir que para todo $\Delta \subseteq \Sigma$ finito se cumple que

$$\Delta \cup \{\neg\varphi\}$$

es satisfacible. Y esto sucede si y sólo si para todo $\Delta \subseteq \Sigma$ finito existe m tal que $m \models \Delta \cup \{\neg\varphi\}$, si y sólo si para todo $\Delta \subseteq \Sigma$ finito $\Delta \not\models \varphi$, con lo cual

$$\Sigma \not\models \varphi \iff \Delta \not\models \varphi$$

para todo $\Delta \subseteq \Sigma$ finito, que es el teorema de compacidad en su forma contrapositiva.

Lema 1.1.2

Sea Σ un conjunto finitamente satisfacible, y sea φ cualquier fórmula, entonces o bien $\Sigma \cup \{\varphi\}$ es finitamente satisfacible o $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ lo es.

Demostración:

Supongamos que no, es decir que tanto $\Sigma \cup \{\varphi\}$ como $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no son finitamente satisfacibles, por lo cual existen $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq \Sigma$ finitos tales que $\Delta_1 \cup \{\varphi\}$ y $\Delta_2 \cup \{\neg\varphi\}$ no son satisfacibles. Entonces $\Delta_1 \cup \Delta_2$ no puede ser satisfacible, pues si m es un modelo tal que $m \models \Delta_1 \cup \Delta_2$, entonces $m \models \varphi$ contradice el hecho de que $\Delta_1 \cup \{\varphi\}$ es no satisfacible y si $m \models \neg\varphi$ contradice el hecho de que $\Delta_2 \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible, siendo $\Delta_1 \cup \Delta_2 \subseteq \Sigma$, se contradice el hecho de que Σ es finitamente satisfacible. Luego se tiene el resultado. ■

Ahora procederemos a probar el teorema de Gödel.

Demostración:

Se probará la doble implicación:

\Rightarrow): Es inmediato.

\Leftarrow): Sean $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ una enumeración 'efectiva' de todas las fórmulas (chechar la observación). Recursivamente, definimos conjuntos de fórmulas $\Sigma_0 \subseteq \Sigma_1 \subseteq \dots$ tales que $\Sigma_0 = \Sigma$, y

1. Cada Σ_n es finitamente satisfacible.
2. Para cada $n \in \mathbb{N}$, o bien $\varphi_n \in \Sigma_{n+1}$ o bien $\neg\varphi_n \in \Sigma_{n+1}$

en este contexto, definimos:

$$\Sigma_{n+1} = \begin{cases} \Sigma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{si este conjunto es finitamente satisfacible} \\ \Sigma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Esta definición es consistente con la recursión por el lema anterior.

Ahora, definimos $\Sigma_\infty = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$. Analicemos a este conjunto.

1. Σ_∞ es **finitamente satisfacible**. En efecto, sea $\Delta \subseteq \Sigma$ un subconjunto finito, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\Delta \subseteq \Sigma_n$, luego como Σ_n es finitamente satisfacible, Δ es satisfacible. Por lo cual Σ_∞ es finitamente satisfacible.
2. **Para cada fórmula ψ o bien $\psi \in \Sigma_\infty$ ó $\neg\psi \in \Sigma_\infty$ y no ambas.** Esto es inmediato con la enumeración efectiva de todas las fórmulas bien formadas.
3. Σ_∞ es **maximal finitamente satisfacible**.

Sea $m : \text{Var}(\Sigma_\infty) \rightarrow \{V, F\}$, dado por $m(p_n) = V$ si y sólo si $p_n \in \Sigma_\infty$.

Se probará el siguiente lema:

Lema 1.1.3

Para cualquier fórmula ψ , $\overline{m}(\psi) = V$ si y sólo si $\psi \in \Sigma_\infty$ y $\overline{m}(\psi) = F$ si y sólo si $\neg\psi \in \Sigma_\infty$.

Demostración:

Procederemos por inducción sobre ψ .

- El caso base es inmediato por definición.
- $\overline{m}(\neg\psi) = V \iff \overline{m}(\psi) = F \iff \psi \notin \Sigma_\infty \iff \neg\psi \in \Sigma_\infty$.
- $\overline{m}(\Rightarrow \xi\psi) = F \iff \overline{m}(\xi) = F \text{ y } \overline{m}(\psi) = V \iff \neg\xi, \psi \in \Sigma_\infty \text{ si y sólo si } \Rightarrow \psi\xi \notin \Sigma_\infty$ (esto es cierto por la maximalidad de Σ_∞ al ser finitamente satisfacible).

por inducción se tiene lo deseado. ■

En conclusión, el modelo definido cumple que $m \models \psi$ si y sólo si $\psi \in \Sigma_\infty$. En particular, $m \models \Sigma$, y Σ es satisfacible. ■

Observación 1.1.3

Tuplas. Considere los números naturales. Podemos establecer una biyección entre las tuplas finitas de números naturales junto con el cero, y los números naturales, de esta forma:

Si $n \in \mathbb{N}$, por el TFA podemos expresar a $n = q_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot q_m^{\alpha_m}$. Establecemos la biyección dada como sigue: $n \mapsto (\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}, \alpha_m - 1)$. De esta forma podemos enumerar algo con tuplas. Lo que Gödel hace es que hace ciertas asignaciones: $\neg = 0$, $\Rightarrow = 1$, $2 = p_1$, $3 = p_2$, etc... Esta enumeración es llamada **enumeración de Gödel**.

Cuando decimos lo de enumeración, nos referimos a esto. Básicamente enumeramos a todas las fórmulas bien formadas. Cuando decimos que la enumeración es efectiva, hacemos referencia a que podemos hacerlo de forma mecánica.

1.2. Lista de Axiomas Lógicos

Definición 1.2.1 (Axiomas Lógicos)

Se tienen los siguientes axiomas. Cualquier fórmula que caiga en alguno de los siguientes casos.

1. $\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \varphi)$.
2. $\varphi \Rightarrow ((\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\psi)$.
3. $\varphi \Rightarrow \varphi'$ siempre que φ' sea el resultado de sustituir una subfórmula de la forma $\neg\neg\psi$ por ψ , o viceversa.
4. $\varphi \Rightarrow \varphi[\psi \Rightarrow \xi \rightsquigarrow \neg\xi \Rightarrow \neg\psi]$.
5. $\varphi \Rightarrow \varphi[\neg\psi \Rightarrow \psi \rightsquigarrow \psi]$.
6. $(\varphi \Rightarrow (\xi \Rightarrow \psi)) \Rightarrow ((\varphi \Rightarrow \xi) \Rightarrow (\varphi \Rightarrow \psi))$.

Junto con una única regla de inferencia, llamada **Modus Ponens**, la cual consiste en que

$$\frac{\varphi \Rightarrow \psi \quad \varphi}{\therefore \psi}$$

Un ejemplo de 3. sería que $(p_1 \Rightarrow p_2) \Rightarrow (p_1 \Rightarrow \neg\neg p_2)$. Cuando ponemos $[.]$ al lado de una fórmula, nos referimos a cualquier subfórmula interna dentro de la original. Cuando ponemos \rightsquigarrow es que podemos sustituir uno por otro.

Definición 1.2.2

Sea Γ un conjunto de fórmulas, y sea φ una fórmula.

1. Una **demostración** de φ a partir de Γ es una sucesión finita de fórmulas $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ tales que, para cada i se cumple una de las siguientes:
 - I) φ_i es un axioma lógico.
 - II) φ_i es un elemento de Γ .
 - III) Existen $j, k < i$ tales que: φ_j es la fórmula $\varphi_k \Rightarrow \varphi_i$.
2. φ es **demostrable a partir de Γ** , o bien φ es un **teorema de Γ** , si existe una demostración de φ a partir de Γ . Esto se simboliza por $\Gamma \vdash \varphi$.

Observación 1.2.1

$\varphi \vee \psi$ es $\neg\varphi \Rightarrow \psi$, y $\varphi \wedge \psi$ es $\neg(\psi \Rightarrow \neg\varphi)$. $\varphi \iff \psi$ es $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$

Ejemplo 1.2.1

Se cumple que $\{\neg C, A \Rightarrow C, A \vee (B \Rightarrow C), \neg C \Rightarrow (C \Rightarrow E), B\} \vdash E$. Probemos que esto es cierto:

1)	$(A \Rightarrow C) \Rightarrow (\neg C \Rightarrow \neg A)$	Ax. 4
2)	$A \Rightarrow C$	Premisa
3)	$\neg C \Rightarrow \neg A$	Modus ponens
4)	$\neg C$	Premisa
5)	$\neg A$	3,4 Modus ponens
6)	$\neg A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$	Premisa
7)	$B \Rightarrow C$	6,5 Modus ponens
8)	B	Premisa
9)	C	7,8 Modus ponens
10)	$\neg C \Rightarrow (C \Rightarrow E)$	Premisa
11)	$C \Rightarrow E$	10,4 Modus ponens
12)	E	11,9 Modus ponens
$\therefore E$		

Ejemplo 1.2.2

$\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$. En efecto:

1)	$\neg(\psi \Rightarrow \neg\varphi)$	Premisa
2)	$\neg\varphi \Rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi$	Ax. 1
3)	$(\neg\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \neg\varphi)) \Rightarrow (\neg(\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\neg\varphi)$	Ax. 4
4)	$\neg(\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\neg\varphi$	3,2 M.P.
5)	$\neg\neg\varphi$	4,1 M.P.
6)	$\neg\neg\varphi \Rightarrow \varphi$	Ax. 3
7)	φ	6,5 M.P.
$\therefore \varphi$		

esta demostración es llamada **simplificación**.

Hay varias demostraciones que son de utilidad. Como las siguientes:

Ejercicio 1.2.1

Pruebe lo siguiente:

1. $\{\varphi \Rightarrow \psi, \neg\psi\} \vdash \neg\varphi$ (llamada **Modus Tollens**).
2. $\{\varphi\} \vdash \varphi \vee \psi$ (llamada **Adición**).
3. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (llamada **Silogismo Disyuntivo**).
4. $\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$ (llamada **Conjunción**).
5. $\{\varphi \Rightarrow \psi\} \vdash \neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$. (llamada **Transposición**).

Demostración:

Probemos cada inciso.

De (1):

1)	$\varphi \Rightarrow \psi$	Premisa
2)	$(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$	Ax. 4
3)	$\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$	2,1 M.P.
4)	$\neg\psi$	Premisa
5)	$\neg\varphi$	3,4 M.P.
$\therefore \neg\varphi$		

De (2):

1)	φ	Premisa
2)	$\varphi \Rightarrow (\neg\psi \Rightarrow \varphi)$	Ax. 1
3)	$\neg\psi \Rightarrow \varphi$	2,1 M.P.
4)	$\neg\psi \Rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \Rightarrow \neg\neg\psi$	Ax.4.
5)	$\neg\varphi \Rightarrow \neg\neg\psi$	4,3 M.P.
6)	$\neg\varphi \Rightarrow \neg\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi \Rightarrow \psi$	Ax. 3
7)	$\neg\varphi \Rightarrow \psi$	6,5 M.P.
8)	$\varphi \vee \psi$	7)
$\therefore \varphi \vee \psi$		

De (3):

1)	$\varphi \vee \psi$	Premisa
2)	$\neg\varphi \Rightarrow \psi$	1)
3)	$\neg\varphi$	Premisa
4)	ψ	2,3 M.P.
$\therefore \psi$		

De (4):

1)	φ	Premisa
2)	ψ	Premisa
3)	$\psi \Rightarrow ((\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\psi)$	Ax. 2
4)	$(\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\psi$	1,3 M.P.
5)	$\psi \Rightarrow \neg\neg\psi$	Ax. 3
6)	$\neg\neg\psi$	2,5 M.P.
7)	$\neg(\psi \Rightarrow \neg\varphi) \Rightarrow \neg\varphi$	4,6 M.T.
8)	$\varphi \wedge \psi$	7)
$\therefore \varphi \wedge \psi$		

Ejercicio 1.2.2

Demuestre que existe una demostración de lo siguiente:

- $\{F \vee (G \vee H), (G \vee H) \Rightarrow (I \vee J), (I \vee J) \Rightarrow (F \vee H), \neg F\} \vdash H$.
- $\{Q \Rightarrow (R \Rightarrow S), (R \Rightarrow S) \Rightarrow T, (S \vee U) \Rightarrow \neg V, \neg V \Rightarrow (R \iff \neg W), \neg T, \neg(R \iff \neg W)\} \vdash \neg Q \wedge \neg(S \vee U)$.
- $\{A \Rightarrow B, C \Rightarrow D, \neg B \vee \neg D, \neg\neg A, (E \wedge F) \Rightarrow C\} \vdash \neg(E \wedge F)$.
- $\{E \Rightarrow (F \wedge \neg G), (F \vee G) \Rightarrow H, E\} \vdash H$.
- $\{J \Rightarrow K, J \vee (L \vee \neg L), \neg K\} \vdash \neg L \wedge \neg K$.
- $\{(R \Rightarrow \neg S) \wedge (T \Rightarrow \neg U), (V \Rightarrow \neg W) \wedge (X \Rightarrow \neg Y), (T \Rightarrow W) \wedge (U \Rightarrow S), V, R\} \vdash \neg T \wedge \neg U$.

Demostración:

De (1):

1)	F	\vee	$(G \vee H)$	Premisa
2)	G	\vee	H	Premisa
3)	$(G \vee H)$	\Rightarrow	$(I \vee J)$	Premisa
4)	$(I \vee J)$	\Rightarrow	$(F \vee H)$	Premisa
5)	F	\vee	H	Premisa
6)	$\neg F$			Premisa
7)	G	\vee	H	1,6 S.D.
8)	I	\vee	J	3,7 M.P.
9)	F	\vee	H	4,8 M.P.
10)	H			9,6 S.D.
$\therefore H$				

De (2):

1)	Q	\Rightarrow	$(R \Rightarrow S)$	Premisa
2)	$(R \Rightarrow S)$	\Rightarrow	T	Premisa
3)	$(S \vee U)$	\Rightarrow	$\neg V$	Premisa
4)	$\neg V$	\Rightarrow	$(R \iff \neg W)$	Premisa
5)	$\neg T$			Premisa
6)	$\neg(R \iff \neg W)$			Premisa
7)	$\neg\neg V$			4,6 M.T.
8)	$\neg\neg V$	\Rightarrow	V	Ax. 3.
9)	V			8,7 M.P.
10)	$\neg(S \vee U)$			3,9 M.T.
11)	$\neg(R \Rightarrow S)$			2,5 M.T.
12)	$\neg Q$			1,11 M.T.
13)	$\neg Q$	\wedge	$\neg(S \vee U)$	12,10 Conj.
$\therefore \neg Q \wedge \neg(S \vee U)$				

De (3):

1)	A	\Rightarrow	B	Premisa
2)	C	\Rightarrow	D	Premisa
3)	$\neg B$	\vee	$\neg D$	Premisa
4)	$\neg\neg A$			Premisa
5)	$(E \wedge F)$	\Rightarrow	C	Premisa
6)	$\neg\neg A$	\Rightarrow	A	Ax. 3
7)	A			6,4 M.P.
8)	B			1,7 M.P.
9)	B	\Rightarrow	$\neg\neg B$	Ax. 3
10)	$\neg\neg B$			8,9 M.P.
11)	$\neg D$			3,9 S.D.
12)	$\neg C$			2,11 M.T.
13)	$\neg(E \wedge F)$			5,12 M.T.
$\therefore \neg(E \vee F)$				

De (4):

1)	E	\Rightarrow	$(F \wedge \neg G)$	Premisa
2)	$(F \vee G)$	\Rightarrow	H	Premisa
3)	E			Premisa
4)	$F \neg G$			1,3 M.P.
5)	F			4 Simp.
6)	$F \vee G$			5 Ad.
7)	H			2,6 M.P.
$\therefore H$				

De (5):

1)	J	\Rightarrow	K	Premisa
2)	J	\vee	$(K \vee \neg L)$	Premisa
3)	$\neg K$			Premisa
4)	$\neg J$			1,3 M.T.
5)	K	\vee	$\neg L$	2,4 S.D.
6)	$\neg L$			5,3 S.D.
7)	$\neg L$	\wedge	$\neg K$	3,6 Conj.
$\therefore \neg L \wedge \neg K$				

De (6):

1)	$(R \Rightarrow \neg S)$	\wedge	$(T \Rightarrow \neg U)$	Premisa
2)	$(V \Rightarrow \neg W)$	\wedge	$(X \Rightarrow \neg Y)$	Premisa
3)	$(T \Rightarrow W)$	\wedge	$(U \Rightarrow S)$	Premisa
4)	V			Premisa
5)	R			Premisa
6)	R	\Rightarrow	$\neg S$	1 Simp.
7)	$\neg S$			6,5 M.P.
8)	V	\Rightarrow	$\neg W$	2 Simp.
9)	$\neg W$			8,4 M.P.
10)	T	\Rightarrow	W	3 Simp.
11)	$\neg W$	\Rightarrow	$\neg T$	10 Transp.
12)	$\neg T$			11,9 M.P.
13)	U	\Rightarrow	S	3 Simp.
14)	$\neg S$	\Rightarrow	$\neg U$	13 Transp.
15)	$\neg U$			14,7 M.P.
15)	$\neg T$	\wedge	$\neg U$	12,15 Conj.
$\therefore \neg T \wedge \neg U$				

Observación 1.2.2 (Conmutatividad del \wedge y \vee)

Es fácil de probar (teniendo en mente la definición) que:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi[\xi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \xi]$.
2. $\varphi \Rightarrow \varphi[\xi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \xi]$.

Demostración:

Proposición 1.2.1 (Leyes de Morgan)

Se cumplen las siguiente (denominadas Leyes de Morgan):

1. $\neg(\xi \vee \psi) \iff \neg\xi \wedge \neg\psi$.
2. $\neg(\xi \wedge \psi) \iff \neg\xi \vee \neg\psi$.

Demostración:

Lema 1.2.1

$\emptyset \vdash \varphi \Rightarrow \varphi$. Es decir, que sin premisas es válido que $\varphi \Rightarrow \varphi$.

Demostración:

Veamos que:

1)	φ	$\Rightarrow ((\psi \Rightarrow \varphi) \Rightarrow \varphi)$	Ax. 1
1)	$(\varphi \Rightarrow ((\psi \Rightarrow \varphi) \Rightarrow \varphi))$	$\Rightarrow ((\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \varphi) \Rightarrow (\varphi \Rightarrow \varphi)))$	Ax. 6
1)	$(\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \varphi))$	$\Rightarrow (\varphi \Rightarrow \varphi)$	Ax. 6
4)	φ	$\Rightarrow (\psi \Rightarrow \varphi)$	Ax. 1
4)	φ	$\Rightarrow \varphi$	4,3 M.P.
$\therefore \varphi \Rightarrow \varphi$			

Lo cual termina la prueba



Teorema 1.2.1 (Metateorema de Deducción)

Sea Σ un conjunto de fórmulas y φ, ψ dos fórmulas. Entonces, $\Sigma \vdash (\varphi \Rightarrow \psi)$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Demostración:

Probaremos las dos implicaciones:

\Rightarrow): Suponga que $\Sigma \vdash (\varphi \Rightarrow \psi)$, entonces en $\Sigma \cup \{\varphi\}$ como $\Sigma \vdash (\varphi \Rightarrow \psi)$ entonces por M.P. al tener que $\{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi\} \vdash \psi$, se sigue que $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

\Leftarrow): Supongamos que $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. La prueba se hará por inducción sobre la longitud de la demostración de ψ a partir de $\Sigma \cup \{\varphi\}$.

Sean $(\varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi)$ la demostración, Entonces, la hipótesis inductiva es que: $\Sigma \vdash \varphi \Rightarrow \varphi_k$ para $k \in \{1, \dots, n\}$.

Hay 4 casos para ψ :

1. $\psi \in \Sigma$. Se tiene que:

1)	ψ	Premisa
2)	$\psi \Rightarrow \varphi \Rightarrow \psi$	Ax. 1
3)	$\varphi \Rightarrow \psi$	2,1 M.P.
$\therefore \varphi \Rightarrow \psi$		

2. $\psi = \varphi$ En este caso lo que se quiere probar es que $\Sigma \vdash (\varphi \Rightarrow \varphi)$. Para lo cual se usa el lema anterior se tiene el resultado de forma inmediata (tomando el conjunto vacío).

3. ψ es axioma lógico. Es inmediato pues si es un axioma lógico, siempre se tiene que $\emptyset \vdash \varphi \Rightarrow \psi$. Luego, $\Sigma \vdash \varphi \Rightarrow \psi$.

4. Algún φ_i es $\varphi_k \Rightarrow \psi$. Como por inducción se tiene que $\varphi \Rightarrow \varphi_k$, en particular para i se tiene que:

1)	Premisa
2)	φ	$\Rightarrow \varphi_k$	Ax. 1
3)	φ	$\Rightarrow (\varphi_k \Rightarrow \psi)$	2,1 M.P.
3)	$(\varphi \Rightarrow (\varphi_k \Rightarrow \psi))$	$\Rightarrow ((\varphi \Rightarrow \varphi_k) \Rightarrow (\varphi \Rightarrow \psi))$	Ax. 6
3)	$(\varphi \Rightarrow \varphi_k)$	$\Rightarrow (\varphi \Rightarrow \psi)$	3,2 M.P.
3)	φ	$\Rightarrow \psi$	4,1 M.P.
$\therefore \varphi \Rightarrow \psi$			

Lo cual termina la demostración por inducción. Esto se abrevia con **P.C.**



Ejemplo 1.2.3

Considere:

1)	M	\Rightarrow	N	Premisa
2)	N	\Rightarrow	O	Premisa
3)	$(M \Rightarrow O)$	\Rightarrow	$(N \Rightarrow P)$	Premisa
4)	$(M \Rightarrow P)$	\Rightarrow	Q	Premisa
5)	M			Suposición
6)	N			1,5 M.P.
7)	O			2,6 M.P.
8)	M	\Rightarrow	O	5-7 P.C.
9)	N	\Rightarrow	P	3,8 M.P.
10)	M			Suposición.
11)	N			1,10 M.P.
12)	P			9,11 M.P.
13)	M	\Rightarrow	P	10-12 P.C.
<hr/>				
$\therefore M \Rightarrow P$				

Ejercicio 1.2.3

Complete la demostración:

1)	V	\Rightarrow	W	Premisa
2)	X	\Rightarrow	Y	Premisa
3)	Z	\Rightarrow	W	Premisa
4)	X	\Rightarrow	A	Premisa
5)	W	\Rightarrow	X	Premisa
6)	$(V \Rightarrow Y) \wedge (Z \Rightarrow A)$	\Rightarrow	$(V \vee Z)$	Premisa
7)	V			Suposición
8)	W			1,7 M.P.
9)	X			5,8 M.P.
10)	Y			2,9 M.P.
11)	V	\Rightarrow	Y	7-10 P.C.
12)	Z			Suposición
13)	W			3,12 M.P.
14)	X			5,13 M.P.
15)	A			4,14 M.P.
16)	Z	\Rightarrow	A	12-15 P.C.
17)	$(V \Rightarrow Y)$	\wedge	$(Z \Rightarrow A)$	11,16 Conj.
<hr/>				
$\therefore Y \vee A$				

Ejercicio 1.2.4

Complete las demostraciones:

1.

1)	$P \Rightarrow Q$	Premisa
2)	$Q \Rightarrow R$	Premisa
3)	P	Suposición
4)	Q	1,3 M.P.
5)	R	2,4 M.P.
6)	$P \Rightarrow R$	3-5 P.C.
$\therefore P \Rightarrow R$		

2.

1)	Q	Premisa
2)	$Q \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$	Ax. 2
3)	$P \Rightarrow Q$	2,1 M.P.
$\therefore P \Rightarrow Q$		

3.

1)	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	Premisa
2)	P	Suposición
3)	$Q \Rightarrow R$	1,2 M.P.
4)	Q	Suposición
5)	R	3,4 M.P.
6)	$P \Rightarrow R$	2-5 P.C.
7)	$Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$	6 Eje. 2
$\therefore Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$		

4.

1)	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$	Premisa
2)	P	Suposición
3)	$Q \wedge R$	1,2 M.P.
4)	Q	3 Simp.
5)	$P \Rightarrow Q$	1-4 P.C.
$\therefore P \Rightarrow Q$		

5.

1)	$(P \Rightarrow Q) \wedge (C \Rightarrow D)$	Premisa
2)	$(Q \vee D) \Rightarrow ((E \Rightarrow (E \vee F)) \Rightarrow (P \wedge C))$	Premisa
3)	$P \Rightarrow Q$	1 Simp.
4)	$C \Rightarrow D$	1 Simp.
5)	E	Suposición.
6)	$E \vee F$	5 Ad.
7)	$E \Rightarrow (E \vee F)$	5-6 P.C.
8)	P	Suposición.
9)	Q	3,5 M.P.
10)	$Q \vee D$	6 Ad.
11)	$(E \Rightarrow (E \vee F)) \Rightarrow (P \wedge C)$	7,2 M.P.
$\therefore P \iff R$		

Ejemplo 1.2.4

Este es un esquema general en el que se hacen las pruebas por contradicción:

1)	P	\vee	$(Q \wedge R)$	Premisa
2)	P	\Rightarrow	R	Premisa
3)	$\neg R$			Suposición.
4)	$\neg P$			2,3 M.T.
5)	Q	\wedge	R	4,1 S.D.
6)	R			5 Simp.
7)	R	\wedge	$\neg R$	6,3 Ad.
8)	R			3-7 P.I.
$\therefore R$				

Ejercicio 1.2.5

Complete las siguientes demostraciones:

1.

1)	$(P \vee Q)$	\Rightarrow	$(R \Rightarrow D)$	Premisa
2)	$(\neg D \vee E)$	\Rightarrow	$(P \wedge R)$	Premisa
3)	$\neg D$			Suposición
4)	$\neg D$	\vee	E	3 Ad.
5)	P	\wedge	R	2,4 M.P.
6)	P			5 Simp.
7)	P	\vee	Q	6 Ad.
8)	R	\Rightarrow	D	1,7 M.P.
9)	R			5 Simp.
10)	D			8,9 M.P.
11)	D	\wedge	$\neg D$	10, 3 Conj.
12)	$\neg \neg D$			3-11 P.I.
13)	D			12 Ax. 3
$\therefore D$				

2.

1)	$(P \vee Q)$	\Rightarrow	$(R \wedge D)$	Premisa
2)	$(R \vee F)$	\Rightarrow	$(\neg F \wedge G)$	Premisa
3)	$(F \vee H)$	\Rightarrow	$(P \wedge I)$	Premisa
4)	F			Suposición
5)	F	\vee	H	4. Ad.
6)	P	\wedge	I	3,5 M.P.
7)	P			6 Simp.
8)	P	\vee	Q	7 Ad.
9)	R	\wedge	D	7 Ad.
10)	R			9 Simp.
11)	R	\vee	F	10 Ad.
12)	$\neg F$	\wedge	G	2,11 M.P.
13)	$\neg F$			12 Simp.
14)	F	\wedge	$\neg F$	4,13 Conj.
15)	$\neg F$			4-14 P.I.
$\therefore \neg F$				

Definición 1.2.3

Teorema 1.2.2 (Teorema de Completud)

Cualquier conjunto de fórmulas Γ que sea consistente, es satisfacible.

Demostración:

■

Corolario 1.2.1

Si Γ es un conjunto de fórmulas, entonces $\Gamma \models \varphi$ implica $\Gamma \vdash \varphi$.

Demostración:

Ya construimos un conjunto Γ_∞ con $\Gamma \subseteq \Gamma_\infty$ tal que:

1. Γ_∞ es consistente.
2. Para toda fórmula φ , o bien $\varphi \in \Gamma_\infty$ ó $\neg\varphi \in \Gamma_\infty$.
3. $\varphi \in \Gamma_\infty$ si y sólo si $\Gamma_\infty \vdash \varphi$, y $\varphi \notin \Gamma_\infty$ si y sólo si $\neg\varphi \in \Gamma_\infty$, si y sólo si $\Gamma_\infty \not\vdash \varphi$ si y sólo si $\Gamma_\infty \vdash \neg\varphi$.

Definimos $M : \text{Var} \rightarrow \{V, F\}$ de tal forma que $m(p_k) = V$ si y sólo si $p_k \in \Gamma_\infty$ (de forma análoga, $m(p_k) = F$ si y sólo si $p_k \notin \Gamma_\infty$).

Afirmamos que para toda fórmula φ , se tiene que $\overline{m}(\varphi) = V$ si y sólo si $\varphi \in \Gamma_\infty$. Procederemos por inducción sobre φ .

1. Si φ es atómica, entonces se cumple por definición.
2. Paso inductivo: supongamos que se cumple para φ y ψ . Entonces,

$$\begin{aligned}\overline{m}(\neg\varphi) = V &\iff \overline{m}(\varphi) = F \\ &\iff \neg\varphi \in \Gamma_\infty\end{aligned}$$

además,

$$\begin{aligned}\overline{m}(\varphi \Rightarrow \psi) = F &\iff \overline{m}(\varphi) = V \text{ y } \overline{m}(\psi) = F \\ &\iff \varphi \in \Gamma_\infty \text{ y } \neg\psi \in \Gamma_\infty \\ &\iff \varphi \Rightarrow \psi \notin \Gamma_\infty\end{aligned}$$

probaremos una doble implicación.

\Rightarrow): Suponga que $\varphi, \neg\psi \in \Gamma_\infty$. Si $\varphi \Rightarrow \psi \in \Gamma_\infty$, entonces $\varphi \Rightarrow \psi \notin \Gamma_\infty$.

\Leftarrow): Suponga que $\varphi \Rightarrow \psi \notin \Gamma_\infty$, entonces $\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \in \Gamma_\infty$, por lo cual $\neg(\varphi \Rightarrow \neg\neg\psi) \in \Gamma_\infty$, es decir que $\varphi \wedge \neg\psi \in \Gamma_\infty$, luego $\Gamma_\infty \vdash \varphi$ y $\Gamma_\infty \vdash \neg\psi$.

por tanto, usando inducción se cumple que $m \models \Gamma_\infty$, en particular $m \models \Gamma$.

■

Capítulo 2

Lógica de primer orden

2.1. Fundamentos

Definición 2.1.1

Un lenguaje de primer orden cuenta con un alfabeto que consta de lo siguiente:

1. *Variables* (denotadas por Var), denotadas por v_1, v_2, \dots (a lo sumo una cantidad numerable).
2. *Conectivas lógicas* \neg, \Rightarrow .
3. *Símbolo de igualdad* $=$.
4. *Cuantificador* \forall , denominado **para todo**.
5. *Símbolos de predicado* (o *Símbolo de relación*), P_1, P_2, \dots
6. *Símbolos de función*, f_1, f_2, \dots
7. *Símbolos de constante* c_1, c_2, \dots

los primeros cuatro son llamados **símbolos lógicos**, y los últimos tres son llamados **símbolos no lógicos**. Puede que un lenguaje de primer orden no conste con alguno de los elementos de 5. a 7. o que conste de una cantidad finita. Cada uno de los 5. a 7. tiene asociada una **aridad** (que es un número entero).

Para que la idea quede más afianzada, se verán algunos ejemplos.

Ejemplo 2.1.1

El lenguaje de la Teoría de Grupos consta de $\{*, (\cdot)^{-1}, e\}$ donde $*$ es una función binaria, $(\cdot)^{-1}$ es una función unaria y e es una constante.

Ejemplo 2.1.2

El lenguaje de la Teoría de Anillos consta de $\{+, \cdot, 0, 1\}$ donde \cdot y $+$ son función binaria, y $0, 1$ son constantes.

Ejemplo 2.1.3

El lenguaje de la Aritmética consta de $\{+, \cdot, s, <, 1\}$, donde $+$, \cdot son funciones binarias, s es una función unaria, $<$ es una relación binaria y 1 es una constante.

Ejemplo 2.1.4

El lenguaje de la Teoría de Conjuntos, consta de $\{\in\}$, la cual es una relación binaria.

Definición 2.1.2

Definimos lo siguiente:

1. Términos son:

- I) v_i y c_i son términos.
- II) Si F_i es un símbolo de función n -aria, y t_1, \dots, t_n son términos, entonces $F_i t_1 \cdots t_n$ es un término (en notación polaca),

2. Fórmulas son:

- I) Si t_1, t_2 son términos, entonces $= t_1 t_2$ es una fórmula.
- II) Si R_i es un símbolo de relación de aridad n y tengo n -términos, entonces $R_i t_1 \cdots t_n$ es una fórmula.
- III) Si φ, ψ son fórmulas y v_i es una variable, entonces $\neg\varphi, \Rightarrow \varphi\psi$ y $\forall v_i \varphi$ son fórmulas.

Ejemplo 2.1.5

La asociatividad se puede escribir como la siguiente fórmula:

$$\forall x \forall y \forall z = * * x y z * x * y z$$

que básicamente es decir que:

$$\forall x, y, z, (x * y) * z = x * (y * z)$$

en un grupo cualquiera.

2.2. Axiomas Lógicos

Cualquier generalización de

1. Los de Lógica proposicional.
2. $(\forall x)(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\forall x \varphi \Rightarrow \forall x \psi)$.
3. $\varphi \Rightarrow \forall x \varphi$ si x no es libre en φ .
4. $x = x$.
5. $x = y \Rightarrow (\varphi \Rightarrow \varphi[y/x])$ si φ es atómica, esta sustitución es para algunas x .
6. $\forall x \varphi \Rightarrow \varphi[t/x]$ si t es sustituble por x .

Reglas de inferencia: M.P.

Teorema 2.2.1 (Metateorema)

Se tiene lo siguiente:

1. **Instanciación universal.** Si $\Sigma \vdash (\forall x)\varphi$ entonces, $\Sigma \vdash \varphi[t/x]$ siempre que t sea sustituible por x en φ .

2. **Generalización existencial.** Si $\Sigma \vdash \varphi[t/x]$ entonces, $\Sigma \vdash (\exists x)\varphi$ siempre que t sea sustituible por x en φ .

Demostración:

De (1): Como $\Sigma \vdash (\forall x)\varphi$, entonces existe una demostración que prueba $(\forall x)\varphi$. Por el axioma (5), se tiene que al ser t sustituible: $\forall x\varphi \Rightarrow \varphi[t/x]$, luego existe una demostración que prueba a $\varphi[t/x]$, añadiendo esta línea al teorema anterior, se sigue que $\Sigma \vdash \varphi[t/x]$.

De (2): Como $\Sigma \vdash \varphi[t/x]$, entonces existe una demostración que prueba $\Sigma \vdash \varphi[t/x]$. Procederemos por contradicción. Suponga que $\neg(\exists x)\varphi$, es decir $\neg(\exists x)\neg\neg\varphi$, luego $(\forall x)\neg\varphi$. Por (1), se sigue que $\neg\varphi[t/x]$, lo que es una contradicción del renglón de arriba.

Luego, $(\exists x)\varphi$. ■

Ejercicio 2.2.1

Demuestre que existe una demostración formal de validez para lo siguiente:

1. $(\forall x)(Px \Rightarrow Qx) / \therefore Pc \Rightarrow ((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy) \Rightarrow Sc)$.
2. $(\forall x)(Px \Rightarrow (\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)) / \therefore (\forall x)Px \Rightarrow (\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)$.
3. $(\exists x)Px \Rightarrow (\exists y)Qy / \therefore (\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$.

Demostración:

De (1):

No.		
1)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Qx)$	Premisa
2)	Pc	Hipótesis
3)	$(\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)$	Hipótesis
4)	$Pc \Rightarrow Qc$	1 I.U.
5)	$Qc \Rightarrow Sc$	3 I.U.
6)	$Qc \Rightarrow Sc$	4,5, S.H.
7)	Sc	6,2 M.P.
8)	$(\forall y)(Qy \Rightarrow Sy) \Rightarrow Sc$	3-7 P.C.
9)	$Pc \Rightarrow ((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy) \Rightarrow Sc)$	2-8 P.C.
$\therefore Pc \Rightarrow ((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy) \Rightarrow Sc)$		

De (2):

No.		
1)	$(\forall x)(Px \Rightarrow (\forall y)(Qy \Rightarrow Sy))$	Premisa
2)	$(\forall x)Px$	Hipótesis
3)	$(\forall x)(Px \Rightarrow (\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)) \Rightarrow ((\forall x)Px \Rightarrow (\forall x)((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)))$	1 Ax. 1
4)	$(\forall x)Px \Rightarrow (\forall x)((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy))$	1,3 M.P.
5)	$(\forall x)((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy))$	2,4 M.P.
6)	$(\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)$	5 I.U.
7)	$(\forall x)Px \Rightarrow ((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy))$	2-6 P.C.
$\therefore (\forall x)Px \Rightarrow ((\forall y)(Qy \Rightarrow Sy))$		

De (3):

No.		
1)	$(\exists x)Px \Rightarrow (\exists y)Qy$	Premisa
2)	$\neg(\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$	Negación
3)	$\neg(\exists x)(\neg\neg(Px \Rightarrow (\exists y)Qy))$	2 Ax.
4)	$(\forall x)(\neg(Px \Rightarrow (\exists y)Qy))$	Equiv.
5)	$(\forall x)(\neg(\exists y)Qy \Rightarrow \neg Px)$	Equiv.
6)	$(\forall x)((\forall y)\neg Qy \Rightarrow \neg Px)$	Equiv.
7)	$(\forall x)(\forall y)\neg Qy \Rightarrow (\forall x)\neg Px$	Equiv.
8)	$(\forall y)\neg Qy \Rightarrow (\forall x)(\forall y)\neg Qy$	Ax.2
9)	$(\forall y)\neg Qy \Rightarrow (\forall x)\neg Px$	7,8 I.U.
10)	$\neg((\exists y)Qy) \Rightarrow \neg((\exists x)Px)$	Equiv
11)	$(\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$	2-10 Contradicción
$\therefore (\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$		

Alternativa (y correcta):

No.		
1)	$(\exists x)Px \Rightarrow (\exists y)Qy$	Premisa
2)	Px	Hipótesis
3)	$(\exists x)Px$	2 G.E.
4)	$(\exists y)Qy$	3,1 M.P.
5)	$(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$	2-4 P.C.
6)	$(\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$	5 G.E.
$\therefore (\exists x)(Px \Rightarrow (\exists y)Qy)$		

Observación 2.2.1

S.H. significa silogismo hipotético. El I.U (Instanciación universal) y G.E (generalización existencial) son: $(\forall x)\varphi \Rightarrow \varphi[t/x]$ y $\varphi[t/x] \Rightarrow (\exists x)\varphi$.

Faltan dos reglas por demostrar. Considere Σ un conjunto de fórmulas.

1. **Generalización universal** (G.U.) Si x no aparece libre en ninguna fórmula de Σ , se tiene que $\varphi \Rightarrow \forall x\varphi$.
2. **Instanciación existencial** (I.E.) Se expresa en tabla como sigue:

No.		
1)	$\exists x\varphi$	
2)	$\varphi[w/x]$	
\vdots	\vdots	
n)	ψ	w no es libre en ninguna fórmula de Γ ni en $\exists x\varphi$ y ψ
n+1)	ψ	
$\therefore \psi$		

Lema 2.2.1 (Lema al metateorema)

Si Γ es un conjunto de fórmulas tal que $\Gamma \vdash (\forall y)\varphi$ y ζ no aparece libre en Γ y es sustituible en φ , entonces $\Gamma \vdash (\forall \zeta)\varphi[\zeta/x]$.

Demostración:

No.		
\vdots	\vdots	Premisas de Γ
$k)$	$(\forall x)\varphi$	
$k+1)$	$\varphi[\zeta/x]$	I.U.
$k+2)$	$(\forall \zeta)\varphi[\zeta/x]$	G.U.
$\therefore (\forall \zeta)\varphi[\zeta/x]$		

■

Teorema 2.2.2 (Metateorema)

Se tiene lo siguiente:

1. Si Γ es un conjunto de fórmulas, x es una variable que no aparece libre en Γ y $\Gamma \vdash \varphi$, entonces $\Gamma \vdash (\forall x)\varphi$.
2. Si $\Gamma \cup \{\varphi[w/x]\} \vdash \psi$ entonces, $\Gamma \cup \{(\exists x)\varphi\} \vdash \psi$ siempre y cuando w no aparezca libre en Γ ni en ψ .

Demostración:

De (1): Mostraremos que el conjunto

$$\{\varphi \mid \Gamma \vdash (\forall x)\varphi\}$$

incluye a Γ , todos los axiomas lógicos y, además, es cerrado bajo M.P.

- **Axiomas Lógicos:** Por definición si φ es axioma lógico entonces $(\forall x)\varphi$ también lo es.
- **Elementos de Γ .** Entonces,

No.		
1)	φ	Premisa
2)	$\varphi \Rightarrow (\forall x)\varphi$	Ax.2
3)	$(\forall x)\varphi$	1,2 M.P.
$\therefore (\forall x)\varphi$		

- **Cerrado bajo M.P.** Supongamos que

$$\Gamma \vdash (\forall x)\varphi \quad \Gamma \vdash (\forall x)(\varphi \Rightarrow \psi)$$

Es decir:

No.			
\vdots	\vdots		\vdots
$k)$	$(\forall x)\varphi$		
\vdots	\vdots		\vdots
$n)$	$(\forall x)(\varphi \Rightarrow \psi)$		
\vdots	\vdots		\vdots
$n+1)$	$(\forall x)(\varphi \Rightarrow \psi)$	$\Rightarrow ((\forall x)\varphi \Rightarrow (\forall x)\psi)$	Ax.1
$n+2)$	$(\forall x)\varphi \Rightarrow (\forall x)\psi$		M.P.
$n+3)$	$(\forall x)\psi$		M.P.
$\therefore (\forall x)\psi$			

lo cual prueba la cerradura.

Luego, por todos los casos, se sigue que $\Gamma \vdash (\forall x)\varphi$.

De (2): Procederemos por contradicción.

No.		
\vdots	\vdots	Premisas de Γ
k)	$(\exists x)\varphi$	
$k+1$)	$\neg\psi$	Suposición
\vdots	\vdots	Lineas para probar lo de abajo
n)	$\varphi[w/x] \Rightarrow \psi$	Prueba condicional
$n+1$)	$\neg\varphi[w/x]$	M.T.
$n+2$)	$(\forall w)\neg\varphi[w/x]$	G.U.
$n+3$)	$(\exists w)\varphi[w/x]$	Por k y el lema anterior
$n+4$)	ψ	Contradicción $k+1$)- $n+3$)
$\therefore \psi$		

■

Ejercicio 2.2.2

Muestre que existe una demostración en las siguientes fórmulas.

Demostración:

a):

No.		
1)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Qx)$	Premisa
2)	Sx	Suposición
3)	$(\forall y)(Sy \Rightarrow Py)$	Suposición
4)	$Sx \Rightarrow Px$	
5)	Px	
6)	$Px \Rightarrow Qx$	
7)	Qx	
8)	$(\forall y)(Sy \Rightarrow Py) \Rightarrow Qx$	P.C.
9)	$Sx \Rightarrow ((\forall y)(Sy \Rightarrow Py) \Rightarrow Qx)$	P.C.
10)	$(\forall x)(Sx \Rightarrow ((\forall y)(Sy \Rightarrow Py) \Rightarrow Qx))$	G.U.
$\therefore (\forall z)(Sz \Rightarrow ((\forall y)(Sy \Rightarrow Py) \Rightarrow Qx))$		

b):

No.		
1)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Qx)$	Premisa
2)	$(\forall x)(Sx \Rightarrow Tx)$	Premisa
3)	$(\forall x)(Qx \Rightarrow Sx)$	Suposición
4)	$Qy \Rightarrow Sy$	I.U.
5)	$Py \Rightarrow Qy$	I.U.
6)	$Py \Rightarrow Sy$	
7)	$Sy \Rightarrow Ty$	I.U.
8)	$Py \Rightarrow Ty$	
9)	$(\forall y)(Py \Rightarrow Ty)$	G.U.
10)	$(\forall x)(Qx \Rightarrow Sx) \Rightarrow (\forall y)(Py \Rightarrow Ty)$	3-10 P.C.
$\therefore (\forall x)(Qx \Rightarrow Sx) \Rightarrow (\forall y)(Py \Rightarrow Ty)$		

c):

No.		
1)	$(\exists x)Px$	Premisa
2)	$(\exists x)Px \wedge (\exists x)Sx$	Premisa
3)	$(\exists x)Px$	Simp.
4)	Pz	I.U.
5)	$(\forall y)((Py \vee Qy) \Rightarrow Sy)$	M.P.
6)	$(Pz \vee Qz) \Rightarrow Sz$	I.U.
7)	$(Pz \vee Qz)$	Ad.
8)	Sz	M.P.
9)	$Pz \wedge Sz$	Conj.
10)	$(\exists x)(Px \wedge Sx)$	G.E.
11)	$(\exists x)(Px \wedge Sx)$	5-10 I.E.
$\therefore (\exists x)(Px \wedge Sx)$		

d):

No.		
1)	$(\exists x)Px$	Premisa
2)	$(\exists x)(Px \wedge Qx)$	Sup
3)	$Pu \wedge Qu$	I.E.
4)	Pu	Simp
5)	$(\exists x)Px$	G.E.
6)	$(\forall y)(Qy \Rightarrow Sy)$	M.P.
7)	$Qu \Rightarrow Su$	M.P.
8)	Qu	M.P.
9)	Su	Simp.
10)	$Pu \wedge Su$	Ad.
11)	$(\exists y)(Py \wedge Sy)$	I.E.
12)	$(\exists x)(Px \wedge Qx) \Rightarrow (\exists y)(Py \wedge Sy)$	P.C.
$\therefore (\exists x)(Px \wedge Qx) \Rightarrow (\exists y)(Py \wedge Sy)$		

e):

No.		
1)	$(\forall x)(\exists y)(Px \vee Qy)$	Premisa
1)	$\neg(\forall x)Px$	Sup.
1)	$(\exists x)\neg Px$	
1)	$\neg Px$	
1)	$(\exists y)(Px \vee Qy)$	
1)	$Px \vee Qy$	
1)	Qy	
1)	$(\exists y)Qy$	I.E.
1)	$\neg(\forall x)Px \Rightarrow (\exists y)Qy$	I.E.
1)	$(\forall x)Px \vee (\exists y)Qy$	P.C.
$\therefore (\forall x)Px \vee (\exists y)Qy$		

f):

No.		
1)	$(\exists x)Px \vee (\forall y)(Py \Rightarrow Qy)$	Premisa
2)	$(\forall x)(Sx \Rightarrow \neg Px)$	Premisa
3)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Sx)$	Sup.
4)	$Py \Rightarrow Sy$	I.U.
5)	Py	Sup.
6)	Sy	
7)	$Sy \Rightarrow \neg Py$	
8)	$\neg Py$	
9)	$Py \wedge \neg Py$	
10)	$\neg Py$	P.I.
11)	$(\forall y)\neg Py$	I.U.
12)	$\neg(\exists x)Px$	11
13)	$(\forall y)(Py \Rightarrow Qy)$	
14)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Sx)$	$\Rightarrow (\forall y)(Py \Rightarrow Qy)$
		$\therefore (\forall x)(Px \Rightarrow Sx) \Rightarrow (\forall y)(Py \Rightarrow Qy)$

g):

No.		
1)	$(\exists x)Px \vee (\exists y)Qy$	Premisa
1)	$(\forall x)(Px \Rightarrow Qx)$	Premisa
1)	$\neg(\exists y)Qy$	Sup.
1)	$(\exists x)Px$	
1)	Pu	
1)	$Pu \Rightarrow Qu$	
1)	Qu	
1)	$(\exists y)Qy$	
1)	$(\exists y)Qy \wedge \neg(\exists y)Qy$	
1)	$(\exists y)Qy$	P.I.
		$\therefore (\exists y)Qy$

h):

No.		
1)	$x = x$	Ax. 4
1)	$(\forall x)x = x$	G.U.
		$(\forall x)(x = x)$

i):

No.		
1)	$x = y$	Sup.
1)	$(\forall x)(x = x)$	
1)	$x = x$	
1)	$x = x$	$\Rightarrow (y = x)$ Ax.
1)	$y = x$	M.P.
1)	$(x = y)$	$\Rightarrow (y = x)$ P.C.
1)	$(\forall y)(x = y) \Rightarrow (y = x)$	G.U.
1)	$(\forall x)(\forall y)(x = y) \Rightarrow (y = x)$	G.U.
		$(\forall x)(\forall y)(x = y \Rightarrow y = x)$

j):

No.		
1)	$u = v$	Sup.
2)	$v = w$	Sup.
3)	$u = u$	Ax.
4)	$u = v$	Ax.
5)	$u = w$	Ax.
6)	$v = w \Rightarrow u = w$	P.C.
7)	$u = v \Rightarrow (v = w \Rightarrow u = w)$	P.C.
8)	$(\forall z)(u = v \Rightarrow (v = z \Rightarrow u = z))$	G.U.
9)	$(\forall y)(\forall z)(u = y \Rightarrow (y = z \Rightarrow u = z))$	G.U.
10)	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x = y \Rightarrow (y = z \Rightarrow x = z))$	G.U.
$\therefore (\forall x)(\forall y)(\forall z)(x = y \Rightarrow (y = z \Rightarrow x = z))$		

k):

No.		
1)	$x = z$	Sup.
1)	$y = w$	Sup.
1)	$P(x, y)$	Sup.
1)	$P(z, y)$	Ax. 4
1)	$P(z, w)$	Ax. 4
1)	$P(x, y) \Rightarrow P(z, w)$	P.C.
1)	$y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))$	P.C.
1)	$x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w)))$	P.C.
1)	$(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))))$	G.U.
$\therefore (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (P(x, y) \Rightarrow P(z, w))))$		

l):

No.		
1)	$x = z$	Sup.
1)	$y = w$	Sup.
1)	$f(x, y) = f(x, y)$	Ax.4
1)	$f(x, y) = f(z, y)$	Ax.5
1)	$f(x, y) = f(z, w)$	Ax.5
1)	$y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))$	P.C.
1)	$x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w)))$	P.C.
1)	$(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))))$	G.U.
1)	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))))$	G.U.
$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall w)(x = z \Rightarrow (y = w \Rightarrow (f(x, y) = f(z, w))))$		

m):

No.		
1)	$(\exists x)(\varphi(x) \vee \psi)$	Sup.
2)	$\varphi(x) \vee \psi$	I.E.
3)	$\psi \vee \varphi(x)$	
4)	$\neg\psi \Rightarrow \varphi(x)$	
5)	$\neg\psi$	Sup.
6)	$\varphi(x)$	Sup.
7)	$(\exists x)\varphi(x)$	I.E.
8)	$(\exists x)\varphi(x)$	
9)	$\neg\psi \Rightarrow (\exists x)\varphi(x)$	P.C.
10)	$\psi \vee ((\exists x)\varphi(x))$	
11)	$((\exists x)\varphi(x)) \vee \psi$	
12)	$(\exists x)(\varphi(x) \vee \psi) \Rightarrow (((\exists x)\varphi(x)) \vee \psi)$	P.C.
13)	$((\exists x)\varphi(x)) \vee \psi$	Sup.
14)	$\psi \vee ((\exists x)\varphi(x))$	
15)	$\neg\psi \Rightarrow ((\exists x)\varphi(x))$	
16)	$\neg\psi$	Sup.
17)	$((\exists x)\varphi(x))$	M.P.
18)	$\varphi(x)$	I.E.
19)	$\neg\psi \Rightarrow \varphi(x)$	P.C.
20)	$\psi \vee \varphi(x)$	
21)	$(\exists x)(\psi \vee \varphi(x))$	G.E.
22)	$(\exists x)(\psi \vee \varphi(x))$	
23)	$((\exists x)\varphi(x)) \vee \psi \Rightarrow (\exists x)(\psi \vee \varphi(x))$	P.C.
24)	$(\exists x)(\varphi(x) \vee \psi) \iff (((\exists x)\varphi(x)) \vee \psi)$	
	$(\exists x)(\varphi(x) \vee \psi) \iff (((\exists x)(\varphi(x))) \vee \psi)$	

Esta también se puede hacer por contradicción. ■