

Notas de Álgebra Moderna IV. Módulos.

Cristo Daniel Alvarado

1 de noviembre de 2024

Índice general

1. Módulos, Homomorfismos y Secuencias exactas	2
1.1. Módulos y homomorfismos	2
1.2. Secuencias Exactas	9
1.3. Ejercicios	12
2. Módulos Libres y Espacios Vectoriales	16
2.1. Conceptos Fundamentales	16
2.2. Referencias	17

Capítulo 1

Módulos, Homomorfismos y Secuencias exactas

1.1. Módulos y homomorfismos

Los módulos son una generalización de los grupos abelianos y los enteros (los cuales son módulos sobre \mathbb{Z}).

Definición 1.1.1

Sea R un anillo no trivial. Decimos que R es un **anillo de división**, si R es unitario y para cada $a \in A$ existe $a^{-1} \in A$.

Si R es conmutativo, entonces R es un **campo**.

Definición 1.1.2

Sea R un anillo, un **R -módulo (izquierdo)** es un grupo abeliano A junto con una función $\cdot : R \times A \rightarrow A$ (denotada simplemente por $(r, a) \mapsto ra$) tal que para todo $r, s \in R$ y para todo $a \in A$:

$$(1) \quad r(a + b) = ra + rb.$$

$$(2) \quad (r + s)a = ra + sa.$$

$$(3) \quad r(sa) = (rs)a.$$

si R además tiene elemento identidad 1_R y se cumple que

$$(4) \quad 1_R a = a, \text{ para todo } a \in A.$$

entonces decimos que A es un **R -módulo unitario (izquierdo)**. En caso de que R sea un anillo de división, el módulo unitario A será llamado **espacio vectorial (izquierdo)**.

De forma análoga podemos definir los R -módulos derechos, cambiando el orden en el que se hacen las operaciones. Sin embargo, a lo largo del texto solo trabajaremos con módulos izquierdos y todos los resultados que se prueben para esto, también se cumplirán para los derechos.

Ejercicio 1.1.1

Sea A un R -módulo izquierdo. Si R es conmutativo, podemos hacer de A un R -módulo derecho

definiendo:

$$ar = ra, \quad \forall a \in A \text{ y } \forall r \in R$$

Demostración:

Considere la función de $\cdot : A \times R \rightarrow A$ dada por:

$$(a, r) \mapsto ar = ra, \quad \forall (a, r) \in A \times R$$

Afirmamos que esta función hace de A un R -módulo derecho. En efecto, debemos verificar tres condiciones, sean $r, s \in R$ y $a, b \in A$:

(1) Se tiene que:

$$\begin{aligned}(a + b)r &= r(a + b) \\ &= ra + rb \\ &= ar + br\end{aligned}$$

(2) Se tiene que:

$$\begin{aligned}a(r + s) &= (r + s)a \\ &= ra + sa \\ &= ar + as\end{aligned}$$

(3) Se tiene que:

$$\begin{aligned}(as)r &= r(as) \\ &= r(sa) \\ &= (rs)a, \text{ como } R \text{ es conmutativo:} \\ &= (sr)a \\ &= a(sr)\end{aligned}$$

por los tres incisos anteriores se sigue que A es un R -módulo derecho. ■

Observación 1.1.1

A menos que se especifique lo contrario, todo R -módulo A sobre un anillo conmutativo R será izquierdo y derecho haciendo:

$$ra = ar, \quad \forall a \in A \text{ y } \forall r \in R$$

Observación 1.1.2

Denotaremos al elemento identidad de un R -módulo A por 0_A , y al elemento neutro de R por 0_R .

Proposición 1.1.1

Sea A un R -módulo, entonces:

$$r0_A = 0_A \quad \text{y} \quad 0_R a = 0_A$$

para todo $r \in R$ y para todo $a \in A$.

Demostración:

Sea $r \in R$, se tiene que:

$$r0_A = r(0_A + 0_A) = r0_A + r0_A \Rightarrow r0_A = 0_A$$

y, para todo $a \in A$:

$$0_R a = (0_R + 0_R)a = 0_R a + 0_R a \Rightarrow 0_R a = 0_A$$

■

Por lo que, en lo que sigue del texto se denotará por 0 a $0_A, 0_R, 0 \in \mathbb{Z}$ y al módulo trivial $\{0\}$.

Ejemplo 1.1.1

Todo grupo abeliano G es un \mathbb{Z} módulo unitario izquierdo (en particular, puede ser derecho por ser abeliano), bajo la operación $(n, a) \mapsto na$, siendo na la suma de a consigo mismo n -veces.

Ejemplo 1.1.2

Si S es un anillo y R es un subanillo, entonces S es un R -módulo (pero no al revés, ya que puede que la operación se salga de S) con ra siendo $r \in R$ y $a \in S$. En particular, los anillos:

$$R[x_1, \dots, x_n] \quad \text{y} \quad R[[x]]$$

son R -módulos, los cuáles son unitarios si R posee identidad.

Ejemplo 1.1.3

Sean R, S anillos y $\varphi : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos. Entonces todo S -módulo puede hacerse un R -módulo definiendo rx (con $x \in A$) por $\varphi(r)x$, esto es:

$$rx = \varphi(r)x$$

donde la operación de la derecha se toma en el S -módulo, A . En este caso se dice que la estructura de R -módulo de A está dada por el **pullback a lo largo de φ** .

Definición 1.1.3

Sean A y B módulos sobre un anillo R . Una función $f : A \rightarrow B$ es un **homomorfismo de R -módulos**, si para todo $a, b \in A$ y para todo $r \in R$ se tiene que:

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \text{y} \quad f(ra) = rf(a)$$

si R es un anillo de división, entonces f es llamada **transformación lineal**.

En el contexto actual, los homomorfismos de R -módulos serán simplemente llamados homomorfismos. Se adopta la misma terminología de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. Se define también de forma análoga el **núcleo** o **kernel** de f por:

$$\ker(f) = \left\{ a \in A \mid f(a) = 0 \right\}$$

con lo que se tienen los siguientes resultados (que provienen directamente de lo probado en anillos):

Teorema 1.1.1

Sean A y B dos R -módulos y $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo.

(a) f es monomorfismo si y sólo si $\ker(f) = \{0\}$.

(b) f es isomorfismo si y sólo si existe un homomorfismo de R -módulos $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \mathbb{1}_A$ y $f \circ g = \mathbb{1}_B$.

Ejemplo 1.1.4

Todo homomorfismo entre grupos abelianos es un homomorfismo de \mathbb{Z} -módulos.

Ejemplo 1.1.5

Si R es un anillo, la función de $R[x]$ en $R[x]$ dada por: $f(x) \mapsto xf(x)$ es un homomorfismo de R -módulos, pero no es un homomorfismo de anillos (no separa productos).

Observación 1.1.3

Para un anillo R dado, la clase de todos los R -módulos forma una categoría concreta, denotada por \mathcal{M}_R para los módulos derechos y ${}_R\mathcal{M}$ para los izquierdos.

Definición 1.1.4

Sea R un anillo, A un R -módulo y $B \subseteq A$ un subconjunto no vacío. Se dice que B es un **submódulo de A** si B es un subgrupo aditivo de A y, para todo $r \in R$ se tiene que:

$$rb \in B, \quad \forall b \in B$$

un submódulo de un espacio vectorial es llamado **subespacio vectorial**.

Observación 1.1.4

Todo submódulo es en sí mismo un módulo. Todo submódulo de un módulo unitario es también unitario.

Ejemplo 1.1.6

Si $\{B_i \mid i \in I\}$ es una familia de submódulos de un módulo A , entonces $\bigcap_{i \in I} B_i$ es un submódulo de A .

Definición 1.1.5

Sea A un R -módulo y $X \subseteq A$, entonces la intersección de todos los submódulos que contienen a X es llamado el **submódulo generado por X** .

Si X es finito y X genera al módulo B , se dice que B es **finitamente generado**. Si X tiene un solo elemento, se dice que B es un **módulo cíclico**.

Si $\{B_i\}_{i \in I}$ es una familia de submódulos de A , entonces el submódulo generado por $\bigcup_{i \in I} B_i$ es llamado la **suma de los módulos B_i** . Si el conjunto I es finito, esto se denota por:

$$B_1 + \cdots + B_n$$

Teorema 1.1.2

Sea R un anillo, A un R -módulo, $X \subseteq A$, $\{B_i\}_{i \in I}$ una familia de submódulos de A y $a \in A$. Tomemos $Ra = \{ra \mid r \in R\}$.

(a) Ra es un submódulo de A y la función de R en Ra dada por $r \mapsto ra$ es un epimorfismo de R -módulos.

(b) El submódulo cíclico C generado por a es

$$\left\{ ra + na \mid r \in R, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

si R tiene identidad y C es unitario, entonces $C = Ra$.

(c) El submódulo D generado por X es:

$$\left\{ \sum_{i=1}^s r_i a_i + \sum_{j=1}^t n_j b_j \mid s, t \in \mathbb{N}^*; a_i, b_j \in X; r_i \in R; n_j \in \mathbb{Z} \right\}$$

si R tiene identidad y A es unitario, entonces:

$$D = RX = \left\{ \sum_{i=1}^s r_i a_i \mid i \in \mathbb{N}^*; r_i \in R; a_i \in X \right\}$$

(d) La suma de la familia $\{B_i \mid i \in I\}$ consiste de todas las sumas finitas $b_1 + \cdots + b_{i_n}$ con $b_{i_k} \in B_{i_k}$ para todo $k = 1, \dots, n$.

Demostración:

De (a): Veamos que Ra es un R -módulo. Claramente $s(ra)$ está bien definida (sigue en Ra ya que A es un R -módulo). Veamos que:

- Sean $ra, sa \in Ra$, entonces:

$$t(ra + sa) = t(ra) + t(sa)$$

- Sean $r, s \in R$ y $ta \in Ra$, entonces:

$$\begin{aligned} (r + s)(ta) &= ((r + s)t)a \\ &= (rt + st)a \\ &= (rt)a + (st)a \\ &= r(ta) + s(ta) \end{aligned}$$

- Sean $r, s \in R$ y $ta \in Ra$, entonces:

$$\begin{aligned} r(s(ta)) &= r((st)a) \\ &= (r(st))a \\ &= ((rs)t)a \\ &= (rs)(ta) \end{aligned}$$

por tanto, Ra es un R -módulo. Claramente la función $r \mapsto ra$ es un epimorfismo de módulos.

De (b): Sea C el submódulo cíclico generado por a , esto es, es la intersección de todos los submódulos que contienen a a . ■

Teorema 1.1.3

Sea B un submódulo de un módulo A sobre un anillo R . Entonces, el grupo cociente A/B es un R -módulo con la acción de R en A/B dada por:

$$r(a + B) = ra + B, \quad \forall r \in R \text{ y } \forall a \in A$$

la función $\pi : A \rightarrow A/B$ dada por $a \mapsto a + B$ es un epimorfismo de R -módulos con kernel B .

Demostración:

Como B es submódulo de A , en particular es subgrupo del grupo abeliano A , por lo que el grupo cociente A/B está bien definido. Consideremos ahora la operación

$$(r, a + B) \mapsto r(a + B) = ra + B$$

de $R \times A/B$ en A/B . Afirmamos que esta función está bien definida. En efecto, si $a, a' \in A$ son tales que $a - a' \in B$, entonces al ser B submódulo de A , se sigue que $r(a - a') = ra - ra' \in B$, lo cual implica que:

$$ra + B = ra' + B$$

así, la acción está bien definida. Veamos ahora que A/B es un R -módulo. En efecto, hay que verificar tres condiciones:

(a) Sean $r \in R$ y $a, c \in A$. Entonces:

$$\begin{aligned} r[(a + B) + (c + B)] &= r[a + c + B] \\ &= r(a + c) + B \\ &= ra + rc + B \\ &= (ra + B) + (rc + B) \\ &= r(a + B) + r(c + B) \end{aligned}$$

(b) Sean $r, s \in R$ y $a \in A$. Entonces:

$$\begin{aligned} (r + s)(a + B) &= (r + s)a + B \\ &= ra + sa + B \\ &= (ra + B) + (sa + B) \\ &= r(a + B) + s(a + B) \end{aligned}$$

(c) Sean $s, t \in R$ y $a \in A$. Entonces:

$$\begin{aligned} r(s(a + B)) &= r(sa + B) \\ &= r(sa) + B \\ &= (rs)a + B \\ &= (rs)(a + B) \end{aligned}$$

por los incisos anteriores se sigue que A/B es un R -módulo. Ya se sabe que $\pi : A \rightarrow A/B$ es un epimorfismo de grupos, para ver que lo es de R -módulos, veamos que:

$$\begin{aligned} \pi(r(a + B)) &= \pi(ra + B) \\ &= ra \\ &= r\pi(a + B) \end{aligned}$$

para todo $a \in A$ y para todo $r \in R$. Por ende, π es un epimorfismo de R -módulos. ■

También se cumplen los teoremas de isomorfismos, que solo se van a enlistar (después se van a probar, solo falta con ver que es homomorfismo de R -módulos dependiendo del caso).

Teorema 1.1.4 (Primer Teorema de Isomorfismo)

Sea R un anillo, $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo de R -módulos y C un submódulo de $\ker f$. Entonces, existe un único homomorfismo de R -módulos $\bar{f} : A/C \rightarrow B$ tal que

$$\bar{f}(a + C) = f(a), \quad \forall a \in A$$

además, $\text{Im } \bar{f} = \text{Im } f$ y $\ker \bar{f} = \ker f / C$. Además, \bar{f} es un isomorfismo de R -módulos si y sólo si f es un epimorfismo de R -módulos tal que $C = \ker f$. En particular,

$$A / \ker f \cong \text{Im } f$$

Corolario 1.1.1

Sea R un anillo, A' un submódulo del R -módulo A y B' submódulo del R -módulo B y $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo de R -módulos tal que $f(A') \subseteq B'$. Entonces, f induce un homomorfismo de R -módulos $\bar{f} : A/A' \rightarrow B/B'$ dado por:

$$a + A' \mapsto f(a) + B'$$

\bar{f} es un isomorfismo de R -módulos si y sólo si $\text{Im } f + B' = B$ y $f^{-1}(B') \subseteq A'$. En particular, si f es un epimorfismo tal que $f(A') = B'$ y $\ker f \subseteq A'$ entonces \bar{f} es un isomorfismo de R -módulos.

Teorema 1.1.5 (Segundo y Tercer Teorema de isomorfismos)

Sean B y C submódulos de un R -módulo A .

- (a) Existe un isomorfismo de R -módulos, $B/(B \cap C) \cong (B + C)/C$.
 - (b) Si $C \subseteq B$, entonces B/C es un submódulo de A/C , y existe un isomorfismo de R -módulos, $(A/C)/(B/C) \cong A/B$.
-

Teorema 1.1.6

Si R es un anillo y B es un submódulo de un R -módulo A , entonces existe una correspondencia uno a uno en el conjunto de todos los submódulos de A que contienen a B y el conjunto de todos los submódulos de A/B , dada por $C \mapsto C/B$. Por tanto, todo submódulo de A/B es de la forma C/B donde C es un submódulo de A que contiene a B .

Ahora daremos la existencia de los productos y coproductos en la categoría $R\mathcal{M}$.

Teorema 1.1.7

Sea R un anillo y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía de R -módulos, $\prod_{i \in I} A_i$ el producto directo de los grupos abelianos A_i , y $\sum_{i \in I} A_i$ la suma directa de los grupos abelianos.

- (a) $\prod_{i \in I} A_i$ es un R -módulo con la acción de R dada por: $(rf)(i) = rf(i)$, para todo $f \in \prod_{i \in I} A_i$ y para todo $i \in I$. En otras palabras, si $\{a_i\}_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$, entonces $r\{a_i\}_{i \in I} = \{ra_i\}_{i \in I}$.
- (b) $\sum_{i \in I} A_i$ es un submódulo de $\prod_{i \in I} A_i$.
- (c) Para cada $k \in I$, la proyección canónica $\pi_k : \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_k$ es un epimorfismo de R -módulos.
- (d) Para cada $k \in I$, la inyección canónica $\iota_k : A_k \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$ es un monomorfismo de R -módulos.

Demostración:

De (a): Ya se sabe que $\prod_{i \in I} A_i$ es un grupo abeliano, veamos que con la acción

$$(r, \{a_i\}_{i \in I}) \mapsto r \{a_i\}_{i \in I} = \{ra_i\}_{i \in I}$$

es un R -módulo. En efecto, verifiquemos las tres condiciones:

(1) Sean $\{a_i\}_{i \in I}, \{b_i\}_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$ y $r \in R$, se tiene que:

$$\begin{aligned} r(\{a_i\}_{i \in I} + \{b_i\}_{i \in I}) &= r \{a_i + b_i\}_{i \in I} \\ &= \{r(a_i + b_i)\}_{i \in I} \\ &= \{ra_i + rb_i\}_{i \in I} \\ &= \{ra_i\}_{i \in I} + \{rb_i\}_{i \in I} \\ &= r \{a_i\}_{i \in I} + r \{b_i\}_{i \in I} \end{aligned}$$

(2) Sean $r, s \in R$ y $\{a_i\}_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$, se tiene que:

$$\begin{aligned} (r + s) \{a_i\}_{i \in I} &= \{(r + s)a_i\}_{i \in I} \\ &= \{ra_i + sa_i\}_{i \in I} \\ &= \{ra_i\}_{i \in I} + \{sa_i\}_{i \in I} \\ &= r \{a_i\}_{i \in I} + s \{a_i\}_{i \in I} \end{aligned}$$

(3) Sean $r, s \in R$ y $\{a_i\}_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i$, se tiene que:

$$\begin{aligned} r(s \{a_i\}_{i \in I}) &= r \{sa_i\}_{i \in I} \\ &= \{r(sa_i)\}_{i \in I} \\ &= \{(rs)a_i\}_{i \in I} \\ &= (rs) \{a_i\}_{i \in I} \end{aligned}$$

por los incisos anteriores, se sigue que $\prod_{i \in I} A_i$ es un R -módulo.

De (b): Se sigue del hecho de que para todo $r \in R$, $r0_{A_i} = 0_{A_i}$, para todo $i \in I$.

De (c) y (d): Son inmediatos por la definición de la acción de R sobre $\prod_{i \in I} A_i$. ■

Definición 1.1.6

En el contexto del teorema anterior, $\prod_{i \in I} A_i$ es llamado el **producto directo (externo)** de la familia de R -módulos, $\{A_i\}_{i \in I}$ y $\sum_{i \in I} A_i$ es llamado la **suma directa (externa)** de la familia de R -módulos, $\{A_i\}_{i \in I}$.

En el caso en que I sea finito, digamos $I = \{1, \dots, n\}$, el producto directo y la suma directa coincidirán y se denotarán simplemente por:

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_n$$

Las funciones π_k (respectivamente, ι_k) son llamadas **proyecciones canónicas** (respectivamente, **inyecciones**).

1.2. Secuencias Exactas

Definición 1.2.1

Un par de homomorfismos de módulos

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

se dice **exacta en** B , si $\text{Im} f = \ker g$.

Una secuencia finita de homomorfismos de módulos

$$A_0 \xrightarrow{f_1} A_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_{n-1}} A_{n-1} \xrightarrow{f_n} A_n$$

se dice **exacta**, si

$$\text{Im} f_i = \ker f_{i+1}, \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-1$$

Una secuencia infinita de homomorfismos de módulos

$$\dots \xrightarrow{f_{i-1}} A_{i-1} \xrightarrow{f_i} A_i \xrightarrow{f_{i+1}} A_{i+1} \xrightarrow{f_{i+2}} \dots$$

es **exacta**, si $\text{Im} f_i = \ker f_{i+1}$, para todo $i \in \mathbb{Z}$.

Siempre que sea conveniente, nos referiremos a la secuencia exacta de homomorfismos módulos como la secuencia de módulos.

Ejemplo 1.2.1

Sea A un R -módulo. Existen únicos homomorfismos de módulos $0 \rightarrow A$ y $A \rightarrow 0$. Por lo que, podemos considerar a la secuencia:

$$0 \rightarrow A \rightarrow 0$$

pero esta no es exacta, ya que la imagen del primer homomorfismo es 0 y el kernel del segundo es A .

Ejemplo 1.2.2

Si A y B son módulos sobre un anillo R , entonces las secuencias:

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\iota_1} A \oplus B \xrightarrow{\pi_2} B \rightarrow 0 \text{ y } 0 \rightarrow B \xrightarrow{\iota_2} A \oplus B \xrightarrow{\pi_1} A \rightarrow 0$$

son exactas, donde π 's y ι 's son las proyecciones e inyecciones canónicas, respectivamente.

Ejemplo 1.2.3

Si C es submódulo de un módulo D , entonces la secuencia

$$0 \rightarrow C \xrightarrow{i} D \xrightarrow{\pi} D/C \rightarrow 0$$

es exacta, siendo $i : C \rightarrow D$ el mapeo inclusión, y $\pi : D \rightarrow D/C$ el epimorfismo canónico.

Definición 1.2.2

Si $f : A \rightarrow B$ es un homomorfismo de módulos, entonces $A/\ker f$ (respectivamente, $B/\text{Im} f$) es llamada la **coimagen** de f (respectivamente, **cokernel** de f) y es denotado por $\text{Coim} f$ (respectivamente, $\text{Coker} f$).

Ejemplo 1.2.4

1.3. Ejercicios

Observación 1.3.1

R es un anillo.

Ejercicio 1.3.1

Si A es un grupo abeliano y $n > 0$ es natural tal que $na = 0$ para todo $a \in A$, entonces A es un $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}n$ -módulo unitario con la acción dada por:

$$[k]a = ka, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Demostración:

Veamos que en efecto, A es un $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}n$ -módulo: ■

Ejercicio 1.3.2

Sea $f : A \rightarrow B$ un homomorfismo de R -módulos.

- (a) f es monomorfismo si y sólo si para todo par de homomorfismos de R -módulos, $g, h : D \rightarrow A$ tales que $f \circ g = f \circ h$, tenemos que $g = h$.
- (b)

Demostración:

Ejercicio 1.3.3

Sea I un ideal izquierdo de un anillo R y sea A un R -módulo.

- (a) Si S es un subconjunto no vacío de A , entonces

$$IS = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid n \in \mathbb{N}^*; r_i \in I; a_i \in S \right\}$$

es un submódulo de A . Note que si $S = \{a\}$, entonces $IS = Ia = \{ra \mid r \in I\}$.

- (b) Si I es un ideal por ambos lados, entonces A/IA es un R/I módulo con la acción de R/I dada por:

$$(r + I)(a + I) = ra + IA$$

Demostración:

Ejercicio 1.3.4

Si R tiene identidad, entonces todo R -módulo unitario cíclico es isomorfo a un R -módulo de la forma R/J , donde J es un ideal izquierdo de R .

Demostración:

Sea C el R -módulo unitario cíclico generado por a , esto es:

$$C = \{ra \mid r \in R\}$$

definimos el conjunto J dado por:

$$J = \left\{ r \in R \mid ra = 0 \right\}$$

Afirmamos que J es ideal izquierdo de R . En efecto, veamos que:

(1) Sean $s, t \in J$, se tiene que:

$$\begin{aligned} (s - t)a &= sa - ta \\ &= 0 \end{aligned}$$

por ende, $s - t \in J$.

(2) Sea $s \in J$ y $r \in R$, se tiene que:

$$\begin{aligned} (rs)a &= r(sa) \\ &= r \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

por ende, $rs \in J$.

por los dos incisos anteriores se sigue que J es un ideal izquierdo de R . Por ejemplos anteriores se tiene que R/J es un R -módulo. Considere la función $f : C \rightarrow R/J$ dado por:

$$f(ra) = r + J, \quad \forall ra \in C$$

afirmamos que f es un homomorfismo de R -módulos. En efecto:

■ **f es homomorfismo de R -módulos.** Sean $r_1a_1, r_2a_2 \in C$. Se tiene:

$$\begin{aligned} f(r_1a_1 + r_2a_2) &= r_1 + r_2 + J \\ &= (r_1 + J) + (r_2 + J) \\ &= f(r_1a_1) + f(r_2a_2) \end{aligned}$$

y, si $ra \in C$, entonces para $t \in R$ se tiene que:

$$\begin{aligned} f(t(ra)) &= f((tr)a) \\ &= tr + J \\ &= t(r + J) \\ &= tf(ra) \end{aligned}$$

■ **f es monomorfismo:** Sea $ra \in C$. Veamos que:

$$\begin{aligned} f(ra) = J &\iff r + J = J \\ &\iff r \in J \\ &\iff ra = 0 \end{aligned}$$

por lo que, $\ker f = \{0\}$.

■ Para cada $r + J \in R/J$ existe $ar \in C$ tal que $f(ar) = r + J$.

por los tres incisos anteriores, se tiene que f es isomorfismo de R -módulos. ■

Definición 1.3.1

Si R tiene identidad, entonces un R -módulo unitario A no cero es **simple** si sus únicos submódulos son 0 y A .

Ejercicio 1.3.5

Pruebe lo siguiente:

- (1) Todo R -módulo simple es cíclico.
- (2) Si A es simple, entonces todo R -módulo endomorfismo es la función cero o es un isomorfismo.

Demostración:

De (1): Sea A un R -módulo simple. Si A no es el módulo 0 , entonces existe $c \in A$ no cero. Considere el R -módulo generado por c , digamos:

$$C = \{rc + nc \mid r \in R; n \in \mathbb{Z}\}$$

como A es simple, debe suceder que $C = A$ ya que $c \neq 0$ y $c \in C$. Por tanto, A es cíclico.

De (2): Sea $f : A \rightarrow A$ un R -módulo endomorfismo. Por un teorema anterior se tiene que $\ker f$ es un submódulo de A , el cual debe ser 0 , lo cual implicaría que f es isomorfismo, o es A , lo cual implicaría que f es la función cero. ■

Ejercicio 1.3.6

Pruebe que un R -módulo finitamente generado no necesariamente es un grupo abeliano finitamente generado.

Demostración:

Considere el grupo $(\mathbb{Q}, +)$, se tiene que este grupo no es finitamente generado. En efecto, si lo fuese sería de la forma:

$$\mathbb{Q} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

con $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Podemos asumir sin pérdida de generalidad que $a_i \geq 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. También, estos elementos son de la forma:

$$a_i = \frac{p_i}{q_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

donde $p_i, q_i \in \mathbb{N}$ son primos relativos. Sea

$$q = q_1 \cdots q_n$$

Considere ahora el conjunto:

$$A = \{qa \mid a \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle; a > 0\}$$

al ser todos los elementos de $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ sumas finitas de a_i , entonces se tiene que los elementos de A son números naturales. Así que A es un subconjunto de los naturales no vacío, en particular tiene primer elemento, digamos p . Se tiene que $\frac{p}{q}$ es el mínimo elemento positivo de $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Ahora, sabemos que:

$$\frac{p}{q+1} \in \mathbb{Q}$$

pero, $\frac{p}{q+1} \notin \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, pues este elemento es menor que el mínimo elemento positivo de este conjunto. Por ende, \mathbb{Q} no es finitamente generado como grupo abeliano.

Pero, \mathbb{Q} es un \mathbb{Q} -módulo, el cual es finitamente generado por 1 (se verifica rápidamente). ■

Ejercicio 1.3.7

Demostración:

Ejercicio 1.3.8

Sea $f : A \rightarrow A$ un homomorfismo de R -módulos tal que $f \circ f = f$, entonces:

$$A = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$$

Demostración:

Veamos primero que $A = \ker f + \operatorname{Im} f$. Sea $a \in A$, si $a \notin \operatorname{Im} f$, entonces veamos que:

$$f(a) = f(f(a)) \Rightarrow f(a - f(a)) = 0$$

por lo que, $a - f(a) \in \ker f$, luego $a \in \ker f + \operatorname{Im} f$ (pues, $f(a) \in \operatorname{Im} f$).

Veamos ahora que es suma directa interna. En efecto, sea $a \in \ker f \cap \operatorname{Im} f$, entonces existe $b \in A$ tal que:

$$f(b) = a$$

como $a \in \ker f$ se sigue que $f(a) = 0$. Observemos que:

$$f(b) = f(f(b)) = f(a) = 0$$

por lo que, $b \in \ker f$, así que $a = f(b) = 0$, esto es que $a = 0$. Por tanto, se tiene que la suma es directa, esto es:

$$A = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$$

Ejercicio 1.3.9 (Nombre)

Demostración:

Ejercicio 1.3.10

Haga lo siguiente:

- (a) Si A es un módulo sobre un anillo conmutativo R y $a \in A$, entonces $\mathcal{O}_a = \{r \in R \mid ra = 0\}$ es un ideal de R . Si $\mathcal{O}_a \neq 0$, se dice que a es un **elemento de torsión** de A .
- (b) Si R es un dominio entero, entonces el conjunto $T(A)$ de todos los elementos de torsión de A es un submódulo de A ($T(A)$ es llamado el **submódulo de torsión**).
- (c) Muestre que el inciso anterior puede ser falso para un anillo conmutativo R que no sea dominio entero.

Capítulo 2

Módulos Libres y Espacios Vectoriales

2.1. Conceptos Fundamentales

No queda de otra más que asumir este resultado de categorías:

Teorema 2.1.1 (Hungerford, Theorem I.7.8)

Si \mathcal{C} es una categoría concreta, F y F' son objetos en \mathcal{C} tales que F es libre en el conjunto X y F' lo es en X' siendo estos conjuntos tales que $|X| = |X'|$, entonces F es equivalente a F' .

En particular, la categoría de R -módulos unitarios es una categoría concreta, donde la equivalencia entre dos objetos de la categoría es un isomorfismo entre ambos R -módulos.

Teorema 2.1.2

Sea R un anillo conmutativo con identidad. Las siguientes condiciones son equivalentes en un R -módulo unitario F :

- I. F tiene base no vacía.
- II. F es la suma interna directa de una familia cíclica de R -módulos, cada uno de los cuales es isomorfo a R como un R -módulo.
- III. F es un R -módulo isomorfo a la suma directa de copias del R -módulo izquierdo R .
- IV. Existe un conjunto no vacío X y una función $i : X \rightarrow F$ con la siguiente propiedad: dado un R -módulo, A y una función $f : X \rightarrow A$ existe un único homomorfismo de R -módulos $\bar{f} : F \rightarrow A$ tal que

$$\bar{f} \circ i = f$$

En otras palabras, F es un objeto libre en la categoría de R -módulos unitarios.

Demostración:

(i) \Rightarrow (iv): Sea X una base no vacía de F y sea $i : X \rightarrow F$ el mapeo inclusión. Sea A un R -módulo y $f : X \rightarrow A$ una función.

Si $u \in F$, entonces existen $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $r_i \in R$ y $x_i \in X$, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ tales que

$$u = \sum_{i=1}^n r_i x_i$$

Definimos la función $\bar{f} : F \rightarrow A$ dada por:

$$\bar{f}(u) = \sum_{i=1}^n r_i f(x_i)$$

Esta función está bien definida, pues F tiene como base a X (por ende, todo elemento se representa de forma única como combinación lineal finita de elementos de X). Además,

$$\begin{aligned}\bar{f} \circ i(x_i) &= \bar{f}(x_i) \\ &= 1_R \cdot f(x_i) \\ &= f(x_i), \quad \forall x_i \in X\end{aligned}$$

por ende, $\bar{f} \circ i = f$.

Veamos que es homomorfismo de R -módulos (no sé como se verifica eso, chécalo porfa Roque).

Ahora, si $g : F \rightarrow A$ es otro homomorfismo de R -módulos tal que

$$g \circ i = f$$

se tiene que

$$\bar{f} \circ i = g \circ i \Rightarrow \bar{f}|_X = g|_X$$

Como X genera F y todo homomorfismo de R -módulos que vaya de F en algún R -módulo, B queda únicamente determinado por X , basta ver que $\bar{f} = g$ en X , lo cual sucede por la igualdad anterior. Por tanto, \bar{f} es único.

(iv) \Rightarrow (iii): Asumiendo (iv), sean $X \subseteq F$ no vacío y una función $i : X \rightarrow F$ que cumplan esta propiedad. Considere el R -módulo

$$A = \sum_{x \in X} R$$

(es decir, es la suma directa de $|X|$ -veces el R -módulo izquierdo R). Sea

$$Y = \left\{ \theta_x \mid x \in X \right\}$$

donde

$$\theta_x(y) = \begin{cases} 1_R & \text{si } y = x \\ 0_R & \text{si } y \neq x \end{cases}, \quad \forall y \in Y$$

Como X es no vacío, entonces Y es no vacío. Por la parte (iii) \Rightarrow (i), se sabe que Y es una base del R -módulo unitario A . En particular, como (iii) \Rightarrow (iv), se tiene que A es un R -módulo libre en la categoría de R -módulos unitarios.

En particular, F y A son R -módulos libres en la categoría de R -módulos unitarios y son tales que $|X| = |Y|$ (por la forma en que se construyó Y), luego por el Teorema anterior son equivalentes en esta categoría, es decir que existe un isomorfismo $f : F \rightarrow A$. Así que

$$F \cong \sum_{x \in X} R$$

lo que prueba el resultado. ■

2.2. Referencias

- *Algebra* de Thomas Hungerford, ed. Springer.