

# Lista 1 de Ejercicios Lógica Matemática: Lógica Proposicional

Cristo Daniel Alvarado

23 de septiembre de 2024

## 1.1. Ejercicios

### Definición 1.1.1

Una **conectiva booleana  $n$ -aria** es una función  $B : \{T, F\}^n \rightarrow \{T, F\}$ .

### Observación 1.1.1

La idea de la función anterior es que se codifique una tabla de verdad.

### Ejercicio 1.1.1

Considere la conectiva booleana dada por:

$$\begin{aligned} B(T, T, T) &= F, & B(F, T, T) &= F, \\ B(T, T, F) &= F, & B(F, T, F) &= T, \\ B(T, F, T) &= F, & B(F, F, T) &= T, \\ B(T, F, F) &= T, & B(F, F, F) &= T, \end{aligned}$$

escriba una fórmula bien formada, utilizando el conjunto de conectivas  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  que realice esta función booleana.

### Solución:

Sea  $B : \{T, F\}^3 \rightarrow \{T, F\}$  dada por:

$$B(p_1, p_2, p_3) = (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$$

se verifica rápidamente que ésta función  $B$  satiface lo deseado. □

### Ejercicio 1.1.2

Muestre que el conjunto de conectivas  $\{\perp, \Rightarrow\}$  es completo (donde  $\perp$  es la conectiva 0-aria con valor constante  $F$ ).

### Demostración:

Basta con ver que si  $\varphi$  y  $\psi$  son fórmulas, entonces  $\neg\varphi$  y  $\varphi \Rightarrow \psi$  se pueden expresar con conectivas  $\{\perp, \Rightarrow\}$ .

En efecto, ya se tiene la implicación. Veamos que:

$$\neg\varphi \equiv \varphi \Rightarrow \perp$$

para un modelo  $m$  se tiene que:

$\varphi$	$\perp$	$\varphi \Rightarrow \perp$	$\neg\varphi$
$T$	$F$	$F$	$F$
$F$	$F$	$T$	$T$

es decir, que en cualquier caso  $\overline{m}(\neg\varphi) = \overline{m}(\varphi \Rightarrow \perp)$ . Se sigue entonces la equivalencia. Como  $\{\neg, \Rightarrow\}$  es un conjunto completo de conectivas, también lo debe ser pues  $\{\perp, \Rightarrow\}$ . ■

### Ejercicio 1.1.3

Reescriba las siguientes fórmulas en notación polaca a notación usual:

a).  $\neg\neg \Rightarrow \vee \wedge p_3 p_8 \neg p_{10} \neg \vee p_1 p_5$ .

b).  $\wedge \neg \Rightarrow p_3 \vee p_4 p_1 \iff \vee \neg p_{10} \iff p_{15} p_{18} q$ .

$$c). \wedge \Rightarrow p_3 \wedge p_2 p_1 \neg \vee \wedge p_4 p_5 \neg p_{10}.$$

### Solución:

Veamos que

$$a). \neg \neg \Rightarrow \vee \wedge p_3 p_8 \neg p_{10} \neg \vee p_1 p_5 \equiv \neg \neg (((p_3 \wedge p_8) \vee \neg p_{10}) \Rightarrow \neg(p_1 \vee p_5)).$$

$$b). \wedge \neg \Rightarrow p_3 \vee p_4 p_1 \iff \vee \neg p_{10} \iff p_{15} p_{18} q \equiv (\neg(p_3 \Rightarrow (p_4 \vee p_1))) \wedge ((\neg p_{10} \vee (p_{15} \iff p_{18})) \iff q).$$

$$c). \wedge \Rightarrow p_3 \wedge p_2 p_1 \neg \vee \wedge p_4 p_5 \neg p_{10} \equiv (p_3 \Rightarrow (p_2 \vee p_1)) \wedge \neg((p_4 \wedge p_5) \vee \neg p_{10}).$$

□

### Ejercicio 1.1.4

Demuestre que toda fórmula bien formada (en el formato de clase, es decir, en notación polaca) en la que no aparezca el símbolo  $\neg$  debe tener longitud impar.

### Demostración:

Procederemos por inducción del número de implicaciones  $\Rightarrow$ , digamos  $n$ , en la cadena de la fórmula  $\varphi$ .

- Si  $n = 0$ , entonces  $\varphi \equiv p_1$ , siendo  $p_1$  una variable. Luego la longitud de  $\varphi$  es 1 que es impar.
- Si  $n = 1$ , entonces  $\varphi \equiv \Rightarrow p_1 p_2$ , siendo  $p_1$  y  $p_2$  variables. Luego la longitud de  $\varphi$  es 3 que es impar.
- Suponga que existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  se cumple que toda FBF que no contenga a  $\neg$  y con una cantidad de implicaciones  $k$  tiene longitud impar.

Sea  $\varphi$  una fórmula bien formada que no contenga  $\neg$  y que tiene  $n + 1$  implicaciones, es decir que es de la forma:

$$\varphi \equiv \Rightarrow \psi_1 \psi_2$$

donde  $\psi_1, \psi_2$  son FBF. Como  $\varphi$  tiene  $n + 1$  implicaciones, entonces debe suceder que  $\psi_1$  y  $\psi_2$  contengan entre 0 y  $n$  implicaciones. Por hipótesis de inducción, tanto  $\psi_1$  como  $\psi_2$  tienen longitud impar, luego  $\varphi$  tiene longitud la suma de estos dos impares (que es un par) más 1 (la primera implicación). Por tanto,  $\varphi$  tiene longitud impar.

Por inducción se sigue el resultado. ■

### Ejercicio 1.1.5

Sea  $\varphi$  una fórmula bien formada. Sea  $c$  la cantidad de veces que aparece el símbolo  $\Rightarrow$  en la fórmula  $\varphi$ , y sea  $s$  la cantidad de veces que aparecen variables en la fórmula  $\varphi$  (en donde, si alguna variable aparece varias veces, se cuentan cada una de sus apariciones por separado). Demuestre que

$$s = c + 1$$

### Demostración:

■

**Ejercicio 1.1.6**

Sea  $\varphi$  una fórmula bien formada, y suponga que todos los símbolos de la variable que aparecen en  $\varphi$  se encuentran entre  $p_1, \dots, p_n$ . Supóngase que  $m, m'$  son dos modelos que satisfacen  $m(p_i) = m'(p_i)$  para todo  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Demuestre que

$$\overline{m}(\varphi) = \overline{m'}(\varphi)$$

**Demostración:** ■

**Ejercicio 1.1.7**

Demuestre o refute, para un conjunto de fórmulas  $\Sigma$ , y  $\varphi, \psi$  dos fórmulas:

- a). Si o bien  $\Sigma \models \varphi$ , o bien  $\Sigma \models \psi$ , entonces  $\Sigma \models \varphi \wedge \psi$ .
- b). Si  $\Sigma \models \varphi \wedge \psi$  entonces o bien  $\Sigma \models \varphi$ , o bien  $\Sigma \models \psi$ .

**Solución:** □

**Ejercicio 1.1.8 (Sustitución)**

Suponga que tenemos una lista de fórmulas bien formadas  $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots$ . Quisiéramos definir formalmente la operación que dada una fórmula bien formada  $\psi$ , reemplaza cada aparición del símbolo de la variable  $p_i$  con la fórmula  $\varphi_i$ , de modo que se obtiene una nueva fórmula bien formada  $\psi^*$ . Por ejemplo, si  $\psi$  es  $p_4 \Rightarrow p_{32}$ , entonces  $\psi^*$  es  $\varphi_4 \Rightarrow \varphi_{32}$ .

- a). ¿Cómo definiría formalmente la operación  $\psi \mapsto \psi^*$  por recursión?
- b). Sea  $m$  cualquier modelo, y defina  $m'$  como el modelo dado por  $m'(p_i) = \overline{m}(\varphi_i)$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ . Demuestre que  $\overline{m'}(\psi) = \overline{m}(\psi^*)$ , para cada fórmula bien formada  $\psi$ .
- c). Concluya que si  $\psi$  es una tautología, entonces  $\psi^*$  también lo es.

**Demostración:** ■

**Ejercicio 1.1.9**

Sea  $\Sigma$  un conjunto de fórmulas bien formadas. Definimos la operación  $\mathcal{C}(\Sigma)$  mediante

$$\mathcal{C}(\Sigma) = \Sigma \cup \left\{ \varphi \mid \neg \varphi \in \Sigma \right\} \cup \left\{ \varphi \mid \varphi \wedge \psi \in \Sigma \text{ o } \psi \wedge \varphi \in \Sigma \text{ para alguna FBF } \psi \right\}$$

Definimos también recursivamente, para cada conjunto de fórmulas bien formadas  $\Sigma$  los conjuntos  $\mathcal{C}^n(\Sigma)$  como sigue:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^0(\Sigma) &= \Sigma \\ \mathcal{C}^{n+1}(\Sigma) &= \mathcal{C}(\mathcal{C}^n(\Sigma)), \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{aligned}$$

y más aún, se define

$$\mathcal{C}^\infty(\Sigma) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n(\Sigma)$$

Haga lo siguiente:

a). Considere  $\Sigma = \{p_1 \wedge \neg p_2, \neg(p_3 \wedge (p_4 \wedge p_5))\}$ . Calcule  $\mathcal{C}(\Sigma)$  y  $\mathcal{C}(\mathcal{C}(\Sigma))$ .

b). Si  $\Sigma$  es como en el inciso (a), ¿a qué es igual  $\mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ ?

c). Ahora, sea

$$\Sigma = \{p_n \wedge \dots p_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

¿A qué es igual  $\mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ ?

d). ¿Se te puede ocurrir de alguna manera intuitiva (verbal, corta) de describir a qué es igual  $\mathcal{C}^\infty(\Sigma)$ ?

**Solución:**

□

### Ejercicio 1.1.10

Demuestre que existe una demostración formal de los siguientes argumentos (en su defecto, complete las demostraciones):

**Solución:**

	1)	$A$	$\Rightarrow$	$(B \wedge \neg C)$	Premisa
	2)	$(B \vee C)$	$\Rightarrow$	$D$	Premisa
	3)	$A$			Premisa
a).	4)	$B$	$\wedge$	$\neg C$	1,3 M.P.
	5)	$B$			4 Simp.
	6)	$B$	$\vee$	$C$	5 Ad.
	7)	$D$			2,6 M.P.
				$\therefore D$	

	1)	$A$	$\Rightarrow$	$B$	Premisa
	2)	$A$	$\vee$	$(B \vee \neg C)$	Premisa
	3)	$\neg B$			Premisa
b).	4)	$\neg A$			1,2 M.T.
	5)	$B$	$\vee$	$\neg C$	3,2 S.D.
	6)	$\neg C$			5,3 S.D.
	7)	$\neg C$	$\wedge$	$\neg B$	5,3 Conj.
				$\therefore \neg C \wedge \neg B$	

		1)	$A$	$\Rightarrow$	$B$	Premisa
		2)	$B$	$\Rightarrow$	$C$	Premisa
		3)	$(A \Rightarrow C)$	$\Rightarrow$	$(B \Rightarrow D)$	Premisa
		4)	$(A \Rightarrow D)$	$\Rightarrow$	$E$	Premisa
	$\rightarrow$	5)	$A$			Sup.
		6)	$B$			1,5 M.P.
		7)	$C$			2,6 M.P.
c).		8)	$A$	$\Rightarrow$	$C$	5-7 M.D.
		9)	$B$	$\Rightarrow$	$D$	3,8 M.P.
	$\rightarrow$	10)	$A$			Sup.
		11)	$B$			1,10 M.P.
		12)	$D$			9,11 M.P.
		13)	$A$	$\Rightarrow$	$D$	10-12 M.D.
		14)	$E$			4,14 M.P.
				$\therefore$	$E$	

	1)	$A$	$\Rightarrow$	$(B \wedge C)$	Premisa
	2)	$\neg A$	$\Rightarrow$	$((D \Rightarrow E) \wedge (F \Rightarrow H))$	Premisa
	3)	$(B \wedge C)$	$\vee$	$((\neg A \Rightarrow D) \wedge (\neg A \Rightarrow F))$	Premisa
	4)	$\neg(B \wedge C)$	$\wedge$	$\neg(H \wedge D)$	Premisa
	5)	$\neg(B$	$\wedge$	$C)$	4 Simp.
	6)	$\neg A$			1,5 M.T.
	7)	$(D \Rightarrow E)$	$\wedge$	$(F \Rightarrow H)$	2,6 M.P.
	8)	$D$	$\Rightarrow$	$E$	7 Simp.
	9)	$F$	$\Rightarrow$	$H$	7 Conm. y Simp.
d).	10)	$(\neg A \Rightarrow D)$	$\wedge$	$(\neg A \Rightarrow F)$	3,5 S.D.
	11)	$\neg A$	$\Rightarrow$	$D$	10 Simp.
	12)	$\neg A$	$\Rightarrow$	$F$	10 Conm. y Simp.
	13)	$D$			11,6 M.P.
	14)	$F$			12,6 M.P.
	15)	$E$			8,13 M.P.
	16)	$H$			9,14 M.P.
	17)	$E$	$\wedge$	$H$	15,16 Conj.
			$\therefore$	$E \wedge H$	

	1)	$(A \Rightarrow B)$	$\wedge$	$(C \Rightarrow D)$	Premisa
	2)	$(B \Rightarrow E)$	$\wedge$	$(D \Rightarrow F)$	Premisa
	3)	$(\neg A \Rightarrow E)$	$\wedge$	$(\neg B \Rightarrow D)$	Premisa
	4)	$\neg E$			Premisa
e).	5)	$A$	$\Rightarrow$	$B$	1 Simp.
	6)	$C$	$\Rightarrow$	$D$	1 Conm. y Simp.
	7)	$B$	$\Rightarrow$	$E$	2 Simp.
	8)	$D$	$\Rightarrow$	$F$	2 Conm. y Simp.
			$\therefore$	$\neg C \vee \neg B$	

f).	1)	$A$	$\Rightarrow$	$(B \Rightarrow C)$	Premisa
			$\therefore$	$B \Rightarrow (A \Rightarrow C)$	

g).	1)	$A$	$\Rightarrow$	$(B \wedge C)$	Premisa
			$\therefore$	$A \Rightarrow B$	

h).	1)	$A$	$\Rightarrow$	$(B \wedge C)$	Premisa
	2)	$C$	$\Rightarrow$	$(D \wedge E)$	Premisa
			$\therefore$	$A \Rightarrow (B \wedge D)$	

$$\begin{array}{l}
\text{i). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad A \Rightarrow B \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad C \Rightarrow B \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore (A \vee C) \Rightarrow B} \\
\\
\text{j). } \frac{1) \quad ((A \vee B) \Rightarrow C) \quad \wedge \quad (\neg D \Rightarrow (B \wedge \neg C)) \quad \text{Premisa}}{\therefore A \Rightarrow D} \\
\\
\text{k). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \vee B) \Rightarrow C \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad D \Rightarrow (E \wedge F) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore (A \Rightarrow C) \wedge (D \Rightarrow F)} \\
\\
\text{l). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \Rightarrow B) \quad \wedge \quad (C \Rightarrow D) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (B \vee D) \Rightarrow ((E \Rightarrow (E \vee F)) \Rightarrow A \wedge C) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore A \iff C} \\
\\
\text{m). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad A \quad \vee \quad (B \Rightarrow C) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (B \Rightarrow (B \wedge C)) \Rightarrow (D \vee E) \quad \text{Premisa} \\ 3) \quad (D \Rightarrow A) \quad \wedge \quad (E \Rightarrow F) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore A \vee F} \\
\\
\text{n). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \Rightarrow (\neg B \wedge \neg C)) \quad \wedge \quad (D \Rightarrow \neg(B \vee C)) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (\neg E \Rightarrow A) \quad \wedge \quad (\neg F \Rightarrow D) \quad \text{Premisa} \\ 3) \quad (E \Rightarrow B) \quad \wedge \quad (F \Rightarrow C) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore B \iff C} \\
\\
\text{o). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \vee B) \Rightarrow (C \Rightarrow D) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (C \Rightarrow (C \wedge D)) \Rightarrow E \quad \text{Premisa} \\ 3) \quad E \Rightarrow ((\neg F \vee \neg \neg F) \Rightarrow (A \wedge F)) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore A \iff E} \\
\\
\text{p). } \frac{}{\therefore (A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow C))} \\
\\
\text{q). } \frac{}{\therefore (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow (B \wedge C))} \\
\\
\text{r). } \frac{}{\therefore ((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A} \\
\\
\text{s). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad A \quad \vee \quad (B \wedge C) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad A \Rightarrow C \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore C} \\
\\
\text{t). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \vee B) \Rightarrow (C \Rightarrow D) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (\neg D \vee E) \Rightarrow (A \wedge C) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore D} \\
\\
\text{u). } \frac{\begin{array}{l} 1) \quad (A \vee B) \Rightarrow (C \wedge D) \quad \text{Premisa} \\ 2) \quad (C \vee E) \Rightarrow (\neg F \wedge H) \quad \text{Premisa} \\ 3) \quad (F \vee G) \Rightarrow (A \wedge I) \quad \text{Premisa} \end{array}}{\therefore \neg F} \\
\\
\text{v). } \frac{}{\therefore (A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow C)} \\
\\
\text{w). } \frac{}{\therefore A \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow B)} \\
\\
\text{x). } \frac{}{\therefore (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C))} \\
\\
\text{y). } \frac{}{\therefore (A \wedge B) \Rightarrow B}
\end{array}$$

$$z). \frac{}{\therefore A \Rightarrow (B \Rightarrow A \wedge B)}$$

□