

作业七

1. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 向量 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 给出矩阵 \mathbf{A} 的 **QR** 分

解; 并给出 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解。

2. 对于向量组 $\left\{ \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 10^{-3} \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 10^{-3} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, 在三

个有效数字情形下, 分别使用传统 Gram-Schmidt 和修改后的 Gram-Schmidt 方法, 把上述向量组正交化。

3. 试判断矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{3}} & \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{-2i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ 是否为酉矩阵。

4. 从向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 出发, 使用 elementary reflector 构造 R^3 的一

组标准正交基。

5. 设 $\mathbf{R} = \mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$, 这里 \mathbf{u} 为 $n \times 1$ 的向量 ($n > 1$), 且 $\|\mathbf{u}\| = 1$. 如果 \mathbf{x} 满足: $\mathbf{Rx} = \mathbf{x}$, 试说明 \mathbf{x} 与 \mathbf{u} 正交。