

Ridge Regression

Nipun Batra

IIT Gandhinagar

July 29, 2025

$\ln f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots$ it is $\max |c_i|$

Objective:

$$\begin{aligned} &\text{Minimise } (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) \\ &\text{s.t. } \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S \end{aligned}$$

Objective:

$$\begin{aligned} &\text{Minimise } (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) \\ &\text{s.t. } \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S \end{aligned}$$

This is equivalent to

$$\text{Minimise } (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \delta^2 \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta}$$

Minimise $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$

s.t. $\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S$

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mu) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \mu (\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S)$$

where, $\mu \geq 0$ (and $\mu = \delta^2$)

Minimise $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$

s.t. $\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S$

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mu) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \mu (\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S)$$

where, $\mu \geq 0$ (and $\mu = \delta^2$)

Minimise $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$

s.t. $\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S$

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mu) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \mu (\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S)$$

where, $\mu \geq 0$ (and $\mu = \delta^2$)

If $\mu = 0$

There is no regularization

No effect on constraint

Minimise $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$

s.t. $\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S$

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mu) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \mu (\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S)$$

where, $\mu \geq 0$ (and $\mu = \delta^2$)

If $\mu = 0$

There is no regularization

No effect on constraint

Minimise $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})$

s.t. $\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} \leq S$

$$L(\boldsymbol{\theta}, \mu) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}) + \mu (\boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S)$$

where, $\mu \geq 0$ (and $\mu = \delta^2$)

If $\mu = 0$

There is no regularization

No effect on constraint

If $\mu \neq 0$

$$\implies \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\theta} - S = 0$$

Are θ_i all zero for high μ ?

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \mu \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 32 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \mu \mathbf{I})^{-1} = \frac{1}{92} \begin{bmatrix} 32 & -10 \\ -10 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

Another interpretation of “regularisation”

- ▶ Contrast with update equation for unregularised regression:

- ▶ Contrast with update equation for unregularised regression:

- ▶ $\theta = \underbrace{\theta}_{\text{No Shrinking } \theta} - \alpha(-2\mathbf{X}^\top \mathbf{y} + 2\mathbf{X}^\top \mathbf{X}\theta)$