

宗海邀余赴锡诊之，脉涩不滑，不类妊娠。当晚与丁医商进桃核承气汤，晨起下白物如胶痰。更进抵当汤，下白物更多。胀满悉除，而腹忽大。月余，生一女，母子俱安。孙子云：置之死地而后生，亶其然乎？”

曹颖甫曰：“《金匱·妊娠篇》宿有癥病，當下其癥，桂枝茯苓丸主之。方中丹皮、桃仁、芍藥極破血攻癥之能事。丹皮、桃仁為大黃牡丹湯治腸痛之峻藥，芍藥為痼毒通絡之必要，今人之治外証用亦赤芍，其明驗也。桂枝合芍藥能扶統血之脾陽，而疏其癥結，觀太陽病用桂芍解肌，非以脾主肌肉乎。用茯苓者，要不過去濕和脾耳。然方治平近，遠不如桃核承氣抵當丸之有力。然當時非經西醫之考驗，及丁醫用破血藥之有效，亦斷然不敢用此。而竟以此奏效，其亦有故無殞，亦無殞也之義乎？”

(5) 攻有进退:孙宝宝,住厅西路。初诊,满舌生疮,环唇纹裂,不能吮饮,饮则痛哭,身热,溲少,脉洪而数,常烦躁不安,大便自可,拟葛根芩连汤加味。

粉葛根四钱      淡黄芩钱半      川连六分

生甘草三钱      灯心三扎      活芦根一尺

二诊,口疮,投葛根芩连汤,不见大效,宜进一步,合承气法。

粉葛根四钱      细川连八分      生川军二钱

生甘草三钱      淡黄芩钱半      枳实钱半

玄明粉钱半(分冲)

曹颖甫曰：“葛根芩连汤既为化热而设，服之不效，肠胃燥实即为热病之结果，故佐景谓合承气法为进一步也。”

徐左 美亚十厂

六月十二日，小便已，阴疼，此本大肠燥气，熏灼膀胱，《伤寒论》所谓宜大承气汤之证也。而治之不当，服某种丸药，以致大便日滞，小便转数，阴疼如故，足腿痠，上及背脊俱痠。而胃纳不减者，阳明燥气用事也。阙上略痛，阳明余热为病也。右脉滑大，仍