以解表。唯有投白虎汤以治其本(肠胃之热),同时加桂枝以治其 标(表证之寒),标本并治,方可热除津复,汗出表解。依余经验, 桂枝轻至一钱,生石膏轻至三钱,亦可有效。设不尔者,但用白虎 以清热,则表证将愈甚,但用桂枝以解表,则内热将愈炽,终不免坏 病之变,此乃桂枝石膏二药必须合作而不可分离之理也。或曰:君 前谓石膏凉胃,桂枝温胃,何能温凉并进,反获奇功耶? 曰:仲圣方 温凉并用者,诸泻心汤即在其例。若桂枝与石膏犹其始焉者尔。 盖人体之机构复杂繁沓,灵敏万分,及其病时,作用尤显。各部机 构每自能吸取其所需,而放任其所不需者。若论本汤证,则胃取石 膏之凉而消热,动脉取桂枝之散而致汗,故二者非但不相左,抑且 相成。

前桂枝加大黄汤为七分太阳,三分阳明。今白虎加桂枝汤为 七分阳明,三分太阳。二汤之对仗,堪称工整。医者能合用仲圣诸 方,即可曲应万变之病,兹二汤特发其凡耳。

## 徐左

贪凉饮冷,卫阳胃气尽为所遏,发热身疼痛,脘胀,食入泛恶, 法当诱解。

紫背浮萍三钱

前胡一钱

藿梗二钱

仙半夏二钱

淡干姜一钱

淡吴萸三钱

桔梗一钱

甜瓜蒂六分

王慎轩记:服此方之后,吐出浊水甚多,诸恙悉退,此亦曹师之 所称许也,均兼录之。

## 15. 暑天阳明

血热壮盛之人,遇天时酷蒸,往往以多汗而胃中化燥。始则大 便不行,继则口燥饮冷。夏令伏阴之体,饮冷太暴,或且转为下利。 究之利者自利,胃中燥实依然不去,故仍宜用大承气汤以下之。予 子湘人辛未六月在红十字会治一山东人,亲见之。一剂后,不再来

