近代海上名医

发其痈"者,犹曰"当发其痈",盖"发",犹"发现"之谓也。

《金匮》曰:"肠痈者,少腹肿痞,按之即痛如淋,小便自调,时时发热,自汗出,复恶寒,其脉迟紧者,脓未成,可下之。当有血,脉洪数者,脓已成,不可下也。大黄牡丹汤主之。"历来注家对于"脓已成,不可下也"一语,殆无异辞。甚且以此为大黄牡丹汤与薏苡附子败酱散主治之分野,此殆不思之过也。

《金匮》所谓未成已成之脓所包至广,一切炎性渗出物、腐化 之白血球、腐烂之肠壁皮肉等均是,要在当去之例一也。夫肠痈当 未成脓之前, 曰可下之, 试问欲下者何物?依余之说, 下其肠中一 切污积,使蚓突得挤出病根是矣。当已成脓之后,反曰不可下之, 试问其脓作何处置?将使脓复返为血乎,此乃绝无之事。将任脓 突脐而出乎,此乃速死之图。《方伎杂志》略云:"一商家女(中略) 自腹以至面部四肢悉肿,少腹右方之底有酿脓。因思取脓则可保 十日,以此告病家。病家相惊吐舌,谓前医皆不知有脓,但云补药 以助元气,则水气自治耳。遂乞施针。余曰:针则至多延命一月。 取脓则十日。但识病在医,而死生任诸天数,姑针之可也。遂用铍 针刺入寸许,脓汁迸射,上及承尘,臭气扑鼻,病家人人惊愕,乃与 薏苡附子败酱散,疮口纳细棉条以出瘀脓。然其人元气渐脱,十一 日而毙。"可谓一证。犹曰薏苡附子败酱散主之。试问服散之后, 散能与脓起化学作用,齐化为乌有乎? 吾惧其未能也。若曰散将 与脓结而俱下,则依然是下法,乌得曰不可下?或曰:不可下者犹 言不胜下,下之终危也。余则谓果下之,犹不失背城借一之计,不 下即是束手待毙之策。孰得孰失,明眼者自能辨之。况脓去正虚, 大可用补,活法在人,宁难善后。故窃于"不可下"三字大起疑惑, 即使的系仲圣遗文,犹当据事实以改正之。如何改正,曰:当作 "当急下"也。(又经文称本病"小便自调",按之事实,不尔,改正 之责,委之贤者)

《金匮》大黄牡丹汤方后曰:"顿服之,有脓当下,如无脓当下血。"本已昭示后人无脓当下,有脓当急下,悉主以本汤之意,人自