第二案曹殿光用皂莢末四两者，乃其八日间之总量也。即先一日服皂莢末一两，次日改服射干麻黄汤一剂，以后第三、第五、第七日同第一日，第四、第六、第八日同第二日。按每日服末一两较第一案之钱许量已大增，但此为皂莢焦黑之灰，彼为同品炙黄之质。黑者力微，黄者力巨，故其量为反比，而二者病情又有重轻之分，故量虽迥异，并非矛盾。第三案吾师自以皂莢大者四枚炙末，盛之得一小半碗。余尝试择大皂莢一枚，不去皮弦与子，衡之，得新秤一两许。又取大者二枚，炙之使焦，研之为末，衡之，得六钱许。是四枚约为一两二钱许，与第二案所称之两许，亦尚相合。第四案如古法，与第一案同。按本药究属峻品，无经验之医生初次试用，宁自每服五分递加，较为妥当。

姜佐景又按：用皂莢无非取其荡涤胶痰，而其能荡涤胶痰者，盖即赖其中含有石碱素。西医谓驱痰剂西药如西尼加根，中药如远志、桔梗、皂莢中皆含有石碱素，所谓刺激性驱痰剂是也。故用牙皂之莢，可以代西尼加根云云。中西学说相通，信哉。

曹颖甫曰：除痰之药以有碱性者为长，故咯痰不出者，用桔梗甘草汤，无不克日取效，以桔梗含有碱性故也。痰黏胸膈而不出，则用有碱性之皂莢以下之，所谓在下者引而竭之也。凡用药有彻上彻下之异，可因此而观其通矣。

49. 咳嗽咽痛

冯蘅荪 嵩山路萼庐账房，十月二十九日

始而恶寒，发热，无汗，一身尽痛。发热必在暮夜，其病属营，而恶寒发热无汗，则其病属卫，加以咳而咽痛，当由肺热为表寒所束，正以开表为宜。

净麻黄三钱	光杏仁四钱	生石膏五钱
青黛四分（同打）	生甘草三钱	浮萍三钱

姜佐景按：本案脉案中所谓营卫，盖本《内经》“营气夜行于阳，昼行于阴，卫气昼行于阳，夜行于阴”之说。余则谓本案乃麻