浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。假令尺中迟者,不可发汗。何 以知然,以荣气不足,血少故也。"可以见之。况桂枝汤去大枣加 浮萍,其发汗之力较桂枝原汤为尤猛。因大枣本为保存津液者,今 反易以伤津液之浮萍故也。以不宜发汗之人,令大发其汗,自有变 证。《大论》曰:"发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者, 桂枝甘草汤方之。"此盖为无痰饮者言之耳。又曰:"太阳病,发 汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身润动,振振欲擗地者, 真武汤主之。"此盖为有痰饮者言之。又曰:"发汗,病不解,反恶 寒者,虚故也,芍药甘草附子汤主之。"此盖为虚者言之。今师母 所服之方,虽非桂枝甘草汤,亦非真武汤,又非芍药甘草附子汤,然 相去匪远,而周详或且过之,故能效也。由是观之,仲圣教人用麻 桂以表邪,固又教人有不宜用麻桂之证,而又教人误用后补救之 法。其意也善,其法也备,观本案而益信。读《伤寒论》者,又安可 执其一而舍其二哉?

曹颖甫曰:虚人发汗,是谓重虚。重虚之人,必生里寒。血 不养筋,故筋脉牵掣。血不充于脉道,故微细。不补气血则筋脉 不调,不温水脏则表阳不达。又因其有水气也,加干姜、半夏。 因其体痛也,加乳香、没药。因其心悸也,重用炙甘草。因其挟 湿也,而加生苡仁。大要随证酌加,补无成方之可据。而初意却 在并用术附,使水气得行于皮中。盖救逆之方治,原必视病体为 进退也。

125 . 消渴

郁祖安之女

友人郁祖安君之女公子,方三龄,患消渴病。每夜须大饮十余 次,每饮且二大杯,勿与之,则吵闹不休,小便之多亦如之,大便不 行,脉数,别无所苦。时方炎夏,尝受治于某保险公司之西医,盖友 人也。逐日用灌肠法,大便方下,否则不下。医试勿与多饮,此乃 事实上所绝不可能者。累治多日, 迄无一效。余诊之曰: 是白虎汤

