

难。”仲景虽不出方治，但曹颖甫认为可根据脉象，推断其治法。其脉在正水将成、初成、已成，各阶段是不同的。单用五苓五皮利水，他认为是不行的，要用麻黄附子细辛汤扶肾阳而疏表郁。

## 117. 蓄血

能食知饥,不大便而但见少腹满,按之硬,脉滑而数者,乃为蓄血。予在斜桥治汪姓一证亲见之。予始用桃核承气汤下之,大便紫黑,少腹软而满尚未减,后用大黄蜜虫丸久久方愈。乃知仲师抵当汤方治为不可易也。世有畏方剂猛峻而改用轻剂者,以是前车之鉴。

【按】《伤寒论》曰：“病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便，有瘀血也，宜抵当汤。”

曹颖甫认为脉浮数，本属表热，脉象浮去而数不解，则阳热并居于中脘，所以出现知饥能食，少腹硬满而便秘的症状。此为热入血分，属蓄血证。与此对应的是另一种情况，即有消谷善饥，六七日不大便者，两足无力，则为肺热叶焦之痿躄，仍宜大承气汤，此为热在气分。

罗夫人

七月二十三日，腹满胀，转矢气则稍平，夜不安寐。大便行，则血随之而下。以症状论，有似脾虚不能统血。然大便鞭，则决非脾脏之虚，以脾虚者便必溏也。脉弦，宜桃仁承气汤。

桃仁泥三钱	生川军二钱(后下)	川桂枝三钱
生甘草一钱	芒硝钱半(冲)	

姜佐景按：病者服二剂后，大便畅而血止矣。

《大论》曰：“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。”本条即后人所据，指本汤为太阳府病