

始病中脘痛而吐水，自今年六月每日晨泄，有时气从少腹上冲，似有瘕块，气还则绝然不觉。此但肝郁不调，则中气凝滞耳。治宜吴茱萸汤合理中。

淡吴萸四钱	生潞党五钱	干姜三钱
炙甘草三钱	生白术五钱	生姜三片
红枣十二枚		

二诊 九月十八日

两服吴茱萸合理中汤，酸味减而冲气亦低，且晨泄已全痊。唯每值黄昏，吐清水一二口，气从少腹挟痞上冲者，或见或否。治宜从欲作奔豚例，用桂枝加桂汤，更纳半夏去水。

川桂枝三钱	白芍三钱	生甘草钱半
桂心钱半	制半夏五钱	生姜五片
红枣七枚		

拙巢注：服后痊愈。

姜佐景按：本案初诊所谓吐水，二诊所谓吐清水，颇可疑，或即是“白津”，其说详下案。

周右 住浦东

初诊 气从少腹上冲心，一日四五度发，发则白津出，此作奔豚论。

肉桂心一钱	川桂枝三钱	大白芍三钱
炙甘草二钱	生姜三片	大红枣八枚

姜佐景按：本案为余在广益中医院所诊得者，余视此颇感兴趣，若自珍其敝帚者然，请从“白津”说起。

《金匱要略》曰：“寒疝繞臍痛，苦發則白津出，手足厥冷，其脈沈弦，大烏頭煎主之。”本條中“苦發”二字，《千金》《外台》作“若發”，此不足論。“白津”二字，《千金》《外台》作“白汗”，“白汗”二字在仲聖書中為少見，或以為即《素問》之“魄汗”，或以為即《脈經》之“白汗”，似未得為的解。若仍作“白津”，亦未能確指為何