223

病者服此后,其疾气将更多,矢气既去,腹之胀满者乃渐平。本案周妇腹本胀满,二服药后,遂渐平,今特补述于此。病人之腹渐平, 奔豚乃免复发,所谓图其本者此也。

予今当补述周妇气上冲之情形,据述其气确发源于小腹,唯并非仅中道一线直上,仿佛腹之两旁皆有小线向上中方向升腾,直冲至心脏部分而杳。方其冲也,颇觉难堪,及其杳也,不知何去。而白津之忽涌忽止,又皆出于不能自主。如是前后数分钟,方复原状。然而神为之疲,食为之减。

吾人当注意此妇之逆气冲至心而杳一语,与经文"气从少腹上冲心者"、"气从少腹上至心"二语,悉合符节。经文之"至"字,有以心为止境,至此而止之意。经文之"冲"字,有以心为正鹄,冲此即中之义。经文冲心至心大同小异之二条,悉主桂枝加桂汤,故予治本案冲心至心之奔豚,亦用桂枝加桂汤。

此妇服药得矢气后,则上冲之气顿减,可见冲心之逆气无非肠 中之矢气,肠中之矢气即是冲心之逆气。意者肠中发酵之瓦斯,既 不能泄于下,势必膨于中,故腹胀满。而腹之胀满程度又殊有限 制,故此时瓦斯乃随时有上溢之可能。适肠系于肠间膜,膜中有无 数静脉管吸液上行,平时因血管有关约之作用,瓦斯不能溢入血 管。适其人暴受惊恐,关约失其效能(吾人手方握物,受惊则物堕 地。书载难产之妇,因骤闻响器掷地,胎儿安下。是皆关约筋因惊 失效之明证),于是瓦斯乘机溢入血管。此溢入之量必甚微渺,然 其害已烈,观西医之注射液剂,必避免空气之随人,慎之又慎,可见 一斑。设瓦斯溢入者为动脉管,则二者逆向而行,痛楚斯甚。以予 亿测,此种瓦斯甚且逆大动脉而上薄心脏,但心脏瓣膜开阖喷压之 力殊强,故瓦斯终为击溃,或下退原处而杳。药以桂枝加桂汤者, 因桂枝能助动脉血运畅行之故,更加桂心以为君,则其喷压之力更 强,而瓦斯乃不能上溢,但能下返(予前释桂枝汤中桂枝之用与此 处相合,尚不致有两歧之误)。如此解释,似觉圆满。但依生理书 言,肠中毒素每能侵入血管,至肠中之瓦斯殊不能溢入血管之中。

