根汤方可以治麻疹之初起也(麻疹之顺者可勿服药,服药而误,反易 偾事)。阅者将疑麻桂之决不可治疹病者乎,则吾师遇麻疹病之遏 伏甚而不透发者,且用麻黄汤。服汤已,疹乃畅发。唯窃细心考察, 间有透发之后,引起灼热者,是正所谓"若发汗已,身灼热者,名曰风 温"。但余早已言及,此所谓灼热并非不得了之谓,其轻者将自己, 其重者亦可以补治。唯窃意与其补治于后,宁早用葛根预防于前, 故余之治小儿麻疹,葛根乃为第一味要药。回观本案赵先生方中, 既用前胡、牛蒡、桔梗等开发之品,即可以代麻黄之司。故谓本方为 桂枝汤加葛根加味,毋宁谓葛根汤加味,与余之方治乃密合无间也。

余用麻黄常由八分至二钱,用桂枝常由钱半至三钱,用葛根常 由二钱至四钱,若吾师之用此三药,则更倍蓰于是。故三药之中, 以葛根最为和平。奈何今之医尚多不敢下笔,徒知拾前人之唾余, 曰"葛根是阳明药,若邪未入阳明而早用之,将引邪入内",曰"葛 根竭胃汁",是可慨也。

曹颖甫曰:世之论者动称温病无主方,而《伤寒论》一书几疑 为专治伤寒而设,不知越人言伤寒有五,温病即在其中。今姜生能 干大论中发明葛根汤为太阳温病之主方,真能发前人所未发。盖 葛根汤证与伤寒不同者,原以津液不足之故,故于桂枝汤中加麻黄 而君葛根。中风证而津液不足者即用桂枝汤本方而加葛根。太阳 标热内陷而下利者即用葛根芩连汤,以清热生津为主。盖人体中 水分多于血分,则易从寒化,故藏于精者,春不病温。血分多于水 分,则易从热化,故冬不藏精,春必病温。从寒化者,伤寒不愈,浸 成痰饮,虽天时转阳,犹宜小青龙汤。从热化者,中风误治即成热 病,为其津液少也。即此意以求之,则葛根为太阳温病主药,葛根 汤为太阳温病主方,不益可信乎?

36. 痧后善哭

陈小

发痧子后,善哭,经言,在志为悲,在声为哭,证属肺虚,以其金