

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: IMMED II

DATE : 8 juin 2009

DURÉE : 14h-16h

Techniques exploratoires

1. Beschreiben Sie die klinischen und radiologischen Zeichen einer Nierenbeckenentzündung. (4 P)
2. Wie erkennt man eine Nierenzyste bei der Urographie, bei der Angio, im IRM und im CT? (6 P)
3. Mit welcher Röntgenuntersuchung wird eine freie Perforation nachgewiesen? (2 P)
4. Was sagt die Klinik bei einer Hiatushernie? (2 P)
5. Nennen Sie die Indikationen einer Abdomenleeraufnahme. (8 P)
6. Was ist ein Morbus Crohn? (1 P)
7. Wie erkennt man beim Grêle/Transit die einzelnen Abschnitte des Dünndarms? (2 P)
8. Wo kann sich ein Zenker-Divertikel befinden? (1P)
9. „Pied en charge lat.“ (5 P)
 - a) Nennen Sie 2 mögliche Indikationen.
 - b) Zählen Sie die Qualitätskriterien zu dieser Aufnahme auf.
10. Einstelltechnik: (8 P)

Fallbeispiel: Ein 70jähriger Patient soll wegen starker Schmerzen beim Gehen – eine **Extension des Hüftgelenks ist unmöglich** - in der rechten Hüfte geröntgt werden, bei der ersten Aufnahme handelt es sich um eine Hüftaufnahme ap. Begründen und beschreiben Sie welche 2. Aufnahme Sie anfertigen werden.

- Um welche Aufnahme handelt es sich?
- Vorbereitung des Patienten.
- Lagerung des Patienten.
- Aufnahmespannung.
- Brennfleck:
- **Zentrierung:**
 - Zentralstrahl
 - Strahlengang
- Qualitätskriterien der Aufnahme.

11. Einstelltechnik: Symphyse (8 P)

Erklären Sie die verschiedenen einstelltechnischen Möglichkeiten zur Aufnahme (und guter Beurteilbarkeit) der Symphyse. Jeweils mit Patientenvorbereitung, exakter Lagerung, Strahlengang/ZS, Filmformat.

12. Beschreiben Sie die Einstelltechnik (exakte Lagerung, ZS) **genau so wie sie auf dem Bild ist – ACHTUNG!!** auf der nachfolgenden Aufnahme. (3 P)



13. Erklären Sie die „Seldinger-Technik“. (7 P)

14. Nennen Sie drei Indikationen zur Phlebographie der Beine. (3 P)