

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE: COSPI

DATE :

DURÉE :

Liste de questions

3 juin 2009

2h

1. Die venöse Thrombose-Emboliegefahr: Prophylaxe
 - 1.1. Nennen Sie die 3 Hauptursachen der Thrombenbildung und geben Sie für jede dieser Ursachen ein konkretes Beispiel an. 3 Punkte
 - 1.2. Nennen und erklären Sie 2 nicht -medikamentöse (physikalische) Maßnahmen der Thromboseprophylaxe. 4 Punkte
 - 1.3. Nennen Sie die medikamentöse Thromboseprophylaxe ? 1 Punkt
1. *La prévention de la thrombose veineuse profonde*
 - 1.1. *Nommez les 3 causes principales de la formation d'un thrombus et donnez pour chacune de ces causes un exemple concret.* 3 points
 - 1.2. *Nommez et expliquez 2 interventions non- médicamenteuses de la prévention de la thrombose.* 4 points
 - 1.3. *Nommez une mesure de prévention médicamenteuse.* 1 point
2. Erklären Sie die Gesundheitsberatung bei arteriellen Gefäßerkrankungen in Bezug auf die
 - Ernährung
 - allgemeine Lebensführung
 - Kleidung und HautpflegeGeben Sie jeweils 2 Ratschläge an. 9 Punkte
2. *Expliquez l'éducation sanitaire en cas de pathologies artérielles concernant*
 - l'alimentation
 - le style de vie
 - l'habillement et les soins cutanés.*Nommez 2 conseils par item.* 9 points

3. Rezidivprophylaxe bei Nierensteinen
- 3.1. Nennen Sie 3 wünschenswerte Vorbeugungsmaßnahmen . 6 Punkte
- 3.2. Welche spezifische Empfehlung geben Sie einem Patienten der Kalziumoxalatsteine aufwies? 2 Punkte
3. *La prévention de récurrence des lithiases rénales*
- 3.1. *Citez 3 mesures de prévention générale recommandées.* 6 points
- 3.2. *Quel conseil spécifique donnez-vous à un patient ayant eu des lithiases d'oxalate de calcium ?* 2 points
4. Sie arbeiten auf einer kardiologischen Station. Beim Eintritt in ein Zimmer finden Sie Herrn M. vor, der stark hustet und eine beeinträchtigte Atmung hat mit Rasselgeräuschen. Er ist zyanotisch und sehr unruhig.
- 4.1. An welches Krankheitsbild denken Sie? 1 Punkt
- 4.2. Welche Maßnahmen treffen Sie bis der Arzt Ihnen Verordnungen gibt? 5 Punkte
4. *Vous travaillez dans un service de cardiologie. Lorsque vous entrez dans une chambre, vous trouvez Monsieur M. qui tousse fort et qui a une respiration difficile et des râles. Il présente une cyanose et se montre très nerveux.*
- 4.1. *A quelle situation clinique pensez-vous ?* 1 point
- 4.2. *Quelles sont les interventions que vous faites jusqu'à ce que le médecin fait des prescriptions ?* 5 points
5. Eine junge Patientin bei der Diabetes diagnostiziert wurde soll von Ihnen eine Gesundheitsberatung bekommen hinsichtlich ihrer Fußpflege.
- 5.1. Erklären Sie der Patientin die Wichtigkeit der Fußpflege in ihrer Situation 2 Punkte
- 5.2. Erklären Sie ihr 4 geeignete Prophylaxen um einen diabetischen Fuß zu vermeiden. 6 Punkte
5. *Vous devez faire une éducation à la santé chez une jeune patiente chez qui on a diagnostiqué un diabète.*
- 5.1. *Expliquez à la patiente l'importance des soins de pieds dans sa situation.* 2 points
- 5.2. *Expliquez-lui 4 mesures de prévention adaptées afin d'éviter un pied diabétique.* 6 points
6. Wie können Aggressionen in der häuslichen Elternpflege abgebaut respektiv vorgebeugt werden? Nennen und argumentieren Sie 4 Strategien. 6 Punkte
6. *Comment peut-on réduire ou prévenir les agressions dans la prise en charge de ses parents à domicile ? Énumérez et argumentez 4 stratégies.* 6 points

7. Informationen einer Patientin vor Beginn einer Zytostatikatherapie:

7.1. Erklären Sie die Informationen bezüglich:

- Alopezie
- Mundpflege
- Übelkeit

9 Punkte

7. *Informations à donner avant le début d'une chimiothérapie:*

7.1. *Expliquez les informations par rapport:*

- *à l'alopécie*
- *aux soins de bouche*
- *aux nausées*

9 points

8. Sie müssen Heparin gemäß folgender Arztanordnung verabreichen:

600 UI/kg in 24 Stunden, bei einer Person mit einem Gewicht von 80 kg.

Sie verfügen über Heparin Fläschchen von 25000 UI/5ml und einer 50ml „Perfusor“-Spritze. Die Einlaufgeschwindigkeit beträgt 2ml/Stunde.

8.1. Welche Quantität von Heparin und NaCl 0,9% (in ml) brauchen Sie um die Arztanordnung zu befolgen?

8.2. Welche Quantität Heparin (in IE und ml) bleibt in der „Perfusor“-Spritze noch übrig nach 8 Stunden?

6 Punkte

8. *Vous devez administrer de l'Héparine° selon la prescription médicale suivante :*

600 UI/kg en 24heures, chez une personne pesant 80 kg de poids corporel.

Vous disposez de flacons d'Héparine° contenant 25000 UI/5ml, et d'une seringue de « Perfusor » de 50 ml. Le débit de perfusion est de 2 ml/heure.

8.1. *De quelle quantité d'Héparine et de NaCl 0,9% (en ml) avez-vous besoin pour assurer la prescription ?*

8.2. *Quelle quantité d'Héparine (en UI et en ml) se trouve encore dans la seringue de « Perfusor » après 8 heures ?*

6 points