

# ÉPREUVE ÉCRITE

## Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle

### EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

#### Division des Professions de Santé et des Professions sociales

#### Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE:

Sciences médicales

DATE :

8 juin 2009

DURÉE :

2 heures

**1. Lungenembolie 8 P**

- a. Erläutern Sie Ursachen und Entstehung. 2 P
- b. Beschreiben Sie die typischen Symptome und die möglichen Komplikationen. 4 P
- c. Beschreiben Sie die Therapie. 2 P

**1. L'embolie pulmonaire 8 p**

- a. Commentez les causes et l'origine. 2 p
- b. Décrivez les symptômes typiques et les complications possibles. 4 p
- c. Décrivez le traitement. 2 p

**2. Fallbeispiel 12 P**

Ein 49-jähriger Patient mit einem, seit dem 10. Lebensjahr bekannten, Diabetes mellitus klagt über retrosternale Schmerzen bei körperlicher Belastung, die in die linke Schulter ausstrahlen.

Bei der körperlichen Untersuchung finden sich ausgeprägte, beidseitige Beinödeme sowie ein Blutdruck von 170/100 mmHg.

- a. Erklären Sie, wodurch die Symptome des Patienten verursacht sein können. 2 P
- b. Nennen Sie alle diagnostischen Maßnahmen, die bei dem Patienten notwendig sind und erklären Sie den Zweck der Untersuchungen. 4 P
- c. Nennen und beschreiben Sie weitere Folgekomplikationen des Diabetes mellitus und erklären Sie, wie man feststellt, ob sie bei dem Patienten vorliegen. 4 P
- d. Beschreiben Sie, wie der Diabetes mellitus Typ I behandelt wird. 2 P

**2. Cas clinique 12 p**

*Un patient de 49 ans, qui présente un diabète depuis l'âge de 10 ans, se plaint de douleurs rétrosternales à l'effort qui irradie dans l'épaule gauche.*

*L'examen clinique montre des œdèmes étendus des deux membres inférieurs et une tension artérielle à 170/100 mm Hg.*

- a. *Expliquez les causes possibles des symptômes.* 2 P
- b. *Nommez tous les examens nécessaires pour établir le diagnostic et expliquez la raison de ces examens.* 4 p
- c. *Nommez et décrivez d'autres complications du diabète et leurs moyens d'exploration.* 4 p
- d. *Décrivez le traitement du diabète type I.* 2 p

### 3. **Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.** **14 P**

Überprüfen Sie die folgenden Aussagen und notieren Sie jeweils EINE zutreffende Antwort (a-e) auf Ihrem Prüfungsblatt. (Beispiel: Ib oder IIc)

#### **I.**

1. Der paralytische Ileus kann durch eine Gallenkolik entstehen.
  2. Beim paralytischen Ileus kommt es zu krampfartigen Schmerzen.
  3. Der mechanische Ileus kann zum Volumenmangelschock führen.
  4. Der mechanische Ileus wird meistens konservativ behandelt.
  5. in der Röntgenaufnahme sieht man beim mechanischen Ileus aufgeblähte Darmschlingen.
- a) Nur 1 und 5 sind richtig.
  - b) Nur 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur 3 und 4 sind richtig.
  - d) Nur 1 und 3 sind richtig.
  - e) Nur 1, 3 und 5 sind richtig.

#### **II.**

1. Der Morbus Crohn beginnt meist im Rektum.
  2. Die Entzündung beim Morbus Crohn betrifft alle Darmwandschichten.
  3. Die Patienten mit Morbus Crohn leiden meist unter einer Anämie wegen der stark blutigen Durchfälle.
  4. Die Therapie des Morbus Crohn ist vorwiegend konservativ.
- a) alle Aussagen sind richtig
  - b) nur 1 und 2 sind richtig
  - c) nur 2 und 3 sind richtig
  - d) nur 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) nur 2 und 4 sind richtig

#### **III.**

1. Die Colitis ulcerosa kann im gesamten Gastrointestinaltrakt vorkommen.
  2. Die Colitis ulcerosa entartet sehr selten zum Kolonkarzinom.
  3. Die Patienten mit Colitis ulcerosa haben maximal 5mal pro Tag schleimige Durchfälle.
  4. Die Colitis ulcerosa wird bei Erfolglosigkeit der konservativen Therapie mit einer Proktokolektomie behandelt.
  5. Eine typische Komplikation der Colitis ulcerosa ist das toxische Megakolon.
- a) nur 1 ist richtig
  - b) nur 4 ist richtig
  - c) nur 2 und 3 sind richtig
  - d) nur 4 und 5 sind richtig
  - e) alle sind falsch

#### **IV.**

1. Bei akuter Appendizitis verstärken sich die Schmerzen bei Beugung des rechten Beines.
2. Bei gedeckter Perforation der Appendix kommt es zu einer lokalen Peritonitis.
3. Bei perforierter Appendizitis darf nicht sofort operiert werden.
4. Zu den klassischen Symptomen bei Appendizitis gehören Fieber und Erbrechen.
5. Durch eine akute Appendizitis kann ein Ikterus entstehen.

- a) nur 1 und 3 sind richtig
- b) nur 2 und 4 sind richtig
- c) nur 2 und 3 sind richtig
- d) nur 1 und 5 sind richtig
- e) nur 2 und 5 sind richtig

#### **V.**

1. Durch ballaststoffarme Ernährung entstehen häufiger Dickdarmpolypen.
2. Darmpolypen können einen Ileus und Blutungen verursachen.
3. Dickdarmpolypen bestehen aus den 3 Darmwandschichten.
4. Die familiäre adenomatöse Polyposis ist eine Präkanzerose.
5. Dickdarmpolypen werden durch Laparoskopie reseziert.

- a) nur 1, 3 und 5 sind richtig
- b) nur 2, 4 und 5 sind richtig
- c) nur 1, 2 und 4 sind richtig
- d) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- e) alle sind richtig

#### **VI.**

1. Das kolorektale Karzinom wird durch eine Helicobacter pylori-Infektion begünstigt.
2. Die meisten Kolonkarzinome machen früh Symptome.
3. Das Kolonkarzinom kann durch Darmresektion und Chemotherapie behandelt werden.
4. Bei Dickdarmresektion muss immer ein Enterostoma angelegt werden.
5. Postoperativ kann es nach Darmresektion zu Blasenentleerungsstörungen kommen.

- a) nur 1 und 3 sind richtig
- b) nur 3 und 5 sind richtig
- c) nur 3 und 4 sind richtig
- d) nur 2,3 und 4 sind richtig
- e) nur 1, 3 und 5 sind richtig

#### **VII.**

1. Die chronische chemisch-toxische Gastritis kann eine perniziöse Anämie verursachen.
2. Bei chronischer Autoimmungastritis entsteht ein erhöhtes Magenkarzinomrisiko.
3. Die Autoimmungastritis wird mit Vitamin D-Injektionen behandelt.
4. Die Perforation eines Magengeschwürs macht sich durch einen Kreislaufschock bemerkbar.
5. Das durch Helicobacter pylori verursachte Ulkus wird während 4 Wochen mit Antibiotika und Protonenpumpenhemmern behandelt.

- a) nur 1,2 und 5 sind richtig
- b) nur 1,3 und 4 sind richtig
- c) nur 2 und 5 sind richtig
- d) nur 2, 3 und 4 sind richtig
- e) nur 2 und 4 sind richtig.

### 3. Maladies du tube digestif.

14 p

Vérifiez les affirmations suivantes et ne notez qu'une seule réponse ( de a à e) sur votre copie d'examen (exemple: Ib ou IIc).

#### **I.**

1. L' iléus paralytique peut être causé par une colique cholécystique.
2. L' iléus paralytique provoque des crampes douloureuses.
3. L' iléus mécanique peut provoquer un choc hypovolémique.
4. L' iléus mécanique est traité le plus souvent de manière conservatrice.
5. En cas d' iléus mécanique la radio montre des anses intestinales dilatées.

Sont corrects uniquement:

- a) 1 et 5
- b) 2 et 5
- c) 3 et 4
- d) 1 et 3
- e) 1, 3 et 5

#### **II. La maladie de Crohn**

1. La maladie de Crohn prend le plus souvent son origine dans le rectum.
2. L' inflammation atteint toutes les couches de la paroi intestinale.
3. Les patients présentent le plus souvent une anémie due aux diarrhées fortement hémorragiques.
4. Le traitement est surtout conservateur.

- a) toutes les affirmations sont correctes
- b) uniquement 1 et 2 sont corrects
- c) uniquement 2 et 3 sont corrects
- d) uniquement 2,3 et 4 sont corrects
- e) uniquement 2 et 4 sont corrects

#### **III. La colite ulcéreuse**

1. La colite ulcéreuse peut se produire dans l'ensemble du tube digestif.
2. La colite ulcéreuse dégénère très rarement vers un cancer du colon.
3. Les patients présentent au maximum 5 selles diarrhéiques glaireuses par jour.
4. En cas d'échec du traitement conservateur, une colectomie avec résection du rectum est proposée.
5. Une complication typique est le mégacolon toxique.

- a) uniquement 1 est correct
- b) uniquement 4 est correct
- c) uniquement 2 et 3 sont corrects
- d) uniquement 4 et 5 sont corrects
- e) Toutes les affirmations sont fausses

#### **IV. L'appendicite**

1. Dans l'appendicite aiguë, la flexion de la jambe droite accentue les douleurs.
2. La perforation appendiculaire couverte provoque une péritonite localisée.
3. La laparotomie en urgence est contraindiquée en cas d'appendicite perforée.
4. Les symptômes typiques de l'appendicite sont la fièvre et les vomissements.
5. L'appendicite aiguë peut provoquer un ictère.

sont corrects uniquement :

- a) 1 et 3
- b) 2 et 4
- c) 2 et 3
- d) 1 et 5
- e) 2 et 5

#### **V. Les polypes de l'intestin**

1. L'alimentation pauvre en fibres peut favoriser la formation de polypes du colon.
2. Les polypes peuvent produire un iléus et des saignements.
3. Les polypes coliques sont formés des 3 couches de la paroi intestinale.
4. La polyposé adénomateuse familiale constitue un état précancéreux.
5. Les polypes du colon sont enlevés par laparoscopie.

- a) uniquement 1, 3 et 5 sont corrects
- b) uniquement 2, 4 et 5 sont corrects
- c) uniquement 1, 2 et 4 sont corrects
- d) uniquement 1, 2 et 5 sont corrects
- e) toutes les affirmations sont correctes

#### **VI. Le cancer du colon**

1. est favorisé par une infection par *helicobacter pylori*.
2. La plupart des cancers du colon provoquent des symptômes au stade précoce
3. peut être traité par une résection colique et par chimiothérapie.
4. La résection colique doit toujours être accompagnée d'un anus artificiel.
5. Dans la phase postopératoire après une résection du colon des troubles de la vidange vésicale peuvent apparaître.

Sont corrects uniquement:

- a) 1 et 3
- b) 3 et 5
- c) 3 et 4
- d) 2, 3 et 4
- e) 1, 3 et 5

#### **VII. Maladies de l'estomac**

1. La gastrite chronique chimique et toxique peut provoquer une anémie pernicieuse.
2. La gastrite autoimmune augmente le risque de cancer gastrique.
3. La gastrite autoimmune est traitée par injection de vitamine D.
4. La perforation d'un ulcère gastrique se manifeste par un état de choc.
5. L'ulcère gastrique provoqué par *helicobacter pylori* est traité par antibiotiques et inhibiteurs de la pompe à protons pendant 4 semaines.

Sont corrects uniquement:

- a) 1, 2 et 5
- b) 1, 3 et 4
- c) 2 et 5
- d) 2, 3 et 4
- e) 2 et 4

4. **Hypovolämischer Schock** **10 P**
- a. Beschreiben Sie die Ursachen und die Entwicklung. 4 P
  - b. Nennen Sie die typischen Symptome. 2 P
  - c. Erläutern Sie die Therapie. 4 P
4. **Le choc hypovolémique** **10 p**
- a. *Décrivez les causes et l'évolution.* 4 p
  - b. *Nommez les symptômes typiques.* 2 p
  - c. *Commentez le traitement.* 4 p
5. **Affektive Störungen** **10 P**
- a. Beschreiben Sie die typischen Symptome der Manie. 4 P
  - b. Beschreiben Sie die Therapiemethoden bei Depression. 6 P
5. **Les troubles affectifs** **10 p**
- a. *Décrivez les symptômes typiques d'une manie.* 4 p
  - b. *Décrivez les méthodes thérapeutiques des dépressions.* 6 p
6. **Knochenmarktransplantation** **6 P**
- a. Beschreiben Sie das Verfahren. 4 P
  - b. Erläutern Sie die Risiken für den Patienten. 2 P
6. **La transplantation de moëlle** **6 p**
- a. *Décrivez la méthode.* 4 p
  - b. *Commentez les risques pour le patient.* 2 p