




Московский
Институт
Психоанализа

«Эмоционально- фокусированная терапия»






Авдеев Павел Сергеевич

- Клинический психолог, гипнотерапевт, гештальт-терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт третьей волны.
- Создатель обучающего YouTube-канала SimplePsychology.
- Автор книг «Психология лидерства», «Гипноз и регрессивная гипнотерапия», «Энциклопедия психотерапии», «Гештальт-терапия, фокусированная на эмоциях»
- Член редколлегии научного журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»
- Участвовал в подготовке гипношоу на федеральном телевидении.
- Проводит научно-популярные лекции в МГМУ имени И.М. Сеченова, Пирогова, Зоомузее МГУ и других местах.



SimplePsychology.ru




Упражнение 1.

Про привязанность и активное слушание

1. Разбивайтесь на двойки
2. Первый человек рассказывает, второй слушает. Первый 4 минуты увлечено, следующие 4 минуты, никак не реагируя.
3. Как вы себя чувствовали и что хотелось сделать?




Основания ЭФТ



Клиент-
центрированная
терапия



Системная
семейная
терапия



Теория
привязанности
Боулби



Московский
Институт
Психоанализа

Цель терапии

Восстановление надежного стиля привязанности (когда люди в паре начинают прямо выражать друг другу свои чувства и потребности) через осознание своего паттерна взаимодействия и получение корректирующего эмоционального опыта во время прямой коммуникации с партнером

Задачи

Осознание своих паттернов поведения

Понимание паттернов поведения партнера

Научение прямой коммуникации

Получение корректирующего опыта



Противопоказания терапии

Разные цели на терапию

Насилие

Невозможность способствовать открытости

Актуальная измена

Алкоголизм и наркозависимость

Отношения меньше года



Типы привязанности по Боулби



JOHN BOWLBY




Стандартная ссора



Московский
Институт
Психоанализа



Типы конфликтов



Упражнение 2.

Определение стиля привязанности

1. Как я обычно реагирую, когда партнёр/друг отдаляется? (Тревожусь, злюсь, отстраняюсь сам, ничего не чувствую?)
2. Мне комфортно полагаться на других, или я предпочитаю быть независимым?
3. Как я переживаю разлуку? (Паника, равнодушие, смешанные чувства?)
4. Часто ли я сомневаюсь в искренности партнёра, даже без повода?
5. В споре я склонен: Настойчиво добиваться ответа? («Объясни, почему ты так поступил!»); Замыкаться и уходить в себя? Игнорировать проблему, пока она не «рассосётся»?
6. Какими были мои отношения с родителями в детстве? (Например: «Мать была непредсказуема — то ласкова, то холодна».)



Цикл взаимодействия в паре

Преследующий

Отстраняющийся

Ситуация
«Купил лимонов меньше чем надо»

Поведение (триггер)
Устраивает скандал

Поведение (триггер)
Обесценивает, уходит

Вторичные эмоции
Гнев

Вторичные эмоции
Раздражение, обида

Восприятие
Он опять забыл про меня

Восприятие
Она придирается



Упражнение.

Определение стиля привязанности по видео



Московский
Институт
Психоанализа



Диагностическое интервью



1. ВХОД В ЦИКЛ

Конкретные внешние обстоятельства, которые запускают цепочку эмоций и избегания (то что можно записать на камеру)

Цель: идентифицировать повторяющиеся поведенческие паттерны без обвинений

1. «Назови последнюю ситуацию, где проявлялась проблема»
2. «Как обычно начинается ваш спор? С какой фразы или действия?»
3. «Что первый человек делает? А что потом делает второй?»
4. «Если бы вы снимали вас на видео, что бы вы увидели первым? Кто первым меняет позу, голос, выражение лица?»
5. «Как вы узнаете, что "поезд сошёл с рельсов"? Есть ли у вас сигнал — внутренний или внешний?»
6. «Как долго длится этот танец? Часами, днями или вы отходите быстро?»
7. «Что обычно происходит после ссоры — вы миритесь, замораживаетесь или делаете вид, что ничего не было?»



2. Восприятие

Восприятие – это представление о том, что думает другой партнер во время конфликта (чтение мыслей)



Цель: выявить искажённый образ партнёра, который запускает защиту

1. «Что по твоему твой партнер думает в этот момент, зачем он так делает?»
2. «Что, по-твоему, партнёр хочет сделать своим действием? Заставить тебя страдать? Защититься? Привлечь внимание? Унизить тебя?»
3. «Ты думаешь, что партнёр специально делает то, что тебе больно? Или это происходит автоматически, неосознанно?»
4. «Какую цель ты приписываешь партнёру? "Он хочет меня контролировать", "Она хочет меня бросить", "Ему плевать на меня"?»
5. «Если бы ты мог(ла) прочитать мысли партнёра в тот момент — что бы ты там увидел(а)? Что он думает о тебе?»



3. Вторичная эмоция

Наименование конкретизированной эмоции, которую испытывают клиенты в данной ситуации

Цель: выявить те эмоции, которые видны партнёру (гнев, раздражение, холодность, сарказм)

1. «Что ты чувствуешь в этот момент?»
2. «Что чувствуешь, когда говоришь об этом? Что сейчас в теле/руках?»
3. «Я бы на твоём месте чувствовал обиду» (эмпатический отклик)
4. «Что твой партнёр видит на твоём лице в этот момент?»
5. «Какое слово лучше всего описывает твою реакцию: злость, раздражение, молчание, уход, крик, сарказм?»
6. «Если бы я спросил твоего партнёра: "Что он делает, когда вы ссоритесь?" — что бы он ответил?»
7. «Твоя внешняя реакция — это скорее "нападаю" или "отключаюсь"?»
8. «Что ты делаешь, когда чувствуешь, что проигрываешь в споре?»



Работа с эскалацией

Эскалация

Предварительно делаем контракт на прерывание

Директивно прерываем (давайте здесь остановимся)

Эмпатический отклик (Я вижу, что здесь много чувств/Ситуация сложная и вы злитесь)

Переводим внимание с партнера внутрь (Да, то что она говорит со мной может злить, но что происходит в этот момент с тобой?)

Обращаем внимание на другого партнера (Важно, чтобы он тебя услышал)

Цикл взаимодействия в паре

Преследующий

Отстраняющийся

Ситуация

«Купил лимонов меньше чем
надо»

Поведение (триггер)
?


Поведение (триггер)
?

Вторичные эмоции
?

Вторичные эмоции
?

Восприятие
?

Восприятие
?



Упражнение 3.

Сборка цикла взаимодействия

1. Делимся на тройки
2. один терапевт и пара
3. По 20 минут на смену, собираем цикл взаимодействия

Берем кейс из фильма

Кейс 1.1. «Она кричит – он молча слушает»

Кейс 1.2. «Он контролирует – она уходит в другую комнату»

Кейс 3.1. «Она пытается помочь – он отталкивает»

Кейс 4.1. «Обвинитель – Оправдывающийся» (с ситуацией измены)

Кейс 5.2. «Инициатор (она иницирует ласки) – Застывший (Он раздражается или холодон, потому что переживает из-за потенции)»



Активное слушание

Вторичные и первичные чувства



Реакции на угрозу привязанности




Виды чувств

Первичные чувства

Первичный отклик на ситуацию

Адаптивны

Напрямую связаны с базовыми
потребностями




Вторичные чувства

Защищают от первичных

Дезадаптивны

Не связаны с базовыми потребностями



Виды чувств

Первичные чувства - уязвимость

Я боюсь остаться один

Я боюсь твоей агрессии

Я боюсь, что не получится

Я боюсь быть не принятым

Мне больно видеть как все рушится

Мне больно видеть то, что он с собой делает

Вторичные чувства - это защита

Поэтому я начинаю ревновать и требовать доказательств любви

Поэтому я начинаю атаковать первый

Поэтому я злюсь на себя и стараюсь больше

Поэтому я начинаю стыдиться

Поэтому я начинаю требовать

Поэтому я ненавижу его

Цикл взаимодействия в паре

Преследующий

Отстраняющийся

Ситуация
«Купил лимонов меньше чем надо»

Поведение (триггер)
Устраивает скандал

Демовидео. Первичные чувства



Московский
Институт
Психоанализа



Базовый сеттинг



Поза слушающего: наклон к собеседнику, наклон головы, открытость

Зрительный контакт и внимание на клиенте

Отказ от оценок и советов

Отказ от перебивания (за рядом исключений)

Честность и прямота

Низкий спокойный голос

Подкрепления самораскрытия (междометия)

Возможность делать паузы



Гештальтгипнотерапия

Отражение

Отражение – повторение терапевтом фраз и возвращение поведенческих проявлений с акцентом на эмоциональное содержание, с целью углубления переживаний.

Что отражаем?

Отдельные слова

Фразы

Поведение

Ситуацию

Схему SED

Невербалику

Как отражаем?

Повторение слов/фраз

Вопросы-парафразы

Озвучивание поведения

Обобщения

Рефрейминг

Цели отражения

1. Углубить текущую тему
2. Повысить осознанность клиента
3. Получить доступ к эмоциям
4. Создать ощущение, что клиента слышат

Подтверждение

*Подтверждение (ратификация)
– указание на нормальность
поведения, мыслей, чувств
клиента в его обстоятельствах
и при его восприятии*

Что подтверждаем?

Мысли

Эмоции

Чувства

Поведение

Как подтверждаем?

Опираясь на общую логику
ситуации

Опираясь на собственный опыт

Опираясь на других людей

Опираясь на текущее состояние
клиента

Цели подтверждения:

- 1. Снять защиты при разговоре об эмоциях.*
- 2. Нормализовать эмоции (убрать вторичные убеждения).*
- 3. Показать, что терапевт слышит и понимает.*

4. ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ

Первичные эмоции – первичный отклик на ситуацию –
уязвимость клиента

Цель: доступ к уязвимым чувствам — страху, стыду, печали, одиночеству

1. Что это значит для тебя?
2. Что здесь самого болезненного и неприятного?
3. Что может произойти самого худшего (катастрофа)?
4. «В тот момент, когда ты кричишь (или молчишь) — чего ты боишься больше всего?»
5. «Что тебе говорит твой внутренний голос в разгар ссоры? "Меня бросят"? "Я плохой"? "Меня не любят"?»
6. Что именно в этой ситуации вызвало именно эту эмоцию?
7. Какой ты в этой ситуации?
8. Что эта ситуация говорит о ваших отношениях/о том какой ты муж/о том как она относится к тебе?
9. «Что происходит с твоим телом в момент, когда цикл запускается? Где напряжение? Где пустота?»



4. ПОТРЕБНОСТИ ПРИВЯЗАННОСТИ

Цель: выявить, какой именно акт привязанности ищет партнёр

1. «В глубине этого спора — тебе нужно, чтобы партнёр тебя обнял, похвалил, просто сел рядом, поверил тебе?»
2. «Что ты хочешь услышать от партнёра в самый острый момент? Дословно. Какую фразу?»
3. «Чего ты хочешь от партнёра: чтобы он не уходил, чтобы он перестал кричать, чтобы он признал твою правоту?»
4. «Если бы твой партнёр сделал одно маленькое действие, которое сказало бы “я с тобой, я не брошу” — что это было бы?»
5. «Как ты себя чувствуешь → чего ты боишься → чего тебе на самом деле нужно от партнёра? Построй эту цепочку сам(а).»

Упражнение 4.

Определение первичных чувств

1. Делимся на тройки
2. один терапевт и пара
3. По 20 минут на смену, собираем цикл с помощью активного слушания, переходим к первичным чувствам




Углубление чувств



Двухфакторная теория Морера

Классическое
обуславливание

Оперантное
научение



Окно толерантности




В процессе терапии мы
все больше расширяем
окно толерантности, т.е.
возможность человека
осознавать и
контролировать свои
эмоции

Время удержания в эмоции


Время	Что происходит
0–15 сек	Вход в эмоцию, пик активации
15–45 сек	Плато эмоции, начало привыкания
45–90 сек	Сдвиг (ослабление или трансформация)
> 90 сек	Риск затопления, если нет признаков сдвига

Речевое угасание



Проговаривание
эмоционального
содержания
приводит к его
угасанию

Техника дифференциации





Дифференциация – техника направленная на прояснение и осознание гештальтов клиента (мыслей, воспоминаний, ситуаций), что позволяет входит в более адаптивный контакт со средой




Фокусирование (замедление)

Фокусирование –
подразумевает
концентрацию внимания на
тех или иных процессах



Техника драматизации



Драматизация – нагнетание эмоций, за счет указания на самые болезненные точки и их «раскручивания»

Так грустно
слышать это

Посмотри на того
маленького мальчика,
разве тебе не жалко его?

Ты говоришь так, как будто
ничего не произошло, но это
же была трагедия

Тебе наверняка было
очень тяжело
переживать такое





Амплификация

Амплификация –
усиление действий
клиента с целью их
осознания



«Попробуй усилить
это движение»



Упражнение 5.

Углубление эмоций

1. Делимся на тройки
2. один терапевт и пара
3. По 20 минут на смену, возвращаемся к эмоциям и углубляем их



Инсценировки и работа с прерывания



Демовидео. Процесс исцеления



Московский
Институт
Психоанализа



Инсценировка/Эксперимент

Эксперимент делается, когда клиент осознает свои первичные чувства. В этот момент мы предлагаем клиенту напрямую выразить их партнеру.

Правила

Следим за тем, чтобы клиент доносил именно первичные чувства

Подсказываем слова, исходя из негативного цикла

Поддерживаем в процессе выражения чувств и даем подкрепление

Процесс

Выявляем первичные чувства и побуждения клиента

Предлагаем обратиться с этим в сторону партнера

Обрабатываем эксперимент



Проработка эксперимента

Инсценировка

Сложность в
выражении
чувств

Делаем шаг назад: просим выразить свои сложности
(скажи, что тебе страшно об этом говорить)

Даем подкрепление
«экспериментатору»

Используем партнера: «Он готов тебя выслушать»

Просим обратную связь у
партнера

Объяснение (зачем это все нужно)

Просим обратную связь у
«экспериментатора»


Выражение через терапевта, а не партнера

Помощь терапевта (может быть сложно, но я помогу)

Ссылка на негативный цикл



Проработка эксперимента



Проработка эксперимента

Инсценировка

Даем подкрепление
«экспериментатору»

Просим обратную связь у
партнера

Просим обратную связь у
«экспериментатора»

Помогаем
интегрировать
опыт

А теперь слушай внимательно. Ты слышал раньше от него "мне жаль". Но сейчас было иначе. Что было иначе? В голосе? В лице? В паузе?

«Что это "жаль" сделало с твоим чувством "я не справляюсь"? Оно стало меньше? Или осталось таким же?»

«Запомни это. Он не решил твою проблему. Он не сказал, как помочь. Но ты стал дышать иначе. Это и есть близость — не решение, а присутствие.»

«Если первый партнёр говорит «всё равно не верю» или «стало ещё хуже» «Значит, его "жаль" до тебя не дошло. Что тебе нужно было бы услышать вместо этого? Какое слово или действие пробило бы эту стену недоверия?» И затем возвращается ко второму партнёру с конкретным запросом.

Эффект счастливого тупика

Ошибка: думать, что держание за ручки — это финал. В ЭФТ это середина Этапа 2, а не конец работы. Если остановиться здесь, пара уйдёт с тёплым, но нестабильным опытом. Через день старый цикл вернётся, потому что новая модель привязанности не закреплена.

Шаг 1. Не дать им «склеиться» и сбежать в комфорт.

Когда пара берётся за руки, часто включается ложное успокоение: «Всё хорошо, мы любим друг друга». Терапевт должен мягко разорвать это слияние, чтобы закрепить индивидуальные изменения.

«Я попрошу вас пока не смотреть друг на друга. Посмотрите на меня. А теперь скажите по очереди: что вы только что пережили за последние 5 минут, одним словом?»

Шаг 2. Определить разницу

«Б. Ты раньше, когда слышал "не справляюсь", чувствовал вину или раздражение. Сейчас ты взял за руку. Что ты чувствуешь к себе после этого? Ты себе нравишься больше? Или боишься, что теперь от тебя будут ждать этого всегда?»


Шаг 3. Протестировать новый цикл на «прочность» (испытание)

«Б. А теперь представь, что А говорит: "Ты держишь меня за руку, но я всё равно не верю, что тебе правда не всё равно". Что ты сделаешь: уберёшь руку в обиду или скажешь: "Я понимаю, что тебе нужно время, я подожду"?»


Шаг 4. Закрепить новый сценарий через «Репетицию возврата»

«У вас сейчас был новый опыт. Он хрупкий. Давайте сделаем его сильнее. Закройте глаза. Представьте завтрашний день. Вы ссоритесь из-за того же, из-за чего всегда. А потом вдруг — Б, ты вспоминаешь это "жаль" и эту руку. Что ты сделаешь иначе, чем в прошлый раз? Скажи вслух, как будто это уже происходит.»

Ход терапии



Здесь и сейчас



Там и тогда



Упражнение 5.

Полная сессия

1. Делимся на тройки
2. один терапевт и пара
3. По 20 минут на смену, собираем цикл с помощью активного слушания, производим эксперимент и работаем с блоками. Затем интегрируем опыт



Ход терапии

Создание альянса и диагностика основных конфликтных ситуаций

Анализ негативного цикла взаимодействия

Исследование избегаемых эмоций

Стимуляция прямой коммуникации и нового опыта

Изменение позиций в цикле (вовлечение отстраняющегося, смягчение преследующего)

Закрепление нового способа коммуникации и поиск новых решений



Упражнение 2. Отражение

1. Разбиваемся в двойки
2. Клиент рассказывает проблему
3. Терапевт отражает наиболее эмоционально заряженные слова и фразы, а также резюмирует их



Упражнение 3. Подтверждение

1. Разбиваемся в двойки
2. Клиент рассказывает проблему
3. Терапевт отражает и подтверждает сказанное



Упражнение 4. Подтверждение

1. Разбиваемся в двойки
2. Клиент рассказывает проблему
3. Терапевт делает отражение и эмпатический отклик («Я бы на твоём месте чувствовал...»)



Упражнение 5.

Отражение цикла одного человека

1. Разбиваемся в двойки
2. Клиент рассказывает проблему
3. Терапевт использует навыки отражение, подтверждения и эмоционального отклика, под конец суммирую схему реагирования клиента
(Когда нужно приступить к делу, тебе кажется, что у тебя не получится и поэтому неудивительно, что ты откладываешь его на потом)



Упражнение 6.

Отражение цикла в паре

1. Два терапевта проводят работу с парой
2. Используем все навыки для того, чтобы очертить негативный цикл, а затем делаем рефрейминг и суммируем его.



Упражнение 7.

Отражение цикла в паре

1. Два терапевта проводят работу с парой
2. После очерчивания негативного цикла производим инсценировку и обрабатываем ее



Дополнительные техники



Упражнение 8.

Работа с эскалацией

1. Два терапевта проводят работу с парой
2. Люди в паре начинают спорить
3. Терапевт тормозит их и продолжает работу



Углубление эмоций через травму

Вспомни где еще было это чувство/ощущения/мысли?

На что еще похожи ваши отношения?

Кому еще хотел бы это сказать?

Когда еще ты переживал такое?

Когда еще твое тело так реагировало?

Похоже ли это на то, что происходило у тебя в семье?

Похоже это на то, что было с папой/мамой?




Ход терапии



Рана привязанности

№	Тип раны привязанности	Сценарий	Раненый партнёр говорит
1	Измена	Один из партнёров завёл роман на стороне	Я чувствую себя преданным. Я думал, что могу тебе доверять
2	Отстранение в кризисе	Один ушёл в себя во время болезни/потери близкого	Ты ушёл, когда я больше всего в тебе нуждался
3	Сравнение и критика	Регулярное сравнение с бывшими или 'идеалом'	Я чувствую себя недостаточным рядом с тобой
4	Оскорбление в ссоре	Партнёр сказал обидное в пылу конфликта (критика внешности, "надо было выбрать другую/другого, ты поправилась после родов, тебе бы скинуть)	Это застряло во мне. Я не могу это забыть
5	Игнорирование боли	Один не замечал боли и страдания другого	Я был рядом, но чувствовал себя невидимкой
6	Публичное унижение	Обидные слова/шутка при других	Мне было стыдно. Я чувствовал себя ничтожным
7	Отказ в поддержке	Не был рядом в важный момент (роды, операция и т.п.)	Я чувствовал себя покинутым. Это изменило моё ощущение тебя
8	Замалчивание	Один из партнёров скрывал значимую информацию (про предыдущий брак, про детей и тд)	Ты утаил от меня важное. Я чувствую себя обманутым
9	Приоритеты вне отношений	Постоянно выбирал работу, друзей, гаджеты вместо партнёра	Мне казалось, что я не на первом месте у тебя
10	Несостоявшийся диалог	Раненый пытался говорить о важном, но его снова и снова не слышали	Я пытался говорить, но ты постоянно сводил всё к шутке или избегал
11	Травма от старого конфликта	Один из партнёров вспомнил, что прошлый конфликт не был прояснён	Я до сих пор не могу забыть тот день. Он разделил нас
12	Потеря ребёнка (беременность, младенец) - партнёр эмоционально отстранился	В важный, уязвимый, болезненный момент ты оне был со мной	Я рыдала каждый день, а ты просто замолчал. Мне казалось, тебе всё равно

Рана привязанности



1. Обозначение раны и ее связь с негативным циклом

2. Прояснение значения данного события: раненый партнер выражает свои чувства

3. Вовлечение ранящего партнера (он берет ответственность и выражает сожаление)

4. Травмированный откликается на ранящего: обращается к нему за поддержкой

5. Ранящий откликается на раненого

6. Получение нового опыта привязанности

7. Исцеление происходит, когда раненный видит отражение своей боли в глазах другого

