

冠状动脉搭桥术后新发房颤的长期连续监测

2025年10月19日 20:18

核心要点 (Importance)

研究的背景指出，对于冠脉搭桥手术后新发房颤的实际发生率和它对患者造成的负担，医学界尚不明确。尽管如此，北美的治疗指南建议对此类患者进行为期60天的口服抗凝治疗，但这项建议的证据等级不算高，主要基于非随机的临床研究。

研究目的 (Objective)

本研究旨在验证一个假设，即：冠脉搭桥手术後一年内新發房顫的發生率，可能比現有文獻報導的要高。同時，研究也致力於評估房顫的實際負擔（即房顫發作的頻率和持續時間）。

研究设计、地点与参与者 (Design, Setting, and Participants)

- 设计：**这是一项前瞻性的、多中心队列研究。
- 地点：**研究在德国的两个大学心脏外科中心进行。
- 参与者：**共纳入了198名患者。这些患者的共同点是：患有三支血管的冠状动脉疾病或左主干病变，并且过去没有心律失常的病史。他们在接受冠脉搭桥手术的同时，植入了一个可长期、连续监测心电图的植入式心脏监测器。
- 时间：**患者的招募时间为2019年11月至2023年11月，并对他们进行了为期一年的随访。

暴露因素 (Exposures)

研究关注的核心事件是，在手术后的一年内，通过植入式心脏监测器检测到的任何心房颤动。

主要观察指标 (Main Outcomes and Measures)

- 主要指标：**术后一年内新发房颤的累积发生率。
- 次要指标：**房颤的负荷（即房颤发作的时长占总监测时间的百分比）以及其他临床结果。

研究结果 (Results)

- 在最初评估的1217名患者中，最终有198人被纳入研究（其中男性占87.4%，平均年龄66岁）。
- 在为期一年的随访中，有95名患者出现了新发房颤，**累积发生率高达48%**。
- 然而，房颤的整体负荷非常低。第一年的中位房颤负荷仅为**0.07%**。
- 房颤负荷主要集中在术后早期：术后1到7天的中位负荷为3.65%，第8到30天降至0.04%，而第31天到365天则为0%。
- 在患者出院后，只有3名患者的房颤发作时间超过了24小时。

结论与意义 (Conclusions and Relevance)

这项研究的结论是双重的：

- 通过长期连续监测发现，冠脉搭桥手术后新发房颤的**发生率（48%）远高于**之前的报告。
- 尽管发生率高，但这些房颤的**整体负荷却非常低**，尤其是在手术30天以后。

这一“高发生率、低负荷”的发现，对现有的临床指南提出了挑战。研究者认为，极低的房颤负荷让人质疑，对于所有冠脉搭桥术后出现新发房颤的患者都考虑进行长期口服抗凝治疗的现有建议是否合理。

★ INTRO

第一部分：阐述问题及其严重性

- 普遍性：**文章开篇就明确指出，在冠状动脉旁路移植术（CABG，即心脏搭桥手术）后，新发的心房颤动（AF）是最常见的早期并发症，其报告的发生率约为30%。这句话点明了研究的核心问题——术后新发房颤，并强调了它的普遍性。
- 危害性：**接着，引言列举了新发房颤带来的多种负面影响：
 - 短期影响：**延长术后住院时间、增加医疗成本、给患者带来不适。
 - 长期风险：**观察性数据显示，它还与远期的血栓栓塞性中风、心力衰竭和房颤复发等严重风险相关。通过这些描述，作者强调了研究这一问题的临床重要性。

第二部分：回顾现有临床指南

- 北美指南：**引言提到了当前的北美指南建议，对于术后新发房颤的患者，“在术后给予60天的抗凝治疗是合理的，并需重新评估是否需要更长期的抗凝”。
- 欧洲指南：**欧洲指南则建议，“对于心脏手术后新发房颤的患者，应考虑进行长期抗凝治疗”。
- 证据等级：**作者特别指出，这两项指南建议的证据等级都只是中等强度（2a级），且都源于非随机研究。这暗示了当前临床实践的证据基础并不十分牢固，存在不确定性。

第三部分：指出过往研究的局限性

- 监测方式的不足：**引言指出了以往研究在方法学上的核心缺陷，即监测时间过短、不连续。这些研究主要依赖于“住院期间的时间有限的遥测”和“出院后间歇性的短期监测”。
- 导致的知识空白：**正是由于这种监测方式的局限，导致了两个关键问题无法解决：
 - 无法准确估计搭桥手术后新发房颤的真实发生率。
 - 房颤的实际“负荷”（即发作的频率和持续时间）以及复发情况仍然是未知的。
- 呼吁新的研究：**因此，学术界一直在呼吁使用“长期连续监测”的方式来填补这一知识空白。

第四部分：定位本研究的独特性与目的

- 以往长期监测研究的不足：**作者承认，之前有过一些尝试使用长期监测的研究，但它们也存在各种局限，例如：样本量小、研究对象混杂（包含了不同类型的心脏手术患者）、监测设备是在房颤被发现后才植入的，或者纳入了本身就有房颤病史的患者。
- 本研究的创新点：**作者强调，到目前为止，只有一个小型研究是在搭桥手术的同时植入心脏监测器（ICMs）来研究新发房颤的。这就凸显了本研究的价值——它是在一个更精确、更具代表性的人群中，从手术一开始就进行长期、连续监测的大型研究。
- 明确研究假设：**最后，引言清晰地陈述了本研究的目的：“进行一项前瞻性的观察性研究，通过连续监测来验证一个假设，即：**在搭桥手术后的第一年内，新发房颤的发生率显著高于现有文献所提示的水平，并评估其房颤负荷。**”

★ METHODS

研究设计 (Study Design)

- **研究类型:**这是一项由研究者发起 (investigator-initiated)、前瞻性 (prospective) 的观察性研究 (observational study)。
 - “研究者发起”意味着研究的构想和执行主要来自学术研究人员,而非由商业公司主导,并且文章明确指出**没有行业资助**,这增加了研究的中立性。
 - “前瞻性”意味着研究人员先确定了研究计划和人群,然后随着时间的推移向前收集数据,而不是回顾性地分析过去的病历。
 - “观察性”意味着研究者只观察和记录事件,而不对患者进行干预或分配特定的治疗方法。
- **核心技术:**在患者进行心脏搭桥手术 (CABG) 的同时,为他们植入了**植入式心脏监测器 (ICMs)**。
 - **设备型号:**明确提到了所用的设备是美敦力公司 (Medtronic) 的 Reveal LINQ LNQ11。
 - **植入细节:**这是一种尺寸为 4.5 x 0.7 x 0.4 厘米的胶囊状设备,通过一个小于1厘米的切口植入左胸的皮下组织中。
- **数据传输:**设备会自动检测和存储心律不齐的详细信息。患者可以使用一个床边的设备 (MyCareLink 家庭监护仪) 定期将数据传输到一个数据库中。
- **研究地点:**研究在德国的两个心脏外科中心进行:慕尼黑大学医院 (LMU University Hospital, Munich) 和耶拿大学医院 (Jena University Hospital, Jena)。
- **伦理与规范:**研究方案获得了两个中心机构审查委员会 (伦理委员会) 的批准,并遵循了 STROBE (加强观察性研究报告) 的报告指南。

研究人群 (Study Population)

这部分定义了哪些患者可以被纳入研究，哪些需要被排除。

- **入选标准 (Inclusion Criteria):**
 1. 成年人 (>18岁)。
 2. 首次接受**“单纯的”心脏搭桥手术** (isolated CABG)，即不同时进行瓣膜置换等其他手术。
 3. 病情较严重，需要进行三支血管或左主干的搭桥，且至少需要移植2根血管。
 4. **无心房颤动 (AF) 或其他心律失常的既往病史。**这是研究“新发”房颤的关键前提。
 5. 术前心脏功能尚可，左心室射血分数 (LVEF) $\geq 35\%$ 。
- **排除标准 (Exclusion Criteria):**
 1. 需要同时进行其他心脏手术的患者。
 2. 在脱离心肺体外循环时需要机械循环辅助的患者。
- **知情同意:** 所有参与者都签署了书面知情同意书。

研究流程 (Study Procedure)

- **监测开始时间:** 在手术室里, 当外科医生缝合完皮肤后, 立即启动植入式心脏监测器 (ICM), 开始连续监测。
- **事件处理:** 一旦监测器检测到心律失常, 患者和主治医生都会被告知。
- **临床决策:** 后续的治疗决策 (例如是否开始口服抗凝药) 完全由**主治医生**根据临床常规来决定, 研究人员不加干预。
- **数据收集:** 临床随访数据通过邮寄的随访问卷和电话访谈来收集。

结局指标 (Outcome Measures)

这部分定义了研究者主要关心和测量的结果是什么。

- **主要结局 (Primary Outcome)**: 研究最核心的观察指标是: 在搭桥手术后的**第一年**内, 通过连续监测发现的**新发房颤**的发生率。
- **次要结局 (Secondary Outcomes)**:
 - **房颤负荷 (AF burden)**: 指在特定监测时间内, 房颤发作的总时长所占的百分比。
 - **标准监测未能检出的事件发生率**。
 - 无症状性房颤的发生率。
 - 主要不良心脏和脑血管事件 (MACCE) 及其组成部分。
- **房颤的定义**:
 - 研究中, 一个事件被定义为房颤, 需要满足两个条件: 1) 被植入式心脏监测器的算法检测为房颤、房速等, 且**持续时间超过2分钟**; 2) 由一个**裁决团队** (由一名心脏电生理学家和一名心脏外科医生组成) 进行人工审核确认。
- **与标准监测的对比**:
 - 裁决团队在确认每一次房颤事件后, 还会通过访谈患者/医生和查阅病历来评估这次事件**是否能被“标准监测”所发现**。
 - 所谓的**“标准监测”**被定义为医院的常规操作, 即术后2到5天的遥测监护和出院前的一次12导联心电图。医生也可以根据情况决定进行更长时间的遥测或Holter监测。

★ Statistical Analysis

核心假设与样本量计算

- **研究假设 (Primary Hypothesis):** 研究人员的出发点是, 他们认为通过长期连续监测发现的心脏搭桥手术 (CABG) 后一年内新发房颤 (AF) 的真实发生率, **显著高于**当前文献报道的水平 (约30%)。这是他们想要验证的核心观点。
- **样本量计算 (Sample Size Calculation):**
 - 为了验证这个假设, 他们需要计算出需要招募多少名患者才足够。
 - 他们的目标是: 计算出一年发生率的**95%置信区间 (CI)**, 并且这个区间的宽度不超过**±7%**。这意味着如果他们算出的发生率是50%, 他们有95%的把握确定真实值在43%到57%之间。这是一个对精确度的预设要求。
 - 在初步计算时, 他们假设研究期间的死亡人数会很少, 可以忽略不计。
 - 根据计算, 所需的样本量是**196人**。
 - 考虑到在实际研究中可能会有患者退出或失访, 他们将样本量增加到了**198人**, 以确保研究结束时仍有足够的数据。

分析人群与主要结局分析

- **分析人群 (Analysis Population):** 所有的分析都是基于**“意向监测 (Intention-to-Monitor, ITM)”**人群进行的。这意味着, 只要患者植入了监测器, 无论他/她后来是否完整地完成了所有随访, 都会被纳入最终的统计分析中。这是一种保守且能避免偏倚的分析策略。
- **主要结局的分析方法:**
 - 为了分析主要结局 (新发房颤的发生率), 研究人员使用了**“累积发生函数 (cumulative incidence function)”**。
 - 这种方法的一个关键优点是, 它考虑了**“死亡”

稳健性与敏感性分析 (Robustness and Sensitivity Analyses)

为了确保研究结果的可靠性，研究者进行了一系列的“压力测试”。

- **敏感性分析：**
 - 在主要分析中，房颤被定义为持续**2分钟以上**。但这个定义是人为设定的。为了检验结果是否依赖于这个定义，研究者又重新进行了分析，分别使用了**4分钟、6分钟和12分钟**作为房颤的定义阈值。如果结果在不同定义下依然相似，说明结论很稳健。
- **最差情况分析（Worst-case analyses）：**
 - 研究中有一个病例数据缺失。为了处理这个缺失值，研究者做了两次极端假设：第一次假设这个缺失的患者**发生了房颤**；第二次假设他**没有发生房颤**。通过检验在这两种最差情况下结论是否依然成立，来测试结果的稳健性。
- **与标准监测的比较：**
 - 研究者使用**Gray’s test**来比较“连续监测”发现的房颤发生率和“标准监测”发现的发生率。Gray’s test是专门用于在存在竞争风险的情况下，比较两组累积发生率差异的统计方法。

次要结局的计算方法

- **房颤负荷（AF burden）：**
 - 房颤负荷的计算遵循了2025年欧洲心脏病学会（ESC）的共识。
 - 计算公式为：**（经载定的房颤发作总时长） ÷ （总监测时长）**，结果以百分比表示。
- **图表中的每日房颤负荷：**
 - 为了绘制图表，每日的平均房颤负荷是通过将当天队列中累积的房颤总时间，除以截至该时间点已发生房颤的患者总数来计算的。

描述性与比较性统计

- **数据呈现：**
 - 分类变量（如性别）以****计数和百分比（%）****表示。
 - 连续变量（如年龄）根据其数据分布情况，以****均值±标准差（SD）或中位数和四分位距（IQR）****表示。
- **组间比较：**
 - 为了比较发生房颤和未发生房颤两组患者的差异：
 - 分类变量使用**卡方检验（ χ^2 test）或费希尔精确检验（Fisher exact test）**。
 - 连续变量使用**t检验（t test）或威尔科克森秩和检验（Wilcoxon rank-sum test）**。
- **显著性水平：**
 - 所有检验都是双侧检验，**P值小于0.05**被认为具有统计学显著性。

★ Results

★ Participant Characteristics

1. 患者筛选与入组流程（参考图1：流程图）

这部分详细展示了研究是如何从一个庞大的潜在人群中，通过严格的筛选，最终确定研究对象的。

- **初步评估：**研究团队最初评估了 **1217** 名可能符合条件的患者。这是一个很大的初步池。
- **大量排除：**其中，有 **1008** 名患者被排除了。流程图清晰地列出了主要原因：
 - **不符合入选标准（488人）：**这是最大的排除类别。具体原因包括：
 - 需要同时进行其他心脏手术（135人）
 - 本身已有房颤病史（124人） - **这一点至关重要**，因为它确保了研究对象都是真正意义上的“新发”房颤。
 - 心脏功能太差（左室射血分数 LVEF < 35%）（67人）
 - 病变不符合要求（不是三支血管或左主干病变）（41人）
 - **患者拒绝参与（518人）：**这是第二大原因，说明了在临床研究中，患者的意愿是一个重要因素。
- **同意入组：**经过初步筛选，有 **209** 名患者同意参加研究。
- **同意后再次排除：**即使在同意后，仍有 **11** 名患者被排除。脚注a详细解释了原因，例如：后来发现有心律失常病史、术中发现手术范围扩大、或患者最终撤回同意等。这体现了研究过程的严谨性。
- **最终入组：**最终，有 **198** 名患者成功植入了植入式心脏监测器（ICM），构成了本研究的核心队列。

2. 最终入选人群的特征（198名患者）

这部分描述了这198名患者“画像”。

- **人口学特征：**
 - **性别：**男性占绝对主导，为 **173人（87.4%）**，女性为 **25人（12.6%）**。这在冠心病研究中是比较常见的现象。
 - **年龄：**平均年龄为 **66岁**（标准差为9岁），代表了接受心脏搭桥手术的典型中老年人群。
 - **种族与族裔：**研究**未收集**这方面的数据，这是一个局限性。
- **监测完成情况：**
 - 在198人中，有 **197人（99.5%）** 成功启动了远程数据监测。另1人在启动前不幸去世。
 - 最终，有 **192人（97.0%）** 完成了整整一年的连续监测。这是一个**非常高**的完成率，有力地保证了研究数据的完整性和可靠性。
 - 未能完成监测的原因包括：4例死亡、1例撤回同意、1例失访。
 - 整个队列的总监测时间为 **193个病人-年**，平均每人的监测时间为 **0.975年**，说明绝大多数患者都接近完成了全年的监测。
- **临床基线特征：**
 - **卒中风险评分（CHA₂DS₂-VASc）：**
 - 这个评分是用来评估房颤患者发生中风风险的工具。分值越高，风险越大。
 - 该研究人群的中位评分为 **3分**。这表明，从整体来看，这个人群属于**中度至高度的中风风险群体**。这个信息非常重要，因为它意味着一旦这些患者发生房颤，是否需要抗凝治疗将是一个非常现实且关键的临床问题。
 - **用药情况：**
 - **58%** 的患者服用了 **β -受体阻滞剂**，这是冠心病和术后的常用药物。
 - **没有任何患者**在术前使用过**胺碘酮**。胺碘酮是一种强效的抗心律失常药物，排除这部分患者可以避免药物对新发房颤的干扰。
 - **住院时间：**术后住院时间的中位数为 **10天**，这反映了这类手术常规的恢复周期。

总结一下， 这部分结果清晰地告诉我们：研究人员通过非常严格的筛选，成功招募并完整地随访了一个具有代表性的、无房颤病史、且卒中风险较高的心脏搭桥手术患者队列。数据的完整性和队列特征的明确性，为后续分析新发房颤的发生率和负担提供了坚实的基础。

第一部分：表格的整体结构与目的

- **目的：**这张表格的唯一目的就是**比较两组患者的临床结局**。
 - **第一组：“New-onset AF”** 组，即在术后一年内出现了新发房颤的95名患者。
 - **第二组：“No new-onset AF”** 组，即在术后一年内没有出现房颤的103名患者。
- **比较内容：**表格左侧列出了一系列重要的临床不良事件，如死亡、中风、心肌梗死等。
- **核心逻辑：**通过比较这些不良事件在两组中的发生率，来判断新发房颤是否是一个危险信号。

第二部分：回答你的具体问题

1. 这是用了什么方法？（What method was used?）

要回答这个问题，我们需要看表格下方的脚注，特别是脚注 d。

- **核心方法：**脚注d明确指出，P值是通过**费希尔精确检验（Fisher exact test）**计算的。
- **为什么用这个方法？：**费希尔精确检验是一种用于比较两组分类数据（比如“发生中风” vs “未发生中风”）的统计学方法。它尤其适用于当样本量不大，或某些事件的发生次数非常少（例如0次或1次）的情况。从表格中可以看到，很多事件的发生次数都很少（比如中风是0例 vs 2例），因此使用这种检验方法非常合适和准确。

2. 图中的“Estimated risk difference”是什么意思？

这是理解这张表格的关键，我们分三步来解释：

- **第一步：什么是“风险（Risk）”？**
 - 在这里，“风险”就是指在一个组内，某个不良事件发生的百分比。
 - **举例：**在“New-onset AF”组中，发生死亡（Death）的风险是 **3.2%**（因为95人中有3人死亡）。
- **第二步：什么是“风险差（Risk Difference）”？**
 - “风险差”非常直观，就是**将第一组的风险减去第二组的风险**。
 - **计算公式：** $\text{Risk Difference} = (\text{Risk in AF group}) - (\text{Risk in No AF group})$ 。
 - **举例：**我们来看死亡（Death）这一行：
 - 第一组风险 = 3.2%
 - 第二组风险 = 1.0%
 - 风险差 = $3.2\% - 1.0\% = 2.2\%$ ，在表格中表示为 **0.023**。
 - **如何解读风险差的数值：**
 - **正数：**意味着该事件在“房颤组”中更常见。
 - **负数：**意味着该事件在“无房颤组”中更常见。
 - **接近0：**意味着两组之间几乎没有差别。
- **第三步：为什么要看“95% 置信区间（95% CI）”？**
 - 我们算出的风险差（如0.023）只是这次研究得到的一个“点估计值”。我们真正想知道的是，在所有符合条件的患者（总体）中，真实的风险差是多少。
 - 95% CI就提供了一个**真实风险差可能所在的范围**。
 - **举例：**对于死亡，95% CI是 **-0.023 到 0.075**。
 - **最关键的解读：**如果这个区间包含了0，就意味着“两组之间没有差异”（即风险差为0）是一个完全可能的结果。这也意味着我们**没有足够的证据**认为两组之间存在真实的差异。当95% CI包含0时，对应的P值通常会大于0.05（即不具有统计学显著性）。

第三部分：逐行解读表格的临床意义（The Story of the Table）

现在我们用上面的知识来解读表格里的事：


- **MACE（主要不良心脑血管事件）：**这是最重要的综合指标。房颤组的发生率是7.4%，无房颤组是6.8%。风险差几乎为0（0.006），95% CI（-0.07到0.084）包含0，P值 $> .99$ 。
 - **结论：**发生房颤与否，对患者总体的严重不良事件风险没有影响。
- **Stroke（中风）：**这是大家最关心的、与房颤直接相关的事件。
 - **惊人的结果：**房颤组有0例中风，而无房颤组反而有2例（1.9%）。
 - **数据解读：**风险差是负数（-0.021），但95% CI（-0.062到0.016）仍然包含了0，P值为0.50。
 - **结论：**在本研究中，术后新发的这种短暂房颤，完全没有增加第一年内的中风险。这是本文最强有力的发现之一。
- **Death（死亡）和 Myocardial Infarction（心肌梗死）：**逻辑同上。两组的发生率非常接近，风险差的95% CI都包含了0，P值也远大于0.05。
 - **结论：**房颤的发生与死亡或心梗风险也无关。
- **Heart Failure Hospitalization（因心力衰竭住院）：**这是唯一一个值得注意的信号。
 - **数据：**房颤组有4人（4.2%）因此住院，而无房颤组为0人。P值为0.05。
 - **解读：**P值刚好踩在统计学显著性的“分界线”上。这**可能提示**新发房颤与后续的心衰住院存在某种关联。但考虑到所有其他更“硬”的终点（死亡、中风）都没有差异，这个单一的信号需要谨慎解读，有可能是偶然发现。
- **Readmission（再入院）：**房颤组的再入院率甚至还略低于无房颤组（17.9% vs 21.4%），当然这个差异也没有统计学意义。

总结

这张表格通过严谨的统计比较，得出了一个非常清晰且具有颠覆性的结论：

尽管通过长期监测发现搭桥术后新发房颤的**发生率很高**，但这种主要发生在术后早期的、短暂的、低负荷的房颤，在术后第一年内，**并没有给患者带来更高的死亡、中风或心肌梗死风险**。这个发现有力地挑战了“只要是术后房颤就应考虑抗凝”的传统观点。


Figure 2. Cumulative Incidence of New-Onset Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting



The graphs represent cumulative incidence functions considering death as a competing risk, investigating the intention-to-monitor population. A and B present the same data; in panel B, the graph was split with a landmark at 30

days (dotted line) to illustrate the low incidence in the time frame later than 30 days after surgery.

Figure 3. Atrial Fibrillation Burden in Patients With New-Onset Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting



A, The mean daily atrial fibrillation (AF) burden was calculated by dividing the cohort's cumulative time in AF on a given day by the cumulative number of patients who had developed AF up to this time point. The inset shows the same data on enlarged y-axis and x-axis. Note that the maximum possible AF burden

on a given day is 24 hours. Panel B depicts the number of patients with AF on a given day (irrespective of AF burden on the specific day). The median length of hospital stay for the patients was 10 (IQR, 8-13) days.