

|                     |                                                                                                   |                            |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                            | MA.UFCLI.001 – Página 1/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS NO HU-UFMG | Emissão: 11/12/2025        | Próxima revisão: 11/12/2027 |
|                     |                                                                                                   | Versão: 03                 |                             |

## 1. APRESENTAÇÃO

O guia de preparo, diluição e administração de medicamentos injetáveis padronizados para linha adulto, no HU-UFMG/Ebserh foi elaborado a partir da necessidade de as equipes multiprofissionais obterem informações seguras e precisas de como preparar os medicamentos injetáveis padronizados na instituição, além de garantir a segurança na prescrição medicamentosa, no uso e na administração dos medicamentos.

Quais informações poderão ser encontradas nesse guia?

- **Código AGHU:** código de cadastro do medicamento padronizado no AGHUX do HU-UFMG/Ebserh;
- **Apresentação padronizada:** nome do medicamento, apresentação farmacêutica e nome do laboratório do medicamento padronizado e disponível;
- **Via de administração:** vias de administração registradas pela Anvisa. Em caso de vias off-label, essa informação pode ser encontrada com informações adicionais;
- **Dose usual:** dose usualmente recomendada, com o intervalo terapêutico para adultos. Para alguns medicamentos, há a dose máxima usual recomendada;
- **Reconstituição:** informações necessárias para a reconstituição dos medicamentos que necessitam dessa etapa durante o preparo. Como volume, tipo de reconstituente, se o fármaco possui expansão e qual o volume ou a concentração encontrada após a reconstituição. Nessa coluna também foi inserida a informação da estabilidade físico-química após a reconstituição;
- **Diluição:** informações necessárias para a diluição dos medicamentos. Como o tipo da solução recomendada, o volume ou a concentração encontrada ideal de administração. Também foi descrita a estabilidade físico-química após a diluição e o tempo recomendado para administração ou infusão dos medicamentos.
- **Ajuste renal:** se o medicamento deve ser ajustado em caso de pacientes com disfunção renal ou em hemodiálise.
- **Informações importantes:** informações pertinentes ao preparo, diluição, administração e monitorização após a administração para garantir o uso adequado e seguro dos medicamentos.

O guia foi embasado em uma ampla pesquisa à literatura e bulas dos medicamentos disponíveis na instituição e, por estar em constante processo de construção, está sujeito a contribuições e ajustes. Caso o medicamento não conste nesse guia ou a marca em questão seja diferente da relacionada, entrar em contato com a Unidade de Farmácia Clínica (UFCL) ou a Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS) para mais orientações.

|                     |                                                                                                          |                            |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                   | MA.UFCLI.001 – Página 2/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS NO HU-UFMG</b> | Emissão: 11/12/2025        | Próxima revisão: 11/12/2027 |
|                     |                                                                                                          | Versão: 03                 |                             |

## 2. OBJETIVOS

- Padronizar os procedimentos de preparo, diluição e administração de medicamentos injetáveis na linha adulto a fim de reduzir a ocorrência de eventos adversos que possam comprometer a saúde e a vida dos pacientes atendidos;
- Padronizar as reconstituições e diluições dos medicamentos utilizados no HU-UFMG/Ebserh;
- Orientar de forma rápida e prática a prescrição segura de medicamentos injetáveis;

## 3. SIGLAS

- |                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| • Amp – ampola                                               | • min - minutos                      |
| • dL – decilitro                                             | • mL – mililitros                    |
| • AD - Água destilada para injetáveis (Água para injetáveis) | • mm - milímetros                    |
| • AVC - acesso venoso central                                | • NA - informação não se aplica      |
| • AVP - acesso venoso periférico                             | • PD - Epidural                      |
| • ClCr – Clearance de Creatinina                             | • SC - via subcutânea                |
| • EV - via endovenosa                                        | • SF 0,9% - Solução fisiológica 0,9% |
| • g - gramas                                                 | • SG 5% - Solução Glicosada 5%       |
| • h - horas                                                  | • TA - Temperatura ambiente          |
| • IM - via intramuscular                                     | • TR - Temperatura refrigerada       |
| • INAL - via inalatória                                      | • Vol - Volume                       |
| • INO – Inalatória oral                                      |                                      |
| • IT – via intratecal                                        |                                      |
| • ITRA – via intratraqueal                                   |                                      |
| • Kg - Quilogramas                                           |                                      |
| • mcg - microgramas                                          |                                      |
| • mg - miligramas                                            |                                      |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                            |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 3/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                 |                             |

#### 4. DESCRIÇÃO

| MEDICAMENTO |                                                       | Via de Adm    | Dose Usual            | RECONSTITUIÇÃO    |                          | DILUIÇÃO                               |                                      |                          |                        | Ajuste Renal                                                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                              |               |                       | Tipo e Volume     | Estabilidade             | Tipo da solução                        | Volume e/ou Concentração             | Estabilidade             | Tempo de Administração |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18457       | Acetilcisteína 100mg/mL (ampola 3mL)<br>UNIÃO QUÍMICA | EV<br>IN      | 300mg a cada 12h      | NA                | NA                       | EV: SF 0,9%<br>ou SG 5%<br>IN: SF 0,9% | EV<br>A partir de 50mL<br>INAL - 3mL | 24h TA (EV)              | Infusão lenta          | NÃO                                                                                                                         | Na intoxicação acidental ou voluntária por Paracetamol, o tratamento deve começar assim que a necessidade se tornar evidente, de preferência iniciando no máximo 8 a 10 horas após a ingestão do Paracetamol.                            |
| 6934        | Aciclovir 250 mg (frasco-ampola)<br>UNIÃO QUÍMICA     | EV<br>(lento) | 5 a 10mg/kg a cada 8h | 10mL AD<br>SF0,9% | 12h TA<br>Não refrigerar | SF 0,9%<br>SG 5%                       | ≤ 7 mg/mL                            | 12h TA<br>Não refrigerar | Infusão lenta ≥ 1h     | 25-50 mL/min - a cada 12h<br>10-25 mL/min - a cada 24h<br>0-10 mL/min - dividida e administrada a cada 24h e após a diálise | Evitar infusão rápida; administrar por mais de 1 hora para evitar danos renais; manter hidratação adequada do paciente; verificar flebite e alternar os locais de infusão<br>Administração acima de 10mg/mL, risco aumentado de flebite. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                            |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 4/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFOD |  | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                 |                             |

| MEDICAMENTO |                                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                                                | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                    |                                       |                                                       | Ajuste Renal                                                                                                                                                              | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                     |            |                                                                                           | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração           | Estabilidade                          | Tempo de Administração                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18368       | Ácido Ascórbico 100mg/mL (ampola 5mL) (Vitamina C) HYPOFARMA | EV<br>IM   | 50mg a 1.000mg a cada 24h, 14h ou 8h                                                      | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 1.000mg em 1.000mL                 | 24h TA com pequena perda de atividade | 60 min ou 2mL/min<br><b>Usar equipo fotossensível</b> | NÃO                                                                                                                                                                       | *Vitamina C<br>Deve-se evitar a administração rápida, pois pode provocar tontura e desmaio.                                                                                                                                                                                 |
| 145050      | Ácido Tranexâmico 50mg/mL (ampola 5mL) HIPOLABOR             | EV         | 500 a 1.000mg a cada 8h ou 10 a 15mg/kg/dia a cada 24h ou 8h<br><br>DOSE MÁX: 3.000mg/dia | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Concentração Máx 50mg/mL           | Uso imediato                          | 30 min                                                | Creatinina sérica 1,40-2,80mg/dL: 10mg/kg a cada 12h<br>Creatinina sérica 2,80-5,70mg/dL: 10mg/kg a cada 24h<br>Creatinina sérica maior que 5,70mg/dL: 5mg/kg a cada 24 h | Deve ser aplicado isoladamente. Não deve ser misturado com nenhum outro medicamento, nem aplicado no mesmo equipo. Se houver administração de dosagem excessiva, é recomendado o aumento da reposição hídrica, com infusão de soluções isotônicas, para aumento da diurese. |
| 209244      | Adenosina 3mg/mL (ampola 2mL) HIPOLABOR                      | EV         | 6mg/bolus podendo repetir mais 12mg/bolus                                                 | NA             | NA           | NA               | Pode ser administrada sem diluição | NA                                    | EV direto: em bolus de 1 a 2 segundos                 | NÃO                                                                                                                                                                       | Possui ação rápida e meia vida extremamente curta.                                                                                                                                                                                                                          |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                            |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 5/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                 |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                         | Via de Adm | Dose Usual                                              | RECONSTITUIÇÃO    |              | DILUIÇÃO        |                                        |                                                                  |                                            | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                |            |                                                         | Tipo e Volume     | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração               | Estabilidade                                                     | Tempo de Administração                     |              |                                                                                                     |
| 13676       | Albumina Humana 200mg/mL (frasco-ampola 50mL)<br>OCTAPHARMA CSL BEHRING | EV         | Dose varia de acordo com o diagnóstico (25g a 100g/dia) | NA                | NA           | SF 0,9% SG 5%   | Pode ser administrada pura ou diluída. | Estudos demonstram estabilidade até 4h após a abertura do frasco | 1 a 3mL/min<br>Administrar no máximo em 4h | NÃO          | Não deve ser administrado junto com outros medicamentos.                                            |
| 407404      |                                                                         |            |                                                         |                   |              |                 |                                        |                                                                  |                                            |              |                                                                                                     |
| 226486      | Alfaepoetina (frasco-ampola 1mL)<br>10.000UI/mL<br>ACHÉ                 | EV<br>SC   | Dose varia de acordo com diagnóstico                    | Diluyente Próprio | Uso Imediato | NA              | NA                                     | NA                                                               | EV direto:<br>1 a 5 min                    | SIM          | Não Agitar.<br>Em pacientes em hemodiálise, a injeção deve ser aplicada após a sessão de diálise.   |
| 403336      | Alprostadil 250mcg/mL (ampola 1mL)<br>MANI                              | EV         | Utilizado na linha neonatal                             | NA                | NA           | SF 0,9% SG 5%   | 100 mL                                 | 12h TA e TR                                                      | 0,03 mL/kg/h                               | NÃO          | Administrar em veia de grande calibre lentamente, a infusão rápida pode levar a hipotensão e febre. |
| 407170      | Alprostadil 500mcg/mL (ampola 1mL)<br>FLUKKA (manipulado)               | EV         | Utilizado na linha neonatal                             | NA                | NA           | SF 0,9% SG 5%   | 100 mL                                 | 12h TA e TR                                                      | 0,03 mL/kg/h                               | NÃO          | Administrar em veia de grande calibre lentamente, a infusão rápida pode levar a hipotensão e febre. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                            |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 6/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                 |                             |

| MEDICAMENTO |                                           | Via de Adm       | Dose Usual                                                                                                                       | RECONSTITUIÇÃO            |                 | DILUIÇÃO                             |                                                                                     |                           |                                                                      | Ajuste Renal                                                                                                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                  |                  |                                                                                                                                  | Tipo e Volume             | Estabilidade    | Tipo da solução                      | Volume e/ou Concentração                                                            | Estabilidade              | Tempo de Administração                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| 181439      | Alteplase 50mg (frasco-ampola) BOEHRINGER | EV               | 15mg (bolus) seguido de 0,50 a 0,75 mg/kg de 30 a 60 min. Dose máx: 100mg/dia                                                    | 50 mL do diluente próprio | 24h TR<br>8h TA | SF 0,9%                              | 0,2 mg/mL<br>A ocorrência de turbidez da solução reconstituída não pode ser evitada | 24h TR<br>8h TA           | Bolus: 1 a 2 min<br>Infusão: 75mg/kg em 30 min ou 0,5mg/kg em 60 min | NÃO                                                                                                                                                                         | A duração do efeito hiperfibrinolítico termina após poucas horas da suspensão da administração do medicamento. O tempo de trombina volta ao normal em até 4 horas                                    |
| 15954       | Amicacina 50mg/mL (ampola-2mL) TEUTO      | EV (lento)<br>IM | 15 a 20 mg/kg/dia dose única diária (para pacientes com função renal normal) ou 5-7,5mg/kg/dose a cada 8h. Dose máx: 1.500mg/dia | NA                        | NA              | SF 0,9%<br>SG 5%<br>IM: sem diluição | ≤ 5mg/mL                                                                            | 24h TA (protegido da luz) | Infusão: 30 a 60 min<br>EV direto: 3 a 5 min (não recomendado)       | CICr 10-50mL/min: 24 - 72h<br>CICr menor que 10mL/min: 48 - 72h.<br>Diálise intermitente: 5-7,5mg/kg a cada 48-72h.<br>Contínua: 10mg/kg, seguido de 7,5mg/kg a cada 24-48h | <b>Medicamento dose-dependente, recomendado administrar 1xdia.</b><br>Administração de outros antibióticos deverá ser feita com 1h de intervalo. Pode apresentar ototoxicidade e/ou nefrotoxicidade. |
| 13692       | Amicacina 250mg/mL (ampola 2mL) TEUTO     | EV (lento)<br>IM | 15 a 20 mg/kg/dia dose única diária (para                                                                                        | NA                        | NA              | SF 0,9%<br>SG 5%<br>IM: sem diluição | ≤ 5mg/mL                                                                            | 24h TA (protegido da luz) | Infusão: 30 a 60 min                                                 | CICr 10-50mL/min: 24 - 72h<br>CICr menor que 10mL/min: 48 - 72h.                                                                                                            | <b>Medicamento dose-dependente, recomendado administrar 1xdia.</b>                                                                                                                                   |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                          |  |                            |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Tipo do Documento   | <b>MANUAL</b>                                                                                            |  | MA.UFCLI.001 – Página 7/90 |                          |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão: 12/2025 |
|                     |                                                                                                          |  | Versão: 03                 |                          |

| MEDICAMENTO |                                           | Via de Adm | Dose Usual                                                                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                  |              |                                                                    | Ajuste Renal                                                                                            | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                  |            |                                                                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração         | Estabilidade | Tempo de Administração                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                |
|             |                                           |            | pacientes com função renal normal) ou 5-7,5mg/kg/do se a cada 8h.<br><br>Dose máx: 1.500mg/dia         |                |              |                 |                                  |              | EV direto: 3 a 5 min (não recomendado)                             | Diálise intermitente: 5-7,5mg/kg a cada 48-72h.<br>Contínua: 10mg/kg, seguido de 7,5mg/kg a cada 24-48h | Administração de outros antibióticos deverá ser feita com 1h de intervalo. Pode apresentar ototoxicidade e/ou nefrotoxicidade. |
| 13765       | AmioDARONA 50mg/mL (ampola 3mL) HIPOLABOR | EV         | Dose de ataque: 5mg/kg, 2 a 3 vezes ao dia.<br>Dose de Manutenção: 10 a 20/kg/dia<br>800 a 1.200mg/24h | NA             | NA           | SG 5%           | 150mg em 100mL<br>900mg em 250mL | 24h TA       | EV direto: > 3 min<br>Infusão: 20 min a 2h<br><br>Infusão contínua | NÃO                                                                                                     | Este medicamento é contraindicado em casos de gravidez em virtude de seus efeitos na glândula tireoide do feto.                |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                            |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 8/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                 |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                        | Via de Adm | Dose Usual                                                  | RECONSTITUIÇÃO                                                          |                            | DILUIÇÃO        |                                                                   |                                                                       |                                                                                          | Ajuste Renal                                                                                                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                               |            |                                                             | Tipo e Volume                                                           | Estabilidade               | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração                                          | Estabilidade                                                          | Tempo de Administração                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 402002      | AMOXicilina 500mg + CLAVULANATO 100mg (frasco-ampola) BLAU             | EV         | 1.200mg a cada 6 a 8h                                       | AD: 10mL<br>Vol final 10,5mL                                            | Uso imediato               | SF 0,9%         | 50mL<br>10mg/mL (Amoxicilina)                                     | Uso imediato                                                          | Infusão:<br>30 a 40 min<br><br>EV direto:<br>3 a 4 min (não recomendado)                 | ClCr maior que 30mL/min: Sem ajuste<br>10 -30mL/min: 600mg de 12/12 h<br>menor que 10mL/min: NÃO recomendado  | Tende a precipitar na presença de soluções que contenham glicose ou bicarbonato. Incompatibilidade em Y: Aminoglicosídeos.                                              |
| 235326      | AMPicilina 1.000mg + SULBACTAM 500mg (frasco-ampola) FRESENIUS         | EV<br>IM   | 1.500mg a 3.000mg/dia a cada 6-8h<br><br>*9.000mg a cada 8h | EV: 3mL de AD para 1,5g Vol final 4mL<br><br>IM<br>3,2mL Lidocaína 0,5% | IM: 1h<br>EV: Uso imediato | SF 0,9%<br>SG5% | EV: 45mg/mL (30mg/mL Ampicilina)<br><br>IM: 250mg/mL (Ampicilina) | 8h TA (SF 0,9%)<br>48h TR (SF 0,9%)<br>2h TA (SG 5%)<br>4h TR (SG 5%) | Infusão:<br>15 a 30min<br><br>*Infusão prolongada 4 horas<br><br>EV direto:<br>3 a 5min  | ClCr:15 - 29 mL/min: de 12/12h<br>menor que 15mL/min: a cada 24h<br>Hemodiálise: após diálise: a cada 12-24 h | *Cuidados Específicos e Monitoramento Ativo contra <i>Acinetobacter spp.</i> multirresistente. Seu uso indiscriminado poderá levar à resistência a este antimicrobiano. |
| 235334      | AMPicilina 2.000mg + SULBACTAM 1.000mg (frasco-ampola) FRESENIUS EUGIA |            | 1.500mg a 3.000mg/dia a cada 6-8h<br><br>*9.000mg a cada 8h | EV:<br>6mL AD<br>Vol final 8mL<br><br>IM<br>3,2mL Lidocaína 0,5%        | IM: 1h<br>EV: Uso imediato | SF 0,9%<br>SG5% | EV: 45mg/mL (30mg/mL Ampicilina)<br><br>IM: 250mg/mL (Ampicilina) | 8h TA (SF 0,9%)<br>48h TR (SF 0,9%)<br>2h TA (SG 5%)<br>4h TR (SG 5%) | Infusão:<br>15 a 30min<br><br>*Infusão prolongada: 4 horas<br><br>EV direto:<br>3 a 5min | ClCr:15 - 29 mL/min: de 12/12h<br>menor que 15mL/min: a cada 24h<br>Hemodiálise: após diálise: a cada 12-24 h | *Cuidados Específicos e Monitoramento Ativo contra <i>Acinetobacter spp.</i> multirresistente. Seu uso indiscriminado poderá levar à                                    |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                            |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 9/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025           | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                 |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                      | Via de Adm | Dose Usual                                                       | RECONSTITUIÇÃO                                |                     | DILUIÇÃO         |                          |                 |                                                       | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                             | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                             |            |                                                                  | Tipo e Volume                                 | Estabilidade        | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade    | Tempo de Administração                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|             |                                                                      |            |                                                                  |                                               |                     |                  |                          |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                          | resistência a este antimicrobiano.                                                       |
| 13803       | Ampicilina 500mg (frasco-ampola) TEUTO                               | EV<br>IM   | 1.000mg a 2.000mg a cada 4 ou 6h<br><br>Dose máx: 14.000mg/dia a | AD: 2mL<br><br>Vol final 2,3mL (217,39 mg/mL) | Uso imediato        | SF 0,9%<br>SG 5% | 2 a 30mg/mL              | Imediato        | Infusão: 15 a 30min<br><br>EV direto: mínimo 3 a 5min | CICr: > 50 mL/min:<br>NÃO é necessário ajuste<br>CICr 10 - 50 mL/min:<br>a cada 6 - 12h<br>CICr < 10 mL/min:<br>a cada 12 - 24 h<br>Hemodiálise:<br>Dialisável (20% a 50%), administrar após hemodiálise | Administrar 1h antes ou 1h após a administração de aminoglicosídeos.                     |
| 271678      | Anfotericina B COMPLEXO LIPÍDICO 5mg/mL (frasco-ampola 20mL) ABELCET | EV         | 1 a 5mg/kg/dia                                                   | NA                                            | Uso imediato        | SG 5%            | 1mg/mL                   | 6h TA<br>48h TR | 4 a 6h (2,5 mg/kg/h)                                  | NÃO                                                                                                                                                                                                      | Lavar o acesso antes e após a infusão com SG 5%.<br><br><b>Incompatível com SF 0,9%.</b> |
| 13838       | Anfotericina B DESOXICOLATO 50mg/mL(frasco-                          | EV         | 0,5mg a 1 mg/kg/dia 1,5                                          | AD: 10mL                                      | 24h TA<br>7 dias TR | SG 5%            | 0,1 mg/mL                | Uso imediato    | 2 a 6h (fotossensível)                                | NÃO                                                                                                                                                                                                      | Lavar o acesso antes e após a infusão com SG 5%.                                         |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 10/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                  | Via de Adm | Dose Usual                      | RECONSTITUIÇÃO            |                  | DILUIÇÃO         |                                                           |              |                                                      | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                         |            |                                 | Tipo e Volume             | Estabilidade     | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                  | Estabilidade | Tempo de Administração                               |              |                                                                                                                |
|             | ampola)<br>CRISTÁLIA                                             |            | mg/kg/dia<br>em dias alternados |                           | Protegido da luz |                  | (0,25mg/mL para pacientes com restrição de volume)        |              |                                                      |              | <b>Incompatível com SF 0,9%.</b><br><br>O risco de nefrotoxicidade aumenta com doses maior que 1mg/kg/dia.     |
| 404680      | Anfotericina B<br>LIPOSSOMAL<br>50mg (frasco-ampola)<br>AMBISOME | EV         | 3 a<br>6mg/kg/dia               | AD: 12mL                  | 24h TR           | SG 5%            | 0,2 a 2mg/mL                                              | 6h TR        | 2h                                                   | NÃO          | Lavar o acesso antes e após a infusão com SG 5%.                                                               |
| 408710      |                                                                  |            |                                 |                           |                  |                  |                                                           |              |                                                      |              | <b>Incompatível com SF 0,9%.</b><br><br><b>MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b> |
| 408596      | Anidulafungina<br>100mg<br>(frasco-ampola)<br>PFIZER             | EV         | A depender do diagnóstico.      | AD<br>30mL<br>(3,33mg/mL) | Até 1h TR        | SF 0,9%<br>SG 5% | Vol. total de infusão:<br>130 mL (100+30mL)<br>0,77 mg/mL | Até 24h TR   | 1,4 mL/min ou<br>84 mL/h<br>Duração mínima de 90 min | NÃO          | Os eventos adversos relacionados à infusão não são frequentes com a taxa de infusão menor que                  |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                 |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                          | MA.UFCLI.001 – Página 11/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                 | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm | Dose Usual                                                      | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                          |              |                           | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |            |                                                                 | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração    |              |                                                                                                                              |
|             |                                            |            |                                                                 |                |              |                  |                          |              |                           |              | 1,1 mg/minuto.<br><b>MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>                                     |
| 17205       | Atracúrio 10mg/mL (ampola 2,5mL) CRISTÁLIA | EV         | Bolus Inicial de 0,3 a 0,6mg/kg<br>Manutenção: 0,3 a 0,6mg/kg/h | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 0,2 ou 0,5 mg/ mL        | 24h TA       | Bolus<br>Infusão contínua | NÃO          | Paralisia muscular prolongada e suas consequências são os principais sinais de superdose.<br><b>Antagonista: Neostigmina</b> |
| 289127      | Atracúrio 10mg/mL (ampola 5mL) CRISTÁLIA   | EV         | Bolus Inicial de 0,3 a 0,6mg/kg<br>Manutenção: 0,3 a 0,6mg/kg/h | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 0,2 ou 0,5 mg/ mL        | 24h TA       | Bolus<br>Infusão contínua | NÃO          | Paralisia muscular prolongada e suas consequências são os principais sinais de superdose.<br><b>Antagonista: Neostigmina</b> |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                   |                             |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                            | MA.UFCLI.001 – Página 12/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGRD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                   | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                  | Via de Adm                                                   | Dose Usual                                      | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO             |                                      |              |                                                                                         | Ajuste Renal                                                                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                         |                                                              |                                                 | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução      | Volume e/ou Concentração             | Estabilidade | Tempo de Administração                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 13862       | Atropina 25mg/mL (ampola 1mL) FARMACE            | EV<br>IM<br>SC<br>INTRA<br>ÓSSE<br>A<br>ENDO<br>TRAQ<br>UEAL | 0,5mg a 1mg<br><br>ENVENENAMENTO: 1 a 6mg       | NA             | NA           | SF 0,9%<br>AD        | Até 10mL                             | Uso imediato | EV lentamente                                                                           | NÃO                                                                                 | A administração via EV lento pode resultar em bradicardia paroxística. Pode ocorrer aumento da temperatura corporal após a administração. Excretado pelo leite materno |
| 273311      | Azitromicina 500mg (frasco-ampola) CRISTÁLIA     | EV                                                           | 10mg/kg/dia até 500mg/dia                       | AD: 4,8mL      | 24h TA       | SF 0,9%<br>SG 0,5%RL | 250mL (2mg/mL)<br>500mL (1mg/mL)     | 24h TA       | 1mg/mL em 3 h<br>2mg/mL em 1 h                                                          | NÃO                                                                                 | Não administrar em “bolus” ou IM.                                                                                                                                      |
| 402652      | Azul de Metileno 20mg/mL (ampola 2mL) CITOPHARMA | EV<br>TÓPIC<br>O                                             | 1 a 2mg/kg<br>A dose por ser repetida de 1 a 3x | NA             | NA           | SF 0,9% ou<br>SG 5%  | Puro ou diluído em 50mL (0,04 mg/mL) | Uso imediato | EV lento<br>Mínimo de 5 min<br><br>Se infusão contínua:<br>0,25 a 2 mg/kg/hora (7mg/kg) | Deve-se considerar o ajuste posológico para pacientes com insuficiência renal grave | Medicamento vesicante.<br><br>Usado como corante em cirurgias para avaliação de fístulas (Uso Tópico ou Intraluminal).                                                 |
| 288942      | Azul de TRYPAN 0,1% (ampola 1mL) OFTALMOPHARMA   | INTRA<br>OCULAR                                              | ACM                                             | NA             | NA           | NA                   | NA                                   | NA           | NA                                                                                      | NÃO                                                                                 | Medicamento de dose única. Proteger da luz e da umidade.                                                                                                               |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 13/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                       | Via de Adm                                                                                                                               | Dose Usual                                                                                                                                     | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                        | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |              |                                                                                                                                                |
| 402129      | Azul PATENTE 2,5% (ampola 2mL) 25mg/mL OFTALMOPHARMA                                                  | SC<br>EV<br>INTRA -<br>ARTE<br>RIAL                                                                                                      | 0,5-1 mL SC<br><br>Até 10mL<br>Intra-arterial                                                                                                  | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | NA                     | NÃO          | Corante utilizado para diagnóstico cirúrgico. Contraindicado na gestação. Pode induzir reações de hipersensibilidade imediata leves ou severas |
| 277780      | BETAmetasona, Acetato 3mg/mL + BETAmetasona, Fosfato 3,945mg/mL (ampola 1mL) MANTECORP; UNIÃO QUÍMICA | IM<br>Intra-<br>articul<br>ar<br>Periart<br>icular<br>Intrab<br>úrsico<br>Intrad<br>érmico<br>Intrales<br>sional<br>Tecido<br>s<br>moles | Indução de maturidade pulmonar fetal 12mg IM a cada 24h (2 doses) (Off-label)<br><br>Doenças de intensidade moderada a grave 1 mL semanalmente | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | NA                     | NÃO          | Agitar a ampola antes de usar.<br><br>Após aberto, o uso deve ser imediato.                                                                    |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 14/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                | Via de Adm | Dose Usual                                                                            | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                 |              |                                                                     | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                       |            |                                                                                       | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                        | Estabilidade | Tempo de Administração                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13889       | Bicarbonato de Sódio 8,4% (ampola 10mL)<br><b>84 mg/mL= 1mEq/mL</b><br>SAMTEC                  | EV<br>IM   | 0,5 a 2,5 mEq/kg/dose<br>Dose máx: 8.000mg/dia (> 60 anos) e 16.000mg/dia (< 60 anos) | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou Diluído<br>Concentração Mínima: 15mg/mL | 24h TA       | Administrar a solução pura ou diluída<br>1mEq/kg/min a 10mEq/kg/min | NÃO          | Medicamento vesicante.<br>Realizar flush na via de administração antes e depois da infusão.<br>Não administrar no mesmo acesso venoso, drogas vasoativas e Gluconato de Cálcio.<br>Adultos em acidose metabólica: 2 a 5 mEq/mL/kg de 4 a 8h. |
| 277275      | Bicarbonato de Sódio 8,4% (frasco 250mL)<br><b>84mg/mL= 1mEq/mL</b><br>FRESENIUS;<br>HYPOFARMA | EV         | 0,5 a 2,5 mEq/kg/dose<br>Dose máx: 8.000mg/dia (> 60 anos) e 16.000mg/dia (< 60 anos) | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou Diluído<br>Concentração Mínima: 15mg/mL | 24h TA       | Administrar a solução pura ou diluída<br>1mEq/kg/min a 10mEq/kg/min | NÃO          | Medicamento vesicante.<br>Realizar flush na via de administração antes e depois da infusão.<br>Não administrar no mesmo acesso venoso, drogas vasoativas e Gluconato de Cálcio.<br>Adultos em acidose                                        |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                  |  |                             |                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 15/90 |                          |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS NO HU-UGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão: 12/2025 |
|                     |                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                          |

| MEDICAMENTO |                                                   | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                       | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                        | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                          |            |                                                                                                                                  | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |              |                                                                         |
|             |                                                   |            |                                                                                                                                  |                |              |                 |                          |              |                        |              | metabólica: 2 a 5 mEq/mL/kg de 4 a 8h.                                  |
| 13897       | Biperideno, Lactato 5mg/mL (ampola 1mL) CRISTÁLIA | EV IM      | 2,5 a 5 mg/dia<br><br>Dose Máxima: 10 a 20 mg, deve ser distribuída ao longo do dia de modo uniforme (Síndromes Parkinsonianas). | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | EV mínimo 5 min        | NÃO          | Medicamento deve ser administrado lentamente. Após aberto uso imediato. |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 16/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                          | Via de Adm     | Dose Usual                                                                               | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                          |               |                                              | Ajuste Renal                                                                                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                 |                |                                                                                          | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                 | Estabilidade  | Tempo de Administração                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| 288949      | BromoPRIDA 5mg/mL (ampola 2mL) FRESENIUS UNIÃO QUÍMICA                                   | EV<br>IM       | 10 a 20mg/dia                                                                            | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Recomenda-se 18 a 48mL (Vol. total da solução 20 a 50mL) | 24h TA        | IM: profundo<br>EV: lento (superior a 3 min) | Em pacientes com depuração de creatinina < que 40 mL/min, realizar metade da dose recomendada | Reações extrapiramidais podem ocorrer com apenas uma dose em crianças e adultos jovens. A administração IM deve ser feita na região glútea ou na região deltoide.                    |
| 16535       | BUPIvacaina 0,5% + GLICOSE 8% (HIPERBÁRICA) (ampola 4mL) CRISTÁLIA; HIPOLABOR; HYPOFARMA | Intrat ecal    | 7,5 a 10,5mg (Cristália)<br>10 a 20 mg (Hipolabor e Hipofarma)                           | NA             | NA           | NA               | NA                                                       | NA            | NA                                           | NÃO                                                                                           | Não é recomendado diluir.                                                                                                                                                            |
| 407306      | Cafeína CITRATO 20mg/mL (ampola 1mL) CHIESI                                              | EV<br>VO<br>VS | Dose de Ataque: 20mg/kg<br>Dose manutenção: 5 a 10mg/kg a cada 24h.<br>Doses baseadas no | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído 10 mg/mL                                 | Uso imediato. | Infusão em 10 a 30 min.<br>Ataque (30min).   | NÃO                                                                                           | A dose de cafeína base é a metade da dose expressa como citrato de cafeína. Pode haver necessidade de ajuste de dose em lactentes. Alternativamente as doses de manutenção podem ser |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 17/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                            | RECONSTITUIÇÃO                                                                                                              |                                      | DILUIÇÃO         |                                                                              |                                      |                                                  | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                     |            |                                                                       | Tipo e Volume                                                                                                               | Estabilidade                         | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                                     | Estabilidade                         | Tempo de Administração                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|             |                                              |            | Citrato de Cafeína                                                    |                                                                                                                             |                                      |                  |                                                                              |                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | administradas VO e VS.                                                                                       |
| 14079       | Cefalotina 1.000mg (frasco-ampola) BLAU      | EV<br>IM   | 500mg a 2.000mg a cada 4 a 6h, não excedendo 12.000mg/dia em adultos. | AD<br>5 mL<br><br>Vol final 5,7mL (175mg/mL)                                                                                | 12h TA<br>96h TR                     | SF 0,9%<br>SG 5% | EV<br>50 a 100 mL (5 a 10mg/mL)<br><br>IM: 2,5mL de AD, SF ou Lidocaína 0,5% | 12h TA<br>7 dias TR                  | 30 minutos                                       | CICr de 50–80 mL/min: 2 g a cada 6h<br>CICr: 25–50 mL/min: até 1,5 g a cada 6h<br>CICr 10–25 mL/min: até 1 g a cada 6h<br>CICr 2–10 mL/min: até 500 mg a cada 6h<br>CICr < 2 mL/min: até 500 mg a cada 8h.                  | IM: Administrar em áreas de grande massa muscular                                                            |
| 248681      | Cefazolina 1.000mg (frasco-ampola) ABL EUGIA | EV<br>IM   | Limite de dose 6g/dia (raras ocasiões, 12g/dia)                       | IM: 2,5mL de Lidocaína 0,5% ou 2,5mL AD<br>Vol final: 3,2 mL (312,5mg/mL)<br><br>EV: 10mL AD<br>Vol final: 10,6mL (94mg/mL) | 12h TA<br>24h TR<br>Protegido da luz | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 100mL (5 s 10mg/mL)                                                     | 12h TA<br>24h TR<br>Protegido da luz | EV direto: 3 a 5 min<br><br>Infusão: 30 a 60 min | CICr ≥ 55 mL/min, administra-se a dose usual;<br>CICr de 35 e 54 mL/min: 8 a 12 h<br>CICr 11 e 34 mL/min, recomenda-se metade da dose usual a cada 12h<br>CICr ≤ 10 mL/min, utiliza-se metade da dose usual a cada 18 a 24h | A cor da solução pode escurecer durante armazenamento, porém a eficácia do medicamento permanece inalterada. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 18/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm | Dose Usual                                                                 | RECONSTITUIÇÃO                                                                         |                                                       | DILUIÇÃO         |                          |                                  |                                                                                        | Ajuste Renal                                                                                                                                                              | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |            |                                                                            | Tipo e Volume                                                                          | Estabilidade                                          | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                     | Tempo de Administração                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| 222380      | Cefepima 1.000mg (frasco-ampola) AUROBINDO | EV<br>IM   | 1.000 a 2.000mg a cada 12h<br>Casos graves até 8/8h                        | EV: 10mL AD<br>Vol final: 11,4mL<br><br>IM: 3mL AD ou Lidocaína 1%<br>Vol final: 4,4mL | 12h TA<br>3 dias TR                                   | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL                    | 12h TA<br>3 dias TR              | EV direto: 3 a 5 min<br><br>Infusão: 30min                                             | 1.000mg a cada 24h após a Hemodiálise<br>Diálise Peritoneal: dose usual a cada 48h                                                                                        | Do ponto de vista microbiológico, caso a abertura, reconstituição ou diluição não elimine o risco de contaminação, o produto deve ser administrado imediatamente. |
| 16845       | Cefotaxima 1.000mg (frasco-ampola) EUGIA   | EV<br>IM   | 1.000 a 2.000mg 12/12h<br>Casos graves: 6.000 a 12.000mg/dia               | AD 4mL<br>Vol. final: 4,63mL (216mg/mL)<br>IM<br>4 mL AD<br>Lidocaína 1%               | Uso Imediato<br>Protegido da luz                      | SF 0,9%<br>SG 5% | 40 a 100mL               | Uso imediato<br>Protegido da luz | EV direto: 3 a 5 minutos<br><br>Infusão curta: 20 min<br>Infusão contínua: 50 a 60 min | Se Depuração de creatinina Menor que 10mL/min: 50% da dose<br><br>Hemodiálise: 1.000 a 2.000mg/dia após a diálise                                                         | Se na reconstituição formar espuma, deixar em repouso por 15 min.                                                                                                 |
| 16640       | Cefoxitina 1.000mg (frasco-ampola) BLAU    | EV         | 1.000 a 2.000mg de 6 a 8h, até 12.000mg/dia<br>Idosos com mais de 75 anos: | 10mL AD<br>SF 0,9%<br>SG 5%.                                                           | 12h TA<br>AD<br><br>(SF 0,9%, SG 5%). 6h TA<br>7D TR. | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 100mL               | 4h TA                            | EV direto: 3 a 5 min<br><br>10 a 60 minutos                                            | ClCr 30 - 50 mL/min: 1-2g a cada 8 a 12h<br>10 - 29 mL/min: 1-2g a cada 12 a 24h<br>5 - 9 mL/min: 0,5 a 1g a cada 12 a 24h<br>menor que 5mL/min: 0,5 a 1g a cada 24 a 48h | Pó e soluções tendem a escurecer, porém a potência do produto mante-se inalterada. Hemodiálise: dose de ataque: 1 a 2g após cada hemodiálise.                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                        |  |                             |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                 |  | MA.UFCLI.001 – Página 19/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                        |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                                   | RECONSTITUIÇÃO                                                                                                                        |                 | DILUIÇÃO         |                          |                                                                 |                                                           | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                               | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                     |            |                                                                              | Tipo e Volume                                                                                                                         | Estabilidade    | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                                                    | Tempo de Administração                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                              |            | 2.000mg de 8/8h                                                              |                                                                                                                                       |                 |                  |                          |                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 406398      | Ceftazidima 2.000mg + Avibactam 500mg (frasco-ampola) PZIFER | EV         | 2.500mg a cada 8h                                                            | 10mL AD<br>Vol final 12mL (167,3 mg/mL)                                                                                               | Uso Imediato    | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 mL a 250 mL           | 4h TA<br>12h TR<br>8 mg/mL<br><br>4h TA<br>> 8 mg/mL a 40 mg/mL | 2 h                                                       | <b>ClCr 31–50 mL/min:</b><br>1 g/0,25 g 8/8h<br><b>ClCr 16–30:</b><br>0,75 g/0,1875 12/12h<br><b>ClCr 6–15</b><br>0,75 g/0,1875g 24h<br><b>ClCr ≤5 ou HD:</b><br>0,75 g/0,1875g 48h<br><b>Hemodiálise*</b> | Para reconstituição, insira uma agulha de liberação de gás através da tampa do frasco-ampola após a dissolução do produto para liberar a pressão interna<br><br>Este produto é sensível à luz antes da reconstituição e só deve ser retirado da caixa imediatamente antes do uso. |
| 288953      | Ceftriaxona 500mg (frasco-ampola) FRESENIUS                  | EV<br>IM   | 1.000 a 2.000mg, 24h ou 12h<br><b>Dose máxima:</b><br>4.000mg/dia 24h ou 12h | <b>EV:</b> 5 mL AD<br>Vol final: 5,2mL (96mg/mL)<br><b>IM:</b> 2mL de Lidocaína 1%<br>Vol final: 2,4mL (208mg/mL)<br>(ou 1 mL de AD + | 6h TA<br>24h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | Infusão: 50 mg/mL        | 6h TA<br>24h TR                                                 | EV direto:<br>2 a 4 min<br>Infusão<br>EV: 30 min (mínimo) | NÃO                                                                                                                                                                                                        | Sensível à luz. Porém, para sua administração, após reconstituição e/ou diluição, o produto é estável na presença de luz, não necessitando de                                                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 20/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                       | Via de Adm | Dose Usual                                                                | RECONSTITUIÇÃO                                                                                                                        |                 | DILUIÇÃO         |                          |                 |                                                                                          | Ajuste Renal                                                                                                                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                              |            |                                                                           | Tipo e Volume                                                                                                                         | Estabilidade    | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade    | Tempo de Administração                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                       |            |                                                                           | 1 mL Lidocaína 2%)                                                                                                                    |                 |                  |                          |                 |                                                                                          |                                                                                                                              | equipos e bolsas fotoprotetoras.                                                                                                                                                               |
| 16969       | Ceftriaxona 1.000mg (frasco-ampola) ABL/FRESENIUS/EUROFARMA/BIOCHIMICO                | EV<br>IM   | 1.000 a 2.000mg, 24h ou 12h<br><b>Dose máxima:</b> 4.000mg/dia 24h ou 12h | <b>EV:</b> 10mL AD Vol final: 10,5 a 11mL*<br><b>IM:</b> 3,5mL Lidocaína 1% Vol final: 4,2 mL (ou 1,75mL de AD + 1,75mL Lidocaína 2%) | 6h TA<br>24h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 100mL               | 6h TA<br>24h TR | IM: 1.000mg em cada músculo (máximo)<br><br>EV direto: 2 a 4 min Infusão 30 min (mínimo) | CICr menor que 10 mL/min: a dose NÃO deve ser superior a 2g/dia NÃO dialisável                                               | Sensível à luz. Porém, para sua administração, após reconstituição e/ou diluição, o produto é estável na presença de luz, não necessitando de equipos e bolsas. *Variação conforme fabricante. |
| 271616      | Ceftriaxona 1.000mg (frasco-ampola) + Diluente próprio 3,5mL (Lidocaína 1%) EUROFARMA | IM         | 1.000 a 2.000mg, 24h ou 12h<br><b>Dose máxima:</b> 4.000mg/dia 24h ou 12h | IM: 3,5mL Lidocaína 1% Vol final 4,2mL                                                                                                | 6h TA<br>24h TR | NA               | NA                       | NA              | IM                                                                                       | CICr menor que 10 mL/min: a dose NÃO deve ser superior a 2g/dia NÃO dialisável                                               | Recomenda-se não aplicar mais de 1g em cada glúteo.                                                                                                                                            |
| 167401      | Cefuroxima 750mg (frasco-ampola) BIOCHIMICO                                           | EV<br>IM   | 750 mg a 1.500MG a cada 8 horas, totalizando 3.000 a                      | EV<br>6mL AD<br><br>IM<br>3mL AD IM                                                                                                   | 5h TA<br>48h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 ou 100mL              | 3h TA<br>48h TR | 30 min                                                                                   | CICr 10–20 mL/min, a dose máxima é 750 mg a cada 12 horas; já na insuficiência grave CICr <10 mL/min, 750 mg uma vez ao dia. | O uso concomitante com anticoagulantes orais pode causar aumento do INR                                                                                                                        |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 21/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFOD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                | Via de Adm | Dose Usual                                                                         | RECONSTITUIÇÃO |                           | DILUIÇÃO        |                          |              |                        | Ajuste Renal                                                                                                                                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                       |            |                                                                                    | Tipo e Volume  | Estabilidade              | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                |            | 6.000mg por dia                                                                    |                |                           |                 |                          |              |                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14117       | CicloFOSFAMida 1.000mg (frasco-ampola) BAXTER  | EV         | A dose inicial é 40–50 mg/kg, seguida por manutenção de 10–15 mg/kg a ou 3–5 mg/kg | 50mL AD        | Uso Imediato TA<br>24h TR | SF 0,9% SG 5%   | 20mg/mL                  | 24h TR       | 15 a 60 minutos        | ClCr ≥30 mL/min não há ajuste.<br>Entre 10 e 29 mL/min, administra-se 75% a 100% da dose.<br>Com ClCr <10 mL/min, usa-se 50% a 100% da dose normal. | A dose pode ser ajustada em 5% no preparo sem alteração da dose no rótulo. Sendo assim, doses até 1684mg são ajustadas para 1600mg e devem ser diluídas em SF0,9% 250mL e infundidos em 1h. Medicamento preparado em Cabine de Segurança Biológica |
| 174653      | Ciprofloxacino 200mg (bolsa-100mL) HALEX ISTAR | EV         | 400mg-800mg 12/12h<br>Dose máx: 1.200mg/dia, 3x/dia                                | NA             | NA                        | NA              | NA                       | NA           | 60 min(mínimo)         | ClCr 30 - 50mL/min: dose máxima 800mg/dia<br>menor que 30mL/min: dose máxima 400mg/dia<br>Dialisável                                                | Medicamento sensível a luz.                                                                                                                                                                                                                        |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                        |                             |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                 | MA.UFCLI.001 – Página 22/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                        | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                      | Via de Adm | Dose Usual                                                  | RECONSTITUIÇÃO                                                    |              | DILUIÇÃO         |                          |              |                           | Ajuste Renal                                                   | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                             |            |                                                             | Tipo e Volume                                                     | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 980223      | Cetoprofeno 100mg (frasco-ampola) UNIAO QUIMICA CRISTÁLIA CITOPHARMA | EV         | 100 a 300mg/dia<br>Dose máx: 300 mg/dia                     | Solubilizar com o mesmo líquido que for diluir (SF 0,9% ou SG 5%) | Uso imediato | SF 0,9%<br>SG 5% | 100 a 150 mL             | Uso imediato | Infusão lenta, por 20 min | SIM<br>Reduzir a dose inicial e manter com a menor dose eficaz |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18317       | Cianocobalamina 500mcg/mL (Vitamina B12) (ampola 2mL) CITOPHARMA     | IM         | 1.000 mcg/dia                                               | NA                                                                | NA           | NA               | NA                       | NA           | NA                        | NÃO                                                            | Contraindicado o uso em crianças. O ácido ascórbico pode degradar a vitamina B12.                                                                                                                                                                               |
| 402267      | Cisatracúrio 2mg/mL (frasco 5mL) ACHE CRISTALIA                      | EV         | Dose inicial 0,15mg/Kg<br><br>Dose de manutenção: 0,03mg/Kg | NA                                                                | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 100 mL                   | 24h TA       | Infusão contínua          | NÃO                                                            | Como cisatracúrio só é estável em soluções ácidas, ele não deve ser misturado na mesma seringa ou administrado simultaneamente através da mesma agulha de soluções alcalinas como, por exemplo, tiopental sódico. O cisatracúrio não é compatível com propofol. |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 23/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                  | Via de Adm | Dose Usual                                      | RECONSTITUIÇÃO              |                  | DILUIÇÃO         |                             |                  |                                              | Ajuste Renal                                                                                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                         |            |                                                 | Tipo e Volume               | Estabilidade     | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração    | Estabilidade     | Tempo de Administração                       |                                                                                               |                                                                                         |
| 224669      | Claritromicina 500mg (frasco-ampola) ABBOTT BLAU | EV         | 1.000mg/dia, a cada 12h<br>Dose máx: 1g/dia e   | 10mL AD exclusivo (50mg/mL) | 24h TA<br>48h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | 250mL<br>2mg/mL             | 6h TA<br>48h TR  | No mínimo 60 min                             | Creatinina inferior a 30 mL/min, a dose deve ser reduzida à metade da dose normal recomendada | Não deve ser administrado em bolus ou por via IM. Administrar somente pela via EV       |
| 402161      | Clindamicina 300mg (ampola 2mL) HIPOLABOR        | EV<br>IM   | 600 mg a 2.700mg/dia em 2 a 4 doses fracionadas | NA                          | NA               | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 100 mL (Máx: 18 mg/mL) | 24h TA<br>48h TR | EV: 10 a 60 minutos.<br>Não exceder 30mg/min | NÃO                                                                                           | Risco de Flebite. IM: áreas de grande massa muscular<br>Não exceder 600mg por aplicação |
| 14168       | Clindamicina 600mg (ampola 4mL) HIPOLABOR        | EV<br>IM   | 600 mg a 2.700mg/dia em 2 a 4 doses fracionadas | NA                          | NA               | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 100 mL (Máx: 18 mg/mL) | 24h TA<br>48h TR | EV: 10 a 60 minutos.<br>Não exceder 30mg/min | NÃO                                                                                           | Risco de Flebite. IM: áreas de grande massa muscular<br>Não exceder 600mg por aplicação |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 24/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFOD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                             | Via de Adm                         | Dose Usual                                                                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                   |                                                                        |              |                                                                      | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                                    |                                    |                                                                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução            | Volume e/ou Concentração                                               | Estabilidade | Tempo de Administração                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| 271412      | CloNIDina<br>150mcg/mL<br>(ampola 1mL)<br>CRISTÁLIA; HALEX<br>ISTAR                                         | EV<br>IM<br>Intratecal<br>Epidural | 2 a 4mcg/kg<br>por via<br>epidural<br><br>0,5-1mcg/kg<br>por via<br>intratecal<br><br>150mcg/dose | NA             | NA           | SF 0,9%                    | 10 a 500 mL                                                            | 24h TA       | IM profunda<br><br>EV lento<br>7 a 10 min<br><br>Infusão             | TFGe < 30<br>mL/minuto/1,73 m².<br>Comece com uma<br>dose baixa e titule<br>para cima com cautela<br>de acordo com a<br>resposta do paciente,<br>não mais<br>frequentemente do<br>que para pacientes<br>com função renal<br>normal | Dose<br>Máxima: 40mcg/h<br>para infusão<br>peridural.<br><br>Não interrompa o<br>tratamento<br>abruptamente.<br>Reduza gradualmente<br>para evitar sintomas<br>de abstinência (por<br>exemplo, hipertensão<br>de rebote). |
| 288961      | Cloreto de<br>POTÁSSIO 19,1%<br>(ampola 10mL)<br><b>191mg/mL =<br/>2,56mEq/mL</b><br>SAMTEC; HALEX<br>ISTAR | EV<br>IM                           | 10 a 40<br>mEq/h<br>Dose máx:<br>400mEq/dia                                                       | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%           | AVP: 1 amp 500 mL<br>AVC: 1 ou 2 amp em<br>100mL<br>2 amp em 250mL     | 24h TA       | Infusão<br>periférica:<br>10mEq/h<br><br>Infusão central:<br>40mEq/h | Insuficiência renal<br>leve a moderada: usar<br>com cautela<br>Insuficiência renal<br>grave: contraindicado                                                                                                                        | NÃO ADMINISTRAR<br>PURO.<br>Medicamento<br>vesicante.<br>Não é aconselhável<br>que a diluição seja<br>realizada com SG 5%<br>em caso de<br>hipocalemia grave                                                              |
| 15350       | Cloreto de SÓDIO<br>20%<br>(ampola 10mL)<br><b>200mg/mL</b>                                                 | EV                                 | 3 a<br>4mEq/kg/dia<br>Dose máx:<br>100 a<br>150mEq/dia                                            | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%<br>Ringer | AVP: 1 ampola em<br>100mL.<br>concentrações<br>maiores usar em<br>AVC. | 24h TA       | Lento                                                                | NÃO                                                                                                                                                                                                                                | Não administrar<br>puro.<br>Medicamento<br>vesicante.<br>A dose deve ser                                                                                                                                                  |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 25/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                     | Via de Adm           | Dose Usual                                    | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                                |                            |                         | Ajuste Renal                                                         | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                            |                      |                                               | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                       | Estabilidade               | Tempo de Administração  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|             | (3,422mEq/mL)<br>SAMTEC                             |                      |                                               |                |              |                  | Não ultrapassar<br>1mEq/kg/h                                   |                            |                         |                                                                      | ajustada segundo a Concentração sérica de sódio, condição clínica, idade e peso do paciente.                                                                                                                               |
| 14397       | ClorproMAZINA<br>5mg/mL (ampola 5mL)<br>CRISTÁLIA   | IM<br>EV (off label) | 25 a 100mg                                    | NA             | NA           | NA               | NA                                                             | NA                         | IM lentamente           | Insuficiência renal<br>usar com cautela.                             | Em uso EV este medicamento pode potencializar o prolongamento do intervalo QT, o que aumenta o risco de ataque de arritmias ventriculares graves do tipo “torsades de pointes”, que é potencialmente fatal (morte súbita). |
| 18333       | Complexo B Polivitamínico (ampola 2mL)<br>HYPOFARMA | EV<br>IM             | 1 a 2<br>ampolas/dia<br>ou em dias alternados | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Volume maior ou igual a 500mL, sendo preferencialmente 1.000mL | 24h TA<br>Protegido da Luz | EV Lento<br>gota a gota | NÃO deve ser utilizado em pacientes que apresentem problemas renais. | Medicamento Fotossensível. Deve-se evitar a via parenteral em pacientes com sinais de intolerância a Vitamina B1 (Tiamina) VO. Contraindicado em pacientes                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 26/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                | Via de Adm                                                                | Dose Usual                                          | RECONSTITUIÇÃO                               |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                                                                                             | Ajuste Renal                                                                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                       |                                                                           |                                                     | Tipo e Volume                                | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                |                                                                           |                                                     |                                              |              |                 |                          |              |                                                                                             |                                                                              | parkinsonianos em uso de Levodopa.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223964      | Contraste Radiológico - Óleo de Papoula Iodado (10mL) DELPHARM | Intralinfática<br><br>Intraarterial seletiva hepática<br><br>Intrauterina | 5 – 14mL (Variável conforme o tipo de procedimento) | NA                                           | NA           | NA              | NA                       | NA           | EV lento ou cateterismo<br>Utilizar seringa de vidro ou materiais compatíveis com o produto | NÃO<br><br>Seu uso está relacionado com o agravamento de insuficiência renal | Não deve ser administrado EV, intra-arterial, (exceto cateterismo da artéria hepática) ou intratecal.<br>Contraindicação: Hipertireoidismo, pacientes > 70 anos, lesões traumáticas, hemorragias ou sangramentos recentes, broncografia.<br>É excretado no leite materno. Sugestão é suspender a amamentação. |
| 285506      | Complexo Protrombínico                                         |                                                                           |                                                     | 20mL Diluente Próprio (água para injetáveis) | Uso Imediato | NA              | NA                       | NA           | 2mL/min                                                                                     |                                                                              | Contém 81,7 mg de sódio por frasco.                                                                                                                                                                                                                                                                           |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 27/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                             | Via de Adm    | Dose Usual                                                                                                                      | RECONSTITUIÇÃO                               |                                  | DILUIÇÃO        |                          |               |                               | Ajuste Renal                                                                                                                             | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                    |               |                                                                                                                                 | Tipo e Volume                                | Estabilidade                     | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade  | Tempo de Administração        |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|             | Humano 600 UI (frasco-ampola) TAKEDA PHARMA |               |                                                                                                                                 |                                              |                                  |                 |                          |               |                               |                                                                                                                                          | Ler orientações de preparo na bula.                                                                                        |
| 405472      | Daptomicina 500 mg (frasco-ampola) INTAS    | EV Intratecal | Infecções de pele e partes moles: 4 mg/kg 1x/dia por 7–14 dias. Bacteremia por <i>S. aureus</i> : 6mg/kg 1x/dia por 2–6 semanas | 10mL SF 0,9%                                 | 12h TA 48h TR                    | SF 0,9%         | 10mg/mL                  | 12h TA 48h TR | 30 min                        | ClCr 30 a <130 mL / minuto: Não é necessário ajuste de dose<br>ClCr <30 mL / minuto: Administre a dose usual recomendada a cada 48 horas | Não é compatível com diluentes que contenham glicose                                                                       |
| 198803      | Dantroleno 20mg (frasco-ampola) CRISTÁLIA   | EV            | 2,5 mg/kg<br>Dose máx: 10 mg/kg                                                                                                 | AD: 60mL<br>Diluyente próprio exclusivamente | 6h TA<br>Protegido da luz direta | NA              | NA                       | NA            | EV bolus<br>Infusão em 1 hora | NÃO                                                                                                                                      | Não deve ser administrado em pacientes que estão amamentando. SG 5%, SF 0,9% e outras soluções ácidas não são compatíveis. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 28/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                          | Via de Adm                        | Dose Usual                                                                                                     | RECONSTITUIÇÃO                                                                                  |              | DILUIÇÃO               |                                |              |                        | Ajuste Renal                                      | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                 |                                   |                                                                                                                | Tipo e Volume                                                                                   | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração       | Estabilidade | Tempo de Administração |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 402666      | Desferroxamina, Mesilato 500mg (frasco-ampola) CRISTÁLIA | EV<br>IM<br>SC<br>some nte em BI. | 20 a 60mg/kg/dia<br>Sobrecarga crônica de ferro:<br>60mg/kg/dia<br>Intoxicação aguda por ferro:<br>80mg/kg/dia | AD<br>EV e SC = 5 mL<br>Vol final: 5,3mL 95mg/mL<br><br>IM = 2 mL<br>Vol final: 2,35mL 213mg/mL | 24h TA       | SF 0,9%<br>SG 5%       | 150mL                          | 24h TA       | EV Lento               | Em insuficiência renal grave recomenda-se cautela | A infusão EV rápida pode provocar hipotensão e choque. O medicamento não deve ser utilizado em concentração maiores que 95mg/mL, quando administrado SC, pois aumenta o risco de reação local. Quando a via IM for a única opção, pode ser necessário o uso de concentrações maiores para facilitar a injeção. |
| 12769       | Deslanosídeo 0,2mg/mL (ampola 2mL) UNIÃO QUÍMICA         | EV<br>IM                          | 0,2 – 1,6mg/dia                                                                                                | NA                                                                                              | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%<br>AD | 50mL                           | 24h TA       | Lenta                  | Insuficiência renal reduzir a dose.               | Não deve ser ultrapassada a dose máxima de 2mg/dia. Não deve usar Cálcio parenteral em pacientes em uso de Deslanosídeo.                                                                                                                                                                                       |
| 257869      | Desmopressina 4mcg/mL                                    | EV<br>IM<br>SC                    | 1 a 4mcg/dia ou 0,3mcg/kg,                                                                                     | NA                                                                                              | NA           | SF 0,9%                | EV:<br>< 3mcg: 10mL<br>SF 0,9% | Uso Imediato | 15 a 30 min            | ClCr menor que 50 mL/min:<br>Contraindicado       | Medicamento deve ser mantido em geladeira.                                                                                                                                                                                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                        |                             |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                 | MA.UFCLI.001 – Página 29/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                        | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                     | Via de Adm     | Dose Usual                                                                                       | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                                           |                                                                                 |                 |                                          | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                            |                |                                                                                                  | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                                                    | Volume e/ou Concentração                                                        | Estabilidade    | Tempo de Administração                   |              |                                                                                         |
|             | (ampola 1mL)<br>FERRING                             |                | repetindo 1-2 vezes a intervalos de 6-12h.                                                       |                |              |                                                                                    | > 3mcg: 50mL<br>SF 0,9%<br>IM e SC: não é necessária diluição                   |                 |                                          |              | Contraindicado em insuficiência renal moderada a severa e em hiponatremia.              |
| 14575       | Dexametasona 4mg/mL (ampola 2,5mL)<br>HYPOFARMA     | EV<br>IM<br>IA | 4 a 20mg/dia<br>Em alguns casos específicos a dose pode ser maior (Máx 40mg dia).<br>1, 2 ou 4X) | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                                                                   | 50 a 100mL                                                                      | 24h TA          | EV direto lento<br>Infusão gota a gota   | NÃO          | O tratamento não deve ser interrompido bruscamente, deve-se diminuir a dose aos poucos. |
| 276496      | DexMEDEtomidina 100mcg/mL (frasco 2mL)<br>CRISTÁLIA | EV             | Dose máx: 17,8 mcg/kg/dia                                                                        | NA             | NA           | SF 0,9%                                                                            | 50mL                                                                            | 4h TA<br>24h TR | EV bomba de infusão                      | NÃO          | Incompatibilidade com a Anfotericina B e Diazepam.                                      |
| 14664       | DIAzepam 5mg/mL (ampola 2mL)<br>SANTISA             | EV<br>IM       | Dose máx: 3mg/kg/dia                                                                             | NA             | NA           | Não é recomendado diluir.<br>Se precisar diluir, é compatível com SG 5%<br>SF 0,9% | Utilizar 4mL (no máximo) + 246 mL de SG 5% ou SF 0,9%<br>Não ultrapassar 250 mL | 4h              | EV: 0,5 a 1 mL/min<br>Bolus: 2 a 5mg/min | NÃO          |                                                                                         |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                   |  |                             |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                            |  | MA.UFCLI.001 – Página 30/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGRD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                   |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                   | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                         | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                          |              |                                              | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                          |            |                                                                                                                                    | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                 | Estabilidade | Tempo de Administração                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 273733      | Difenidramina 50 mg/mL; (ampola 1mL) CRISTÁLIA                    | IM<br>EV   | 10 a 50 mg a cada 6h<br>Dose máxima 400mg/dia                                                                                      | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 1 a 50mg/mL                              | 24h TA       | 3 a 5 min<br>Infusão: 15-30min               | NÃO          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 269618      | Dimenidrinato + Piridoxina (Vitamina B6) (ampola 10mL) BRAINFARMA | EV         | 30mg a cada 4 a 6 horas<br><br>Cada ampola contém 30mg de dimenidrinato 50mg de Piridoxina, 1000mg de glicose e 1000mg de frutose. | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL                                    | Uso imediato | EV direto maior que 2 min<br>Infusão: 30 min | NÃO          | Pode aumentar a concentração sérica de ácido úrico e não deve ser administrado para pacientes com gota. O Dimenidrinato pode mascarar os sintomas de ototoxicidade secundária ao uso de drogas ototóxicas. Pode ainda exacerbar desordens convulsivas. |
| 14826       | DipiRONA 500mg/mL (ampola 2mL) FARMACE                            | EV<br>IM   | 1.000mg a cada 4h ou 6h<br>Dose máx: 5.000mg a 7.500mg                                                                             | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 20mL (até 1.000mg)<br>50mL (até 2.500mg) | Uso imediato | EV direto lento 1 mL/min                     | NÃO          |                                                                                                                                                                                                                                                        |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                   |  |                             |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                            |  | MA.UFCLI.001 – Página 31/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGRD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                   |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                       | Via de Adm     | Dose Usual                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                                                                     |              |                                                                          | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                                    | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                              |                |                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração                                            | Estabilidade | Tempo de Administração                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| 16861       | DOBUTamina<br>12,5mg/mL<br>(ampola 20mL)<br>HYPOFARMA | EV             | 2,5-20<br>mcg/kg/min<br>Dose máx:<br>40mcg/kg/min      | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%       | 0,25 a 1 mg/mL<br>Concentração máx<br>5mg/mL<br>(1 ampola em 50mL)  | 24h TA       | Infusão contínua<br>(0,25 a 1<br>mcg/kg/min)                             | NÃO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| 14834       | DOPamina<br>5mg/mL<br>(ampola 10mL)<br>CRISTÁLIA      | EV             | 5-<br>10mcg/kg/min<br>Dose máx:<br>20-50<br>mcg/kg/min | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%       | 250mL<br>(volume máximo)<br>2mg/mL<br>Concentração Máx:<br>3,2mg/mL | Uso imediato | Infusão contínua<br>utilizar uma capa<br>escura para o<br>frasco de soro | O uso deve ser<br>limitado em pacientes<br>que NÃO tenham o<br>débito urinário<br>adequado após terem<br>recebidos diuréticos.<br>Caso a oligúria<br>persista, deve ser<br>descontinuada nas<br>24 h seguintes. | Deve ser diluída<br>antes do uso.<br>Não usar EV direto.<br>Atenção: coloração<br>amarelo-castanho<br>indicativo de<br>contaminação. |
| 13250       | EFEDrina<br>50mg/mL<br>(ampola 1mL)<br>HYPLABOR       | EV<br>IM<br>SC | 25-50mg<br>Dose máx:<br>150mg/dia                      | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 9mL                                                                 | Uso imediato | Lento<br>protegido da luz                                                | NÃO                                                                                                                                                                                                             | Monitorar<br>hipertensão,<br>excitabilidade do<br>SNC, retenção<br>urinária, disritmias e<br>depressão<br>respiratória.              |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 32/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFOD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                            | Via de Adm                                   | Dose Usual                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                          |              |                            | Ajuste Renal                                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                   |                                              |                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242845      | Enoxaparina 20mg (seringa 0,2mL)<br>BLAU FARMACEUTICA S.A. | SC profundo<br>EV (em situações específicas) | 20 a 40mg<br>1 a 2x ao dia<br>Dose máx: 160mg/dia | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 3mg/mL                   | Uso imediato | SC<br>EV Bolus<br>EV Lento | Insuficiência grave (ClCr menor que 30mL/min): 1mg/kg, 1 vez/dia e 20mg, 1x/dia.<br>Insuficiência moderada (ClCr 30-50mL/min) e leve (50-80mL/min) | <b>Observar se a apresentação farmacêutica disponível, possibilita o fracionamento da dose. Retirar a dose em excesso antes da administração.</b><br>EV em bolus: apenas para tratamento de infarto agudo do miocárdio.<br>Lavar o acesso antes e depois da administração com SF 0,9% ou SG 5%.<br>A administração SC profunda deve ser realizada na parede abdominal, 5 cm do umbigo, com o paciente deitado ou sentado, alternando os lados. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 33/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm                                   | Dose Usual                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                          |              |                            | Ajuste Renal                                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |                                              |                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242853      | Enoxaparina 40mg (seringa 0,4mL) CRISTÁLIA | SC profundo<br>EV (em situações específicas) | 20 a 40mg<br>1 a 2x ao dia<br>Dose máx: 160mg/dia | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 3mg/mL                   | Uso imediato | SC<br>EV Bolus<br>EV Lento | Insuficiência grave (ClCr menor que 30mL/min): 1mg/kg, 1 vez/dia e 20mg, 1x/dia.<br>Insuficiência moderada (ClCr 30-50mL/min) e leve (50-80mL/min) | <b>Observar se a apresentação farmacêutica disponível, possibilita o fracionamento da dose. Retirar a dose em excesso antes da administração.</b><br>EV em bolus: apenas para tratamento de infarto agudo do miocárdio.<br>Lavar o acesso antes e depois da administração com SF 0,9% ou SG 5%.<br>A administração SC profunda deve ser realizada na parede abdominal, 5 cm do umbigo, com o paciente deitado ou sentado, alternando os lados. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 34/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm                                   | Dose Usual                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                          |              |                            | Ajuste Renal                                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |                                              |                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 269466      | Enoxaparina 60mg (seringa 0,6mL) CRISTÁLIA | SC profundo<br>EV (em situações específicas) | 20 a 40mg<br>1 a 2x ao dia<br>Dose máx: 160mg/dia | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 3mg/mL                   | Uso imediato | SC<br>EV Bolus<br>EV Lento | Insuficiência grave (ClCr menor que 30mL/min): 1mg/kg, 1 vez/dia e 20mg, 1x/dia.<br>Insuficiência moderada (ClCr 30-50mL/min) e leve (50-80mL/min) | <b>Observar se a apresentação farmacêutica disponível, possibilita o fracionamento da dose. Retirar a dose em excesso antes da administração.</b><br>EV em bolus: apenas para tratamento de infarto agudo do miocárdio.<br>Lavar o acesso antes e depois da administração com SF 0,9% ou SG 5%.<br>A administração SC profunda deve ser realizada na parede abdominal, 5 cm do umbigo, com o paciente deitado ou sentado, alternando os lados. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 35/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                            | Via de Adm                                   | Dose Usual                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                          |              |                            | Ajuste Renal                                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                   |                                              |                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 402251      | Enoxaparina 80mg (seringa 0,8mL)<br>BLAU FARMACEUTICA S.A. | SC profundo<br>EV (em situações específicas) | 20 a 40mg<br>1 a 2x ao dia<br>Dose máx: 160mg/dia | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 3mg/mL                   | Uso imediato | SC<br>EV Bolus<br>EV Lento | Insuficiência grave (ClCr menor que 30mL/min): 1mg/kg, 1 vez/dia e 20mg, 1x/dia.<br>Insuficiência moderada (ClCr 30-50mL/min) e leve (50-80mL/min) | <b>Observar se a apresentação farmacêutica disponível, possibilita o fracionamento da dose. Retirar a dose em excesso antes da administração.</b><br>EV em bolus: apenas para tratamento de infarto agudo do miocárdio.<br>Lavar o acesso antes e depois da administração com SF 0,9% ou SG 5%.<br>A administração SC profunda deve ser realizada na parede abdominal, 5 cm do umbigo, com o paciente deitado ou sentado, alternando os lados. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 36/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                | Via de Adm     | Dose Usual                              | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO               |                                                                                |                           |                                                                  | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                       |                |                                         | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução        | Volume e/ou Concentração                                                       | Estabilidade              | Tempo de Administração                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14885       | EPINEFrina<br>1mg/mL<br>(ampola 1mL)<br>(1:1.000)<br>HYPOFARMA | EV<br>IM<br>SC | 0,3 – 0,5mg                             | NA             | NA           | EV<br>SF 0,9%<br>SG 5% | Diluições de 1 para 10.000 ou 1 para 100.000<br>Concentração máxima: 16mcg/mL; | 24h TA<br>Proteger da luz | EV bolus<br>EV infusão                                           | NÃO          | Cuidado com pacientes que estão em uso de betabloqueadores. Nesses casos, poderá ocasionar um aumento da pressão severa e até mesmo hemorragia cerebral.                                                                                      |
| 282012      | Escetamina<br>50mg/mL<br>(ampola 2mL)<br>CRISTÁLIA             | EV<br>IM       | EV: 1 a 4,5 mg/kg<br>IM: 6,5 a 13 mg/kg | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%       | 250 ou 500 mL<br>Concentração Max: 2mg/mL                                      | Uso imediato              | Se puro administrar lentamente (60 segundos)<br>Infusão Contínua | NÃO          | Existe incompatibilidade com os barbitúricos ocorrendo precipitado. A ação é potencializada pelo Diazepam, os dois medicamentos devem ser administrados separados. Deve ser usado com precaução em pacientes que fazem uso crônico de álcool. |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 37/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                   | Via de Adm     | Dose Usual                                   | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                          |                                           |              |                                                                  | Ajuste Renal                                                                                                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                          |                |                                              | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                   | Volume e/ou Concentração                  | Estabilidade | Tempo de Administração                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14087       | Escetamina 50mg/mL (frasco-ampola 10mL) CRISTÁLIA | EV<br>IM       | EV: 1 a 4,5 mg/kg<br>IM: 6,5 a 13 mg/kg      | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                  | 250 ou 500 mL<br>Concentração Max: 2mg/mL | Uso imediato | Se puro administrar lentamente (60 segundos)<br>Infusão Contínua | NÃO                                                                                                                 | Existe incompatibilidade com os barbitúricos ocorrendo precipitado. A ação é potencializada pelo Diazepam, os dois medicamentos devem ser administrados separados. Deve ser usado com precaução em pacientes que fazem uso crônico de álcool. |
| 15555       | Escopolamina 20mg/mL (ampola 1mL) HYPOLABOR       | EV<br>IM<br>SC | 20 a 40mg a cada 6h ou 8h<br>Dose máx: 100mg | NA             | NA           | Se necessário diluição<br>SF 0,9% | 20mL                                      | Uso imediato | EV direto lentamente 2 a 3 min<br>IM ou SC                       | Utilizar com cuidado em pacientes com insuficiência renal, devido ao aumento do risco de reação adversa neurológica | Esse medicamento é contraindicado para uso por idosos especialmente sensíveis aos efeitos secundários dos antimuscarínicos, como secura da boca e retenção urinária.                                                                          |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                   |                             |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                            | MA.UFCLI.001 – Página 38/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGRD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                   | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                              | Via de Adm                      | Dose Usual                                           | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                        |                                                                     |              |                                             | Ajuste Renal                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                     |                                 |                                                      | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                 | Volume e/ou Concentração                                            | Estabilidade | Tempo de Administração                      |                                                    |                                                                                                                                                       |
| 288985      | Escopolamina 4mg/mL + DIPIRONA 500mg/mL (ampola 5mL) FARMACE | EV<br>IM                        | 1 ampola de 2 a 3 x ao dia                           | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                                | 50mL                                                                | Uso imediato | EV direto<br>5 min<br>Mín. 1mL/min          | Evitar a administração repetida de doses elevadas. |                                                                                                                                                       |
| 16152       | Etanolamina Oleato 50mg/mL (ampola 2mL) FARMOQUÍMICA         | EV                              | 2 a 5mL<br>Dose máx.: 20mL por sessão                | NA             | NA           | AD ou SG 50%<br>para obter soluções de 25% e 5% | A solução original deve ser diluída em um volume 4 a 20 vezes maior | Uso imediato | Lento                                       | NÃO                                                | A dosagem individual total em cada veia não deve ultrapassar 6 mL.                                                                                    |
| 288989      | Etilefrina 10 mg/mL (frasco-ampola) UNIÃO QUÍMICA            | EV<br>IM<br>SC                  | 0,7 a 1 mL (7-10 mg)<br>10                           | NA             | NA           | Se necessário diluição<br>SF 0,9%<br>SG 5%      | ACM                                                                 | Uso imediato | EV: lento<br>0,4 mg/min<br>(0,2-0,6 mg/min) | -                                                  | Se for indicado o uso endovenoso, deve-se preferir a aplicação por meio de infusão gota a gota.                                                       |
| 285156      | Etomidato 2mg/mL (ampola 10mL) CRISTÁLIA                     | EV<br>(veias de grande calibre) | 0,2-0,3 mg/kg e 5 - 20 mcg/kg/min<br>Dose máx.: 60mg | NA             | NA           | NA                                              | NA                                                                  | Uso imediato | EV lento<br>30 a 60 segundos                | NÃO                                                | Não é recomendado a administração por infusão.<br>Altamente irritante. Evitar veias de pequeno calibre.<br>Pode causar hipotensão, náuseas e vômitos. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 39/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                       | Via de Adm | Dose Usual                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                   |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                | Ajuste Renal                                                                                                                         | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                              |            |                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução            | Volume e/ou Concentração                                                                                                  | Estabilidade                                                   | Tempo de Administração                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15040       | Fenitoína<br>50mg/mL<br>(ampola 5mL)<br>HYPOLABOR     | EV<br>IM   | 300 - 400mg,<br>2-3 x dia<br>Dose máx:<br>1.000 mg/dia | NA             | NA           | SF 0,9%                    | Se necessário diluir,<br>utilizar de 25 a 50mL<br>de SF0,9% para<br>100mg de Fenitoína.<br>Concentração<br>máxima 5mg/mL. | Imediato.<br>Terminar a<br>infusão em<br>no máximo 4<br>horas. | EV direto<br>50mg/min<br>As aplicações EV<br>devem ter<br>intervalo de,<br>pelo menos<br>15min | Podem ser necessárias<br>redução da dose, pela<br>biodisponibilidade do<br>medicamento ser<br>aumentada neste<br>grupo de pacientes. | INCOMPATÍVEL COM<br>SG 5%.<br>Não recomendada a<br>diluição para infusão,<br>devido baixa<br>solubilidade e a<br>consequente<br>precipitação.<br>Utilizar filtro de 0,22<br>micras.<br>A infusão deve ser<br>realizada por curtos<br>períodos.<br>Evitar a via IM devido<br>ao alto risco de dano<br>tecidual e necrose.<br>(medicamento<br>vesicante) |
| 233412      | FenOBARbital<br>100mg/mL<br>(ampola 2mL)<br>CRISTÁLIA | EV<br>IM   | 100-<br>320mg/dia<br>Dose máx:<br>600mg/dia            | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%<br>SG 10% | 30 a 130 mg/mL.                                                                                                           | 24h TA                                                         | 60mg/min                                                                                       | Em pacientes com<br>ClCr menor do que<br>10mL/min aumentar o<br>intervalo entre as<br>doses para 12-16h                              | Não exceder<br>60mg/min<br>IM: deve ser aplicada<br>em local de massa<br>muscular grande e<br>injetar menos de 5mL<br>em cada lado.                                                                                                                                                                                                                    |
| 15091       | FentaNILA, Citrato<br>(Fentanila Base                 | EV<br>IM   | Doses<br>variadas de                                   | NA             | NA           | Se<br>necessário,          | 50 mL<br>0,01 a 0,02 mg/mL                                                                                                | 24h TA                                                         | EV direto: 1 a 2<br>min                                                                        | ClCr entre 10 e<br>50mL/min: 75% da                                                                                                  | Pode causar flebite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 40/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                          | Via de Adm                                 | Dose Usual                                                   | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                           |                                                                     |              |                                                                        | Ajuste Renal                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                 |                                            |                                                              | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                    | Volume e/ou Concentração                                            | Estabilidade | Tempo de Administração                                                 |                                                                                             |                                                |
|             | 0,05mg/mL)<br>(frasco-ampola 10mL)<br>HIPOLABOR                                          | EPIDU<br>RAL                               | acordo com a condição clínica do paciente.                   |                |              | SF 0,9%<br>SG 5%                   | SF 0,9%<br>0,01 a 0,04 mg/mL<br>SG 5%                               |              | EV contínuo<br>Concentração máxima<br>50mcg/mL                         | dose normal<br>ClCr menor que 10mL/min: 50% da dose normal                                  |                                                |
| 115240      | FentaNILA, CITRATO<br>(Fentanila base 0,05mg/mL)<br>(frasco-ampola 2mL)<br>UNIÃO QUIMICA | EV<br>IM<br>INTRA<br>TECAL<br>EPIDU<br>RAL | Doses variadas de acordo com a condição clínica do paciente. | NA             | NA           | Se necessário,<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 50 mL<br>0,01 a 0,02 mg/mL<br>SF 0,9%<br>0,01 a 0,04 mg/mL<br>SG 5% | 24h TA       | EV direto: 1 a 2 min<br>EV contínuo<br>Concentração máxima<br>50mcg/mL | ClCr entre 10 e 50mL/min: 75% da dose normal<br>ClCr menor que 10mL/min: 50% da dose normal | Pode causar flebite.                           |
| 140767      | FentaNILA, CITRATO<br>(Fentanila base 0,5mg/mL)<br>(frasco-ampola 5mL)<br>CRISTÁLIA      | EV<br>IM<br>INTRA<br>TECAL<br>EPIDU<br>RAL | Doses variadas de acordo com a condição clínica do paciente. | NA             | NA           | Se necessário,<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 50 mL<br>0,01 a 0,02 mg/mL<br>SF 0,9%<br>0,01 a 0,04 mg/mL<br>SG 5% | 24h TA       | EV direto: 1 a 2 min<br>EV contínuo<br>Concentração máxima<br>50mcg/mL | ClCr entre 10 e 50mL/min: 75% da dose normal<br>ClCr menor que 10mL/min: 50% da dose normal | Pode causar flebite.                           |
| 289039      | Férrico, Sacarato de Hidróxido<br>20mg/mL (ampola)                                       | EV                                         | 100mg<br>Dose máx: 200mg                                     | NA             | NA           | SF 0,9%<br>Exclusivo               | Cada 1mL da ampola<br>EV, deve ser rediluído em 20mL                | Uso imediato | EV não diluído: velocidade máx de 1mL/min                              | Deve ser administrado com cuidado em pacientes com                                          | O tempo de administração EV diluído depende da |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                          |  |                             |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                   |  | MA.UFCLI.001 – Página 41/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGRD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                          |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                           | Via de Adm      | Dose Usual                                                                 | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                                 |                                    |              |                                                                           | Ajuste Renal                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                  |                 |                                                                            | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                                          | Volume e/ou Concentração           | Estabilidade | Tempo de Administração                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 5mL)<br>(NORIPURUM)<br>BLAU<br>FARMACEUTICA                               |                 |                                                                            |                |              |                                                                          |                                    |              | EV diluído:<br>depende da<br>dose: de 15min a<br>3,5h                     | disfunção hepática ou<br>renal (alteração das<br>funções do fígado e<br>dos rins). | dose de Ferro, se<br>Ferro 100mg<br>administrar em<br>15min, 200mg em<br>30min, 300mg em<br>1,5h, 400mg em 2,5h<br>e 500mg em 3,5h. A<br>administração IM é<br>na região glútea,<br>profundamente, com<br>uso da técnica em "Z" |
| 141631      | Filgrastim<br>300mcg/mL<br>(frasco-ampola<br>1mL)<br>BLAU<br>FARMACEUTICA | IM<br>EV<br>SC  | Doses<br>variadas de<br>acordo com a<br>condição<br>clínica do<br>paciente | NA             | NA           | SG 5%<br>Não diluir<br>para<br>concentrações<br>inferiores<br>à 5mcg/mL. | EV: 50 mL<br>SC - administrar puro | Uso imediato | EV: 30 min<br>SC: alternando<br>sítios de<br>aplicação                    | NÃO                                                                                | Incompatível com<br>SF 0,9%.<br>Para concentrações<br>entre 5 e 15 mcg/mL,<br>deverá ser<br>adicionado<br>Albumina Humana<br>para infusão de uma<br>solução final de<br>2mg/mL                                                  |
| 18384       | Fitomenadiona<br>10mg/mL<br>(ampola 1mL)<br>HYPOFARMA                     | IM<br>SC<br>EV* | 0,4 mg/kg a<br>1mg ao<br>nascido                                           | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                                                         | 50 a 200mL                         | Uso imediato | EV 1mg/min<br>Infusão<br>1mg/min<br><br>Na infusão EV<br>proteger a bolsa | NÃO                                                                                | PROTEGER DA LUZ O<br>TEMPO TODO<br>A via EV deve ser<br>restrita a situações<br>em que outra via não<br>é possível e o alto                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 42/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                | Via de Adm | Dose Usual                         | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                             |                                                   |                                                                                                         | Ajuste Renal                                                                     | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                       |            |                                    | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração    | Estabilidade                                      | Tempo de Administração                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                         |
|             |                                                |            |                                    |                |              |                 |                             |                                                   | de infusão com papel alumínio ou outro material opaco (não há necessidade de utilizar equipo especial). |                                                                                  | risco envolvido é justificável. O álcool benzílico como conservante têm sido associados à toxicidade em recém-nascidos. |
| 151041      | Fluconazol 200mg (bolsa-100mL) CRISTÁLIA       | EV         | 200 a 400mg<br>Dose máx: 800mg/dia | NA             | NA           | Pronto para uso | Concentração Máxima: 2mg/mL | Manter na embalagem original até o momento do uso | EV: Não exceder 10mL/min                                                                                | ClCr: ≤ 50mL/min: 50% da dose recomendada<br>Hemodiálise: 100% após cada diálise | Deve ser usado com cautela em pacientes com disfunção renal e hepática ou hepatotoxicidade.                             |
| 138363      | Flumazenil 0,1mg/mL (ampola 5mL) UNIÃO QUÍMICA | EV         | 0,1 a 2mg                          | NA             | NA           | SF 0,9% SG 5%   | Puro ou diluído             | 24h TA                                            | EV direto 15 a 30 segundos                                                                              | NÃO                                                                              | <b>Antagonista Benzodiazepínico.</b><br>Administrar em veias de grosso calibre.                                         |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 43/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                                                                                                                               | Via de Adm | Dose Usual                                                                                               | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                          |                                      |                                                                                                                          | Ajuste Renal                                                                                                                                    | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                          | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                         | Tempo de Administração                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15156       | FOSFATO Ácido de Potássio 2mEq/mL.<br><br>1mL da solução = 2mEq de K + 2mEq (2mmol) de fosfato (1,1mmol de fósforo)<br>1ampola = 20mEq de K + 20mEq (20mmol) de fosfato (11mmol de fósforo) (ampola 10mL) VMG | EV         | Em mMol: 0,15mMol de fósforo/kg/dia<br><br>Em mEq: 5 a 20mEq de fósforo/kg/dia                           | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Mínimo de 250mL          | Uso imediato                         | Infusão 2h ou mais;<br>Se administrar por acesso venoso central, taxa de infusão máxima é de 1 ampola (10mL) em 1h20min. | NÃO                                                                                                                                             | Administrar somente após a diluição. Fosfatos são incompatíveis em soluções contendo Magnésio ou Cálcio. Soluções contendo outros cátions como ferro e alumínio podem igualmente precipitar. A solução deve ser infundida lentamente para evitar intoxicação por fosfato. |
| 15180       | Furosemida 10mg/mL (ampola 2mL) SANTISA                                                                                                                                                                       | EV<br>IM   | 20 a 40mg, podendo ser repetida em intervalos de 2h, de 20mg/dose até obter o efeito desejado (intervalo | NA             | NA           | SF 0,9%          |                          | 24h TA<br>24h TR<br>Protegida da luz | EV lento<br>Não exceder 4mg/min.                                                                                         | Em pacientes com insuficiência renal grave (creatinina sérica maior que 5mg/dL), recomenda-se não exceder a velocidade de infusão de 2,5mg/min. | A administração IM deve ser restrita a casos excepcionais no quais a administração VO ou EV não são possíveis, não sendo adequada ao tratamento de condições agudas como edema pulmonar.                                                                                  |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 44/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                        | Via de Adm | Dose Usual         | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                   |                                                   |                        | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                               |            |                    | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração          | Estabilidade                                      | Tempo de Administração |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|             |                                                        |            | usual é de 6-12h). |                |              |                 |                                   |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| 406164      | Ganciclovir<br>1mg/mL<br>(bolsa 250mL)<br>HALEX ISTAR  | EV         | 5mg/kg, a cada 12h | NA             | NA           | Pronto para uso | Concentração<br>Máxima:<br>1mg/mL | Manter na embalagem original até o momento do uso | EV: 60 min             | ClCr: ≥70mL/min<br>5mg/kg, 12/12h<br>50-69mL/min<br>2,5mg/kg, 12/12h<br>24-49mL/min<br>2,5mg/kg, 1 vez/dia<br>10-24mL/min<br>1,25mg/kg, 1 vez/dia<br>≤10mL/min<br>1,25mg/kg, 3 vezes/semana após hemodiálise | Medicamento pronto para uso e seguro para administração.<br><br>Utilizar procedimentos adequados para manuseio e descarte de quimioterapia. |
| 407408      | Ganciclovir<br>1 mg/mL<br>(bolsa 100mL)<br>HALEX ISTAR | EV         | 5mg/kg, a cada 12h | NA             | NA           | Pronto para uso | Concentração<br>Máxima:<br>1mg/mL | Manter na embalagem original até o momento do uso | EV: 60 min             | ClCr: ≥70mL/min<br>5mg/kg, 12/12h<br>50-69mL/min<br>2,5mg/kg, 12/12h<br>24-49mL/min<br>2,5mg/kg, 1 vez/dia<br>10-24mL/min<br>1,25mg/kg, 1 vez/dia<br>≤10mL/min<br>1,25mg/kg, 3 vezes/semana após hemodiálise | Medicamento pronto para uso e seguro para administração.<br><br>Utilizar procedimentos adequados para manuseio e descarte de quimioterapia. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 45/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFOD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                         | Via de Adm | Dose Usual                 | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                           |                  |                                                                   | Ajuste Renal                                                                                                                         | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                                |            |                            | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                  | Estabilidade     | Tempo de Administração                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 15202       | Gentamicina 40mg/mL (ampola 2mL) SANTISA                                                                | EV<br>IM   | 5mg/kg/dia<br>1 vez ao dia | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 - 200mL<br>Concentração máx:<br>1mg/mL | 24h TA<br>24h TR | Infusão:<br>30 min a 2h<br>EV direto:<br>2 a 3min                 | ClCr > 70: de 8/8h;<br>ClCr 35-70: 12/12h;<br>ClCr 24-34: 18/18h;<br>ClCr 16-23: 24/24h;<br>ClCr 10-15: 36/36h;<br>ClCr 5-9: 48/48h; | Administrar com intervalo de 1h entre Penicilinas ou Cefalosporinas. Não deve ser misturado a outros medicamentos.                                     |
| 289144      | Glicerofosfato de Sódio 216mg/mL (frasco-ampola - 20mL)<br>1mmol de fosfato = 31mg de fósforo FRESENIUS | EV         | 10 a 20 mmol 1x/dia        | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 20mL em 100mL<br>SF 0,9% OU SG 5%.        | 24h TA           | Infusão não deve ser inferior a 8h                                | Insuficiência renal: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar                                                                   | 1mg de fósforo = 0,032mmol de fosfato                                                                                                                  |
| 289000      | Glicose 25% (ampola 10mL) 250mg/mL EQUIPLEX                                                             | EV         | ACM                        | NA             | NA           | Puro ou diluído  | Concentração máx. em 12,5%                | NA               | EV lenta<br>Taxa de infusão máxima 0,5 g/kg de peso corporal/hora | NÃO usar em casos de insuficiência renal                                                                                             | O ideal é que a solução de infusão seja de 7mg/kg/min<br>Em emergências, doses EV em bolus de 25% têm sido usadas perifericamente em bebês e crianças. |
| 15334       | Glicose 50% (ampola 10mL) 500mg/mL                                                                      | EV         | ACM                        | NA             | NA           | Puro ou diluído  | Concentração máx. em 12,5%                | NA               | EV lenta<br>Taxa de infusão máxima 0,5 g/kg                       | NÃO usar em casos de insuficiência renal                                                                                             | O ideal é que a solução de infusão seja de 7mg/kg/min<br>Em emergências,                                                                               |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 46/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                  | Via de Adm | Dose Usual                                                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                             |                                                                                           |                                                                                    | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                         |            |                                                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                    | Estabilidade                                                                              | Tempo de Administração                                                             |              |                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                  |            |                                                                                   |                |              |                  |                                             |                                                                                           | de peso corporal/hora                                                              |              | doses EV em bolus de 50% têm sido usadas perifericamente em adolescentes e adultos.                                                                                            |
| 15342       | Gluconato de Calcio 10%<br>100mg/mL = 0,46mEq/mL<br>(ampola 10mL)<br>HALEX ISTAR | EV         | 970mg a 2.000mg                                                                   | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 100 mL                                      | 24h TA                                                                                    | Infusão lenta 1,5 mL/min<br>Infusão intermitente 200 mg/min<br>60 min              | NÃO          |                                                                                                                                                                                |
| 15423       | HaloPERidol 5mg/mL (USO IM)<br>(ampola 1mL)<br>UNIÃO QUIMICA                     | IM<br>EV*  | 2 a 5mg, repetindo a cada hora ou de 4 a 8h                                       | NA             | NA           | SG 5%<br>SF 0,9% | 1-3 mg/mL (SG5%)<br>0,5-0,75mg/mL (SF 0,9%) | NA                                                                                        | EV lento Infusão contínua 2-25mg/h (máx: 40mg/h)                                   | NÃO          | *A administração EV e Infusão contínua é off-label. Não é recomendado. Monitorar com eletrocardiograma.                                                                        |
| 15431       | Heparina 5.000UI/mL (frasco-ampola 5mL)<br>BLAU FARMACEUTICA S.A.                | EV<br>SC*  | 5.000UI, após 25.000UI em 24h, de acordo com TTPa. Dose de manutenção: 18UI/kg/h. | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Concentração Máx: 100 UI/mL                 | 24 h TA<br>Inverter a bolsa a cada 4 h a fim de evitar aglomeração de heparina na solução | Bolus: infusão acima de 10 min<br><br>Infusão intermitente ou contínua se diluída. | NÃO          | Antídoto: Protamina.<br><br>*Não se recomenda o uso da Heparina 5 mL por via SC, devido a presença de álcool benzílico na composição, que pode gerar efeito adverso por via de |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                   |  |                             |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                            |  | MA.UFCLI.001 – Página 47/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGRD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                   |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                        | Via de Adm | Dose Usual                                                                                            | RECONSTITUIÇÃO |               | DILUIÇÃO                    |                                         |               |                                                                           | Ajuste Renal                                                                                                           | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                               |            |                                                                                                       | Tipo e Volume  | Estabilidade  | Tipo da solução             | Volume e/ou Concentração                | Estabilidade  | Tempo de Administração                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|             |                                                        |            |                                                                                                       |                |               |                             |                                         |               |                                                                           |                                                                                                                        | administração diferente da recomendada.                                                                                                            |
| 16349       | Heparina 5.000UI/0,25mL CRITALIA                       | SC         | 5.000 UI a cada 12 ou a cada 8h                                                                       | NA             | NA            | NA                          | NA                                      | NA            | NA                                                                        | NÃO                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 15458       | HidraLAZINA 20mg/mL (ampola 1mL) CRISTALIA             | EV IM      | Doses iniciais de 1 a 10mg. Pode ser repetida, após um intervalo de 20 a 30 min Dose máx.: 40 mg/dose | NA             | NA            | SF 0,9 %                    | 1 ampola em 9 mL Concentração de 2mg/mL | Uso imediato  | EV lento Infusão contínua 50 a 300mcg/min.                                | CICr < 30 mL/min ou Concentração sérica de creatinina maior que 2,5 mg/100 mL ou 221 micromol/L ou disfunção hepática. | Na insuficiência renal: a dose ou o intervalo de dose devem ser adaptados de acordo com a resposta clínica para evitar acúmulo da substância ativa |
| 15474       | Hidrocortisona 100mg (frasco-ampola) UNIÃO QUIMICA     | EV IM      | 100 a 500mg a cada 2h, 4h ou 6h                                                                       | 2mL AD         | 24h TA 72h TR | SF 0,9% SG 5%               | Concentração Máx: 50mg/mL               | 24h TA 72h TR | Puro: EV direto (30 segs.) Diluído: 10 min                                | NÃO                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 15482       | Hidrocortisona 500mg (frasco-ampola) BLAU FARMACEUTICA | EV IM      | ADULTOS: 100 a 500mg a cada 2h, 4h ou 6h                                                              | 4mL AD         | 24h TA 72h TR | SF 0,9% SG 5% 500 a 1.000mL | Concentração. Máx: 50mg/mL              | 24h TA 72h TR | EV direto puro 30 segs. (≤ 100mg) e 10 min (≥ 500mg) Infusão 0,1 a 1mg/mL | NÃO                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 48/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                       | Via de Adm | Dose Usual                                                                                  | RECONSTITUIÇÃO           |                 | DILUIÇÃO         |                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                              |            |                                                                                             | Tipo e Volume            | Estabilidade    | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração             | Estabilidade                                                                                                                                       | Tempo de Administração                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18708       | Imipenem 500mg + Cilastatina 500 mg (frasco-ampola) ACS / ABL         | EV         | 500 a 1.000mg (Imipenem) a cada 6h<br>Dose máx: 4.000mg/dia ou 50mg/kg/dia                  | 10mL<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 4h TA<br>24h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | Completar para 100mL<br>2,5 a 5mg/mL | 4h TA<br>24h TR<br>Pode ocorrer precipitação após diluição em SF 0,9% e armazenado sob refrigeração, condição normal e reversível ao atingir a TA. | Infusão 20 a 30 min ( $\leq 500\text{mg}$ )<br>40 a 60 min ( $> 500\text{mg}$ )<br>Infusão prolongada 3h | Tanto a Cilastatina quanto o Imipenem são removidos da circulação durante a hemodiálise.<br><br>O paciente deve receber após a hemodiálise e a cada 12h a partir do final da sessão de hemodiálise. | A velocidade de infusão deve ser diminuída se o paciente apresentar náuseas. Infusão prolongada tem maior probabilidade de ser eficaz e pode oferecer benefício clínico em pacientes com infecções graves ou patógenos menos suscetíveis. |
| 19208       | Imunoglobulina ANTIHEPATITE B 1.000UI/5mL (frasco-ampola) SUS GRIFOLS | IM         | Abuso Sexual: 0,06mL/kg<br>Dose máxima: 5 mL<br>Mãe com EXAME HBSG POSITIVO: 0,5mL (100 UI) | NA                       | NA              | NA               | NA                                   | NA                                                                                                                                                 | NA                                                                                                       | NA                                                                                                                                                                                                  | Após abertura do frasco, uso imediato                                                                                                                                                                                                     |
| 274025      | Imunoglobulina ANTIHEPATITE B                                         | IM         | Abuso Sexual: 0,06mL/kg                                                                     | NA                       | NA              | NA               | NA                                   | NA                                                                                                                                                 | NA                                                                                                       | NA                                                                                                                                                                                                  | Após abertura do frasco, uso imediato                                                                                                                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 49/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                                   | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |                                       |                        | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                     |            |                                                                              | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                          | Tempo de Administração |              |                                                                                                                                                                                                                 |
|             | (Recém-nascido)<br>100UI/0,5mL<br>(frasco-ampola)<br>SUS<br>GRIFOLS          |            | Dose máxima:<br>5 mL<br>Mãe com<br>EXAME HBSG<br>POSITIVO:<br>0,5mL (100 UI) |                |              |                 |                          |                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15636       | Imunoglobulina ANTITETANICA 250UI/mL (frasco-ampola) SUS CSL BEHRING         | IM         | 250 UI/mL                                                                    | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA                                    | USO IMEDIATO           | NA           | A administração de imunoglobulina pode prejudicar a eficácia de vacinas de vírus vivos atenuados como as vacinas contra o sarampo, a rubéola, a caxumba e a varicela/catapora por um período de até três meses. |
| 142905      | Imunoglobulina ANTITIMÓCITOS humanos (coelho); 25 mg (frasco-ampola) GENZYME | EV         | Dosagem depende da indicação proposta                                        | 5mL AD         | 24H TA       | SF 0,9% SG 5%   | Até 4 mg/mL              | 24h TA (incluindo o tempo de infusão) | 4 a 24h Em AVC         | NA           | MEDICAMENTO TERMOLÁBEL<br>Uso em veia de grande calibre e alto fluxo: monitore atentamente durante a infusão e por pelo menos 24 horas após                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                 |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                          | MA.UFCLI.001 – Página 50/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                 | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                           | Via de Adm | Dose Usual                  | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                                                                                                                                                      | Ajuste Renal                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                  |            |                             | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                           |            |                             |                |              |                 |                          |              |                                                                                                                                                      |                                     | a infusão para detectar anafilaxia.                                                                                                                                    |
| 15652       | Imunoglobulina Humana ANTI RhO (D) 150mcg/mL (seringa 2mL) CSL BOEHRINGER | EV<br>IM   | 300mcg                      | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | Administrar dentro das 72h após o parto, aborto ou transfusão de sangue incompatível. Manter a paciente em observação por 20 min após administração. | NÃO                                 | Manter a seringa preenchida embalada SOB REFRIGERAÇÃO e protegida da luz. Aguardar o medicamento atingir a temperatura ambiente ou do corpo antes de ser administrado. |
| 102849      | Imunoglobulina G HUMANA 50mg/mL (frasco-ampola 100mL) OCTAPHARMA          | EV         | 1.000 a 2.000mg/kg, 1x/dia. | NA             | NA           | NA              | NA                       | Uso imediato | EV<br>1 mL/kg/h por 30 min até no máximo 5 mL/kg/h                                                                                                   | ClCr menor que 10 usar com cautela. | Armazenar sob refrigeração. O produto deve se encontrar em temperatura ambiente ou corporal antes da infusão.                                                          |
| 404682      |                                                                           |            |                             |                |              |                 |                          |              |                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                        |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 51/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                             | Via de Adm                                                                | Dose Usual                                                                     | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                                                                                   |              |                                                                            | Ajuste Renal                                                                                                                                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                    |                                                                           |                                                                                | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração                                                                          | Estabilidade | Tempo de Administração                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 83305       | Insulina NPH 100UI/mL (frasco-ampola 10mL) NOVO NORDISK     | SC<br>Parte superior dos braços, coxas, nádegas ou no abdome (alternados) | A dose deve ser individualizada de acordo com as necessidades de cada paciente | NA             | NA           | NA              | NA                                                                                                | NA           | NA                                                                         | As necessidades de insulina podem ser reduzidas devido a alterações na depuração ou no metabolismo da insulina; monitore a glicemia de perto | Agitar o frasco com movimentos rotativos antes de cada aplicação. Após suave agitação, o conteúdo deve ser turvo ou leitoso. Não administrar caso apresente grumos suspensos ou no fundo do frasco. Frascos fechados, deverá ser armazenado sob TR. Frascos após aberto, poderá ser mantido em TA longe do calor e luz solar por 6 semanas. Não deve ser EV e IM |
| 13307       | Insulina REGULAR 100UI/mL (frasco-ampola 10mL) NOVO NORDISK | EV<br>IM<br>SC                                                            | A dose deve ser individualizada de acordo com as necessidades                  | NA             | NA           | SF 0,9%         | 0,05 a 1,0 UI/mL Saturar o equipo com insulina por 30 min antes da infusão para evitar a adsorção | 24h TA       | EV contínuo<br><br>Trocar a solução e todo o conjunto pelo menos a cada 6h | CICr 10-50 ml/min 75% da dose<br>CICr menor que 10ml/min 50% da dose                                                                         | Agitar o frasco com movimentos rotativos antes de cada aplicação. Após suave agitação, o conteúdo deve ser turvo ou leitoso. Não                                                                                                                                                                                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 52/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                     | Via de Adm                         | Dose Usual                      | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                        | Ajuste Renal                              | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                            |                                    |                                 | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                     |                                    | de cada paciente                |                |              |                 |                          |              |                        |                                           | administrar caso apresente grumos suspensos ou no fundo do frasco. Frascos fechados, deverá ser armazenado sob TR. Frascos após aberto, poderá ser mantido em TA longe do calor e luz solar por 6 semanas. Trocar a solução e todo o conjunto pelo menos a cada 6h, em razão da precipitação e perda de efetividade. |
| 11649       | Ioexol (Contraste não iônico) 350mg/mL (frasco 100mL) GE HEALTHCARE | VO<br>EV<br>INTRA<br>CAVIT<br>ÁRIO | Posologia de acordo com exames. | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | NA                     | Insuficiência renal: Utilizar com cautela | Deve ser conservado em temperatura ambiente, protegido da luz e não deve ser congelado. Medicamento vesicante: Os pacientes devem ser bem hidratados                                                                                                                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 53/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                        | Via de Adm                                                  | Dose Usual                                               | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                                                   |              |                           | Ajuste Renal                                                                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                               |                                                             |                                                          | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração                                          | Estabilidade | Tempo de Administração    |                                                                              |                                                                                                                                          |
|             |                                                                        |                                                             |                                                          |                |              |                 |                                                                   |              |                           |                                                                              | antes e durante a administração devido à nefrotoxicidade.                                                                                |
| 405716      | Levobupivacaína 0,5% SEM VASOCONSTRITOR (frasco-ampola 20mL) CRISTÁLIA | Infiltração; Bloqueio nervoso; Anestesia Caudal e peridural | 50 a 150mg<br>Dose máx: doses peridurais de até 375mg.   | NA             | NA           | SF 0,9%         | Concentração de 0,625 a 2,5mg/mL<br>Concentração máxima: 2,5mg/mL | 24h TA       | NA                        | NÃO foram conduzidos estudos especiais em pacientes com insuficiência renal. | Não indicado para raquianestesia. É incompatível com soluções alcalinas com pH superior a 8,5.                                           |
| 248622      | Levofloxacino 5 mg/mL (bolsa-100mL) ISTAR CRISTÁLIA HALEX              | EV                                                          | 250mg, 500mg ou 750mg a cada 24 h<br>Dose máx: 750mg/dia | NA             | NA           | NA              |                                                                   | Uso imediato | Infusão lenta 60 a 90 min | SIM                                                                          | A solução contém SG 5%.<br>Atenção para diabéticos.<br>Manter paciente bem hidratado para evitar cristalúria. Deve ser armazenado em sua |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 54/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                    | Via de Adm                                  | Dose Usual                                                                                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                        | Ajuste Renal                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                           |                                             |                                                                                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                    |                                             |                                                                                                                   |                |              |                 |                          |              |                        |                               | embalagem original até o momento do uso, e conservado em TA protegido da luz.                                                                                                                       |
| 198668      | Lidocaína 2% + Epinefrina 1:200.000 (carpule 1,8mL) CRISTÁLIA      | EV ANES TESSIA LOCO RREGI ONAL              | Anestesia terminal: 1mL. Bloqueio: 1,5 a 1,8mL. Cirurgia: 3 a 5mL.                                                | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           |                        | Monitorar e usar com cautela. |                                                                                                                                                                                                     |
| 16330       | Lidocaína 2% + Epinefrina 1:200.000 (frasco-ampola 20mL) CRISTÁLIA | EV ANES TESSIA LOCO RREGI ONAL PERC UTÂN EA | Peridural: 2 a 3mL. Dose máx: adultos: 7mg/kg, a dose máxima não deve exceder 500mg Analgesia peridural: até 20mL | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | EV lento               | Monitorar e usar com cautela  | Não deve ser autoclavado por calor úmido e/ou seco. Devem ser administradas lentamente com aspiração frequente para evitar injeção intravascular acidental rápida que pode produzir efeitos tóxicos |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 55/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                  | Via de Adm                 | Dose Usual                                                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                                     |                                                 |              |                                                                                 | Ajuste Renal                 | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                         |                            |                                                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                                              | Volume e/ou Concentração                        | Estabilidade | Tempo de Administração                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 289134      | Lidocaína 2% + NOREpinefrina 5 mcg/mL (tubete 1,8mL) CRISTÁLIA   | EV ANESTESIA LOCORREGIONAL | Anestesia terminal<br>Bloqueio: 1,5 a 1,8mL<br>Cirurgia: 3 a 5mL<br>Dose máx.: 7mg/kg. | NA             | NA           | NA                                                                           | NA                                              | NA           | EV lento                                                                        | Monitorar e usar com cautela |                                                                                                                                                                                                                  |
| 218456      | Lidocaína 2% SEM VASOCONSTRITOR (ampola 5mL) Isobárica HYPOFARMA | EV ANESTESIA LOCORREGIONAL | 1 a 1,5 mg/kg<br>Dose máx: 4,5 mg/kg<br><br>IM: 4 mg/kg                                | NA             | NA           | SG 5%<br>Diluentes que contêm sódio podem afetar a efetividade da Lidocaína. | 1 - 2 g de Lidocaína para 1.000mL de SG 5%      | 24h TA       | EV contínuo: 1 a 4 mg/min<br>EV direta: 200 a 300mg em 1h                       | Monitorar e usar com cautela | NÃO ESTÁ INDICADO PARA RAQUIANESTESIA. Quando grandes volumes são necessários, somente soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto naqueles casos em que os fármacos vasopressores são contraindicados. |
| 16489       | Lidocaína 2% (20mg/mL) SEM VASOCONSTRITOR (frasco-ampola)        | EV PERCUTÂNEA              | 5 - 300mg antiarrítmico : 1mg/kg e 1 a 4mg/min<br>Dose máx:                            | NA             | NA           | SG 5%<br>Diluentes que contêm sódio podem afetar a                           | Infusão contínua<br>Concentração máxima: 2mg/mL | 24h TA       | 25 a 50mg/min<br>Infusão contínua: 1 a 4mg/min adultos<br>50mcg/kg/min crianças | Monitorar e usar com cautela | NÃO ESTÁ INDICADO PARA RAQUIANESTESIA. Quando grandes volumes são necessários, somente                                                                                                                           |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 56/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                       | Via de Adm                     | Dose Usual                                                                            | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                                     |                          |                                                                                                            |                            | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                              | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                              |                                |                                                                                       | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                                              | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                                                                                               | Tempo de Administração     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 20mL)<br>UNIÃO QUIMICA                                |                                | 4,5mg/kg ou<br>300mg                                                                  |                |              | efetividade da Lidocaína.                                                    |                          |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                           | soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto naqueles casos em que os fármacos vasopressores são contraindicados.                                                                                            |
| 402093      | Lidocaína 2%<br>20 mg/mL (tubete)<br>1,8 mL CRISTÁLIA | EV<br>PERC<br>UTÂN<br>EA<br>IO | Anestesia terminal<br>Bloqueio: 1,5 a 1,8mL<br>Cirurgia: 3 a 5mL<br>Dose máx.: 4mg/kg | NA             | NA           | SG 5%<br>Diluentes que contêm sódio podem afetar a efetividade da Lidocaína. | NA                       | NA                                                                                                         | Em bolus;<br>25 a 50mg/min | Monitorar e usar com cautela                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 270058      | Linezolida<br>2mg/mL (bolsa 300mL)<br>EUROFARMA       | EV                             | 400-600mg a cada 12 horas.                                                            | NA             | NA           | NA                                                                           | NA                       | Uso imediato<br><br>Manter a bolsa protegida da luz dentro da sobrebolsa aluminizada até o momento do uso. | 30 a 120 min               | ClCr 40 a <130mL/minuto: Não é necessário ajuste<br>ClCr < 40 mL/minuto: Não é necessário ajuste de dose.<br>Como aproximadamente 30% da dose é removida durante 3h de hemodiálise, a Linezolida deve ser | Com base em simulações de Monte Carlo, em pacientes clinicamente estáveis com ClCr < 30 mL/minuto e um curso de tratamento previsto > 10 dias, alguns especialistas sugerem reduzir a dose para 300 mg duas vezes ao |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 57/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                     | RECONSTITUIÇÃO     |                               | DILUIÇÃO             |                          |                 |                                                                                                                                                  | Ajuste Renal                                                                                                                                                                    | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                     |            |                                                                                                                                                | Tipo e Volume      | Estabilidade                  | Tipo da solução      | Volume e/ou Concentração | Estabilidade    | Tempo de Administração                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|             |                                              |            |                                                                                                                                                |                    |                               |                      |                          |                 |                                                                                                                                                  | administrada após a sessão de diálise. Em pacientes com insuficiência renal, monitorar eventos adversos hematopoiéticos e neuropáticos ao administrar por períodos prolongados. | dia após 72 horas com monitoramento terapêutico do medicamento para reduzir o risco de trombocitopenia                                                                           |
| 15938       | Manitol 20%, 200mg/mL (frasco 250mL) SANOBOL | EV<br>VO   | Redução da pressão intraocular e intracraniana :<br>1,5 a 2,0 g/kg (7,5 a 10mL/Kg)<br><br>Diurético: 200mg/kg<br><br>Colonoscopia : 500mL (VO) | NA                 | NA                            | EV: puro<br>VO: suco | NA                       | NA              | Pressão intraocular e intracraniana: 30 a 60 minutos<br><br>Inspecionar presença de cristais antes da administração. Utilizar equipo com filtro. | Contraindicado na insuficiência renal grave. Utilizar com cautela em pacientes com injúria renal                                                                                | Medicamento vesicante. Em soluções cristalizadas, recomenda-se o aquecer em banho-maria a 60 – 80°C e agitar. Não usar micro-ondas, devido risco de explosão. Administrar em TA. |
| 218480      | Meropenem 1.000mg                            | EV         | 500mg a 2.000mg a cada 8h                                                                                                                      | 20mL AD<br>50mg/mL | 3h TA<br>16h TR<br>Eurofarma/ | SF 0,9%<br>SG 5%     | 100mL<br>1 a 20mg/mL     | 3h TA<br>15h TR | Bolus: 5 min<br>Infusão: 15 a 30 min                                                                                                             | SIM<br>eliminado através da                                                                                                                                                     | Medicamento tempo-dependente. Apresenta melhoras                                                                                                                                 |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 58/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                                             | RECONSTITUIÇÃO        |                                                                                                 | DILUIÇÃO         |                          |                                                                                                                                   |                                                                                       | Ajuste Renal                                                                                                                                            | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                     |            |                                                                                        | Tipo e Volume         | Estabilidade                                                                                    | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                                                                                                                      | Tempo de Administração                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|             | (frasco-ampola)<br>ABL<br>EUROFARMA<br>BIOCHIMICO            |            | Dose máx:<br>2.000mg a<br>cada 8h<br>(6.000mg/dia )                                    |                       | Eugia<br><br>ABL –<br>Imediato<br>1h TA<br>2h TR<br>Biochimico                                  |                  |                          | (SF 0,9%)<br>Imediato<br>(SG 5%)<br>Eurofarma/<br>Eugia<br>Imediato<br>ABL<br><br>1h TA<br>2h TR<br>Biochimico                    | <b>Infusão<br/>prolongada:<br/>3 horas</b>                                            | hemodiálise e<br>hemofiltração.<br>ClCr 26–50 mL/min:<br>1 dose a cada 12h;<br>10–25 mL/min:<br>½ dose a cada 12h;<br><10 mL/min: ½ dose a<br>cada 24h. | resultados em<br>pacientes críticos<br>com a infusão em<br>3 horas.                                                            |
| 213780      | Meropenem<br>500 mg<br>(frasco-ampola)<br>EUROFARMA<br>EUGIA | EV         | 500mg a<br>2.000mg a<br>cada 8h<br>Dose máx:<br>2.000mg a<br>cada 8h<br>(6.000mg/dia ) | 10mL<br>AD<br>50mg/mL | 3h TA<br>16h TR<br>Eurofarma/<br>Eugia<br><br>ABL –<br>Imediato<br>1h TA<br>2h TR<br>Biochimico | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL<br>1 a 20mg/mL     | 3h TA<br>15h TR<br>(SF 0,9%)<br>Imediato<br>(SG 5%)<br>Eurofarma/<br>Eugia<br>Imediato<br>ABL<br><br>1h TA<br>2h TR<br>Biochimico | Bolus: 5 min<br>Infusão: 15 a 30<br>min<br><b>Infusão<br/>prolongada:<br/>3 horas</b> | ClCr 26–50 mL/min: 1<br>dose a cada 12h; 10–<br>25 mL/min: ½ dose a<br>cada 12h; <10<br>mL/min: ½ dose a<br>cada 24h.                                   | Medicamento tempo-<br>dependente.<br>Apresenta melhoras<br>resultados em<br>pacientes críticos<br>com a infusão em 3<br>horas. |
| 138932      | Metaraminol,<br>Hemitartarato<br>10mg/mL                     | EV<br>IM   | IM: 2 a 10mg<br>EV: 15 a<br>100mg                                                      | NA                    | NA                                                                                              | SF 0,9%<br>SG 5% | 500mL                    | 24h TA                                                                                                                            | A velocidade de<br>infusão deve ser<br>ajustada para                                  | NÃO                                                                                                                                                     | A via SC não é<br>recomendada, devido<br>a aumento do risco                                                                    |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                          |                             |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                   | MA.UFCLI.001 – Página 59/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGRD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                          | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                        | Via de Adm     | Dose Usual                                         | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                                                | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                               |                |                                                    | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | (ampola 1mL)<br>CRISTÁLIA                                              |                |                                                    |                |              |                 |                          |              | manter a pressão no nível desejado.            |              | de necrose tecidual local e descamação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16055       | Metilergometrina, Maleato<br>0,2mg/mL<br>(ampola 1mL)<br>UNIÃO QUÍMICA | EV<br>IM<br>SC | 0,1 - 0,2 mg a cada 2 - 4h<br>Dose máx:<br>5 doses | NA             | NA           | NA              | NA                       | NA           | IM recomendada.<br>EV lento maior que 1 minuto | NÃO          | A administração EV não é recomendada devido ao potencial de desenvolvimento de hipertensão súbita e acidente vascular cerebral. No entanto, se a administração EV for considerada como uma medida essencial para salvar a vida, uma dose usual de 0,2mg deve ser administrada lentamente ao longo de pelo menos 1 minuto, com monitorização cuidadosa da pressão arterial |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 60/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                   | Via de Adm | Dose Usual                                               | RECONSTITUIÇÃO           |              | DILUIÇÃO                       |                                              |              |                                                                           | Ajuste Renal                                                                                      | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                          |            |                                                          | Tipo e Volume            | Estabilidade | Tipo da solução                | Volume e/ou Concentração                     | Estabilidade | Tempo de Administração                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 106496      | Metilprednisolona Succinato 125mg (frasco-ampola) + diluente BLAU | EV<br>IM   | 30mg/kg, a cada 4 ou 6h<br><br>Pulsoterapia: 1.000mg/dia | 2 mL do diluente próprio | Imediato     | SF 0,9%<br>SG 5%               | 20mL ou 50mL<br>Concentração máxima 125mg/mL | 48h em TA    | 125mg 3 a 25min<br>250mg 15 a 30 min<br>500 30 a 60 min<br>1.000mg: 60min | NÃO<br><br>Os corticosteroides devem ser usados com cautela em pacientes com insuficiência renal. | Não administrar doses moderadas ou altas em push devido ao risco de eventos adversos, tais como hipotensão e arritmia cardíaca.<br><br>Para pulsoterapia recomenda-se infusão em 4h. |
| 16420       | Metilprednisolona Succinato 500mg (frasco-ampola) + diluente BLAU | EV<br>IM   | 30mg/kg, a cada 4 ou 6h<br><br>Pulsoterapia: 1.000mg/dia | 8 mL do diluente próprio | Imediato     | SF 0,9%<br>SG 5%               | 20mL ou 50mL<br>Concentração máxima 125mg/mL | 48h em TA    | 125mg 3 a 25min<br>250mg 15 a 30 min<br>500 30 a 60 min<br>1.000mg: 60min | NÃO<br><br>Os corticosteroides devem ser usados com cautela em pacientes com insuficiência renal. | Não administrar doses moderadas ou altas em push devido ao risco de eventos adversos, tais como hipotensão e arritmia cardíaca.<br><br>Para pulsoterapia recomenda-se infusão em 4h. |
| 16101       | MetoCLOPRAMida 5mg/mL (ampola 2mL) FARMACE                        | EV<br>IM   | 10mg a cada 8h                                           | NA                       | NA           | SF 0,9% (preferência)<br>SG 5% | 50mL                                         | 24h em TA    | Infusão 15 a 30 min                                                       | ClCr menor que 40mL/min, reduzir a dose em 50%                                                    | A administração EV rápida pode estar associada a uma sensação transitória (mas intensa) de ansiedade e                                                                               |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                 |  |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                          |  | MA.UFCLI.001 – Página 61/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                 |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                     | Via de Adm     | Dose Usual                                          | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                      |                            |                                                                                 | Ajuste Renal                                                                             | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                            |                |                                                     | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração             | Estabilidade               | Tempo de Administração                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                     |                |                                                     |                |              |                  |                                      |                            |                                                                                 |                                                                                          | inquietação, seguida de sonolência.                                                                                                                                                                      |
| 142964      | MetoPROLOL, Tartarato 1mg/mL (ampola 5mL) CRISTALIA | EV             | 1,25 a 5mg a cada 6 ou 12h<br>Dose máxima: 15mg/dia | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro (1mg/mL) ou Diluído (0,04mg/mL) | 24h TA<br>Protegido da Luz | EV<br>1 min<br>Infusão lenta 30 a 60 min                                        | NÃO                                                                                      | Deve-se manter a ampola protegida da luz.                                                                                                                                                                |
| 16560       | Metotrexato 25mg/mL (frasco-ampola 2mL) BLAU        | EV<br>IM<br>IT | Doses variadas para uso oncológico e não oncológico | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Máximo 25 mg/mL                      | Uso imediato               | EV lento 10 mg/min<br>Infusão contínua de 24 h<br>Utilizar equipo fotossensível | ClCr de 10-50 a 60mL/min reduzir a dose 50%.<br>ClCr menor que 10mL/min NÃO administrar. | Medicamento citotóxico<br>Doses elevadas devem sempre ser administradas com Ácido Fólinico a fim de proteger contra a toxicidade excessiva, além de alcalinização da urina antes e após a administração. |
| 12777       | METRONidazol 5mg/mL                                 | EV             | 500mg a cada 8h                                     | NA             | NA           | Pronto para uso  | NA                                   | Uso imediato               | Infusão: 20 min (5mL/min)                                                       | ClCr: < 10mL/min (não em diálise), considerar                                            |                                                                                                                                                                                                          |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                        |  |                             |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                 |  | MA.UFCLI.001 – Página 62/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                        |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                    | Via de Adm        | Dose Usual         | RECONSTITUIÇÃO                                                    |                                                                  | DILUIÇÃO         |                                  |                                                                                                     |                                                                                                   | Ajuste Renal                                    | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                           |                   |                    | Tipo e Volume                                                     | Estabilidade                                                     | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração         | Estabilidade                                                                                        | Tempo de Administração                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | (bolsa 100mL)<br>B. BRAUN                                          |                   |                    |                                                                   |                                                                  |                  |                                  |                                                                                                     |                                                                                                   | redução de 50% da dose a cada 12 horas          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 287970      | Micafungina 50mg (frasco-ampola)<br>ASTELLAS INTAS PHARMACEUTICALS | EV                | 50mg a 200mg/dia   | 5mL<br>SF 0,9%<br><br>NÃO AGITAR O FRASCO PARA RECONSTITUIR O PÓ. | 48h abaixo de 25°C (Intas)<br><br>24h abaixo de 25 °C (Astellas) | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL (Concentração máx 20mg/mL) | 96h abaixo de 25 °C Protegida da luz (Intas)<br><br>24h abaixo de 25 °C Protegida da luz (Astellas) | 1h<br><br>Infusões mais rápidas podem resultar em reações mediadas por histamina mais frequentes. | Não é dialisável                                | A solução diluída deve ser protegida da luz.<br>Não é necessário cobrir o equipo.<br>Lavar o acesso com SF 0,9% antes da infusão.<br>A bolsa para infusão deve ser suavemente invertida para dispersar a solução, mas NÃO agitada.<br>Contém 200 mg de lactose. |
| 402005      | MIDAzolam 1mg/mL (ampola 5mL)<br>UNIAO QUIMICA                     | EV<br>IM<br>RETAL | 0,01 – 0,1 mg/kg/h | NA                                                                | NA                                                               | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído 0,5mg/mL         | 24h TR                                                                                              | A critério médico                                                                                 | ClCr menor que 10mL/min, reduzir a dose em 50%. | <b>Antagonista:</b><br><b>Flumazenil</b> (usado para reverter a depressão do SNC. Usar com muita cautela).                                                                                                                                                      |
| 168815      | MIDAzolam 5mg/mL (ampola 10mL)                                     | EV                | 0,01 – 0,1 mg/kg/h | NA                                                                | NA                                                               | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído 0,5mg/mL         | 24h TR                                                                                              | A critério médico                                                                                 | ClCr menor que 10mL/min, reduzir a dose em 50%. | <b>Antagonista:</b><br><b>Flumazenil</b> (usado para reverter a                                                                                                                                                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 63/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                 | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                                         | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                        |                              |                                   | Ajuste Renal                                                                                              | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                        |            |                                                                                                                                                                    | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                               | Estabilidade                 | Tempo de Administração            |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|             | UNIAO QUIMICA                                   |            |                                                                                                                                                                    |                |              |                  |                                                        |                              |                                   |                                                                                                           | depressão do SNC. Usar com muita cautela).                                                                                                           |
| 289028      | MIDazolam 5mg/mL (ampola 3 mL)<br>UNIAO QUIMICA | EV         | 0,01 – 0,1 mg/kg/h                                                                                                                                                 | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído 0,5mg/mL                               | 24h TR                       | A critério médico                 | ClCr menor que 10mL/min, reduzir a dose em 50%.                                                           | <b>Antagonista: Flumazenil</b> (usado para reverter a depressão do SNC. Usar com muita cautela).                                                     |
| 288494      | Milrinona 1mg/mL (ampola 10mL)<br>FLUKKA        | EV (lento) | Dose de ataque: 50mcg/kg, durante 10 min. (injeção direta, gota a gota ou bomba de infusão);<br>Dose de manutenção: 0,375 a 0,750mcg/kg / min, em infusão contínua | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 100 - 200 mL<br>Concentração final de 100 a 200 mcg/mL | 24 h a TA<br>Proteger da luz | Infusão contínua 20 mg para 100mL | ClCr 10 mL/min = taxa de infusão de 0,23mcg/kg/min<br>ClCr 30 mL/min = taxa de infusão de 0,33 mcg/kg/min | Monitorar hipotensão durante a dose de ataque. Deve-se manter a ampola protegida da luz. Não misturar com furosemida na mesma linha, pois precipita. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 64/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                  | Via de Adm                            | Dose Usual                                                                                                                                                               | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                          |                                   |                             | Ajuste Renal                           | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                         |                                       |                                                                                                                                                                          | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                      | Tempo de Administração      |                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| 403339      | Mitomicina (frasco-ampola) CITOPHARMA MANIPULADO | EV<br>INTRA<br>VESICA<br>L            | EV: 20 mg/m <sup>2</sup> , em dose única, em intervalos de 6-8 semanas.<br>INTRA<br>VESICA<br>L: 20 - 40mg na Concentração de 1mg/mL, 1 x por semana, durante 8 semanas. | 10mL AD        | 48h TA       | SF 0,9%<br>SG 5% | 20 - 40 mcg/mL (SF 0,9%) | 3h TA (SG 5%)<br>12h TA (SF 0,9%) |                             | NÃO                                    | Seu uso resulta em uma alta incidência de depressão medular, particularmente trombocitopenia e leucopenia.                                                                                       |
| 262463      | Morfina 0,2mg/mL (ampola 1mL) CRISTÁLIA          | EV<br>Intrat<br>ecal<br>Perid<br>ural | Via Peridural: 5mg<br>Via Intratecal: 1:10 da utilizada na via peridural. Recomenda-se iniciar com 0,2 mg<br>Procedimentos                                               | NA             | NA           | NA               | NA                       | NA                                | bolus lentamente<br>Infusão | NÃO<br>NÃO sofre perda na hemodiálise. | <b>A via preferencial da Morfina sem conservantes é intratecal ou peridural.</b><br>Com o uso de neuroléptico aumenta o risco de depressão respiratória. Pode causar: cefaleia, tontura, náusea, |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 65/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                        | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                  | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                                                                           |              |                                                  | Ajuste Renal                                                                                                                                                                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada               |            |                                                                                                                                             | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração                                                                  | Estabilidade | Tempo de Administração                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|             |                                        |            | Obstétricos e Ginecológico s: 0,03 a 0,1 mg via tecal, proporciona alívio satisfatório por até 24h.                                         |                |              |                 |                                                                                           |              |                                                  |                                                                                                                                                                               | vômito, boca seca, apneia, sonolência, retenção urinária e constipação, síncope, taquicardia, hipertensão, entre outros.                                                       |
| 16179       | Morfina 10mg/mL (ampola 1mL) CRISTÁLIA | EV<br>IM   | Bolus: 2,5 - 5mg 4/4h<br>SC: 5mg 4/4h<br>Infusão contínua: 1 mg/h (máx. 10mg/h)<br>Adaptação a ventilação mecânica: 1 - 10mg a cada 1 – 2h. | NA             | NA           | SF 0,9%         | 9mL (1mg/mL)<br>Solução analgésica venosa padronizada: Morfina 10mg/mL (1ampola) em 100mL | 24h TA       | bolus lentamente<br>Infusão contínua: 5 - 35mg/h | Na insuficiência renal leve (ClCr maior que 50mL/min); NÃO é necessário ajuste; na moderada (ClCr 10-50mL/min): 75% da dose; na severa (ClCr menor que 10mL/min): 50% da dose | Deve ser administrada com extremo cuidado em pacientes idosos ou debilitados, na presença de aumento da pressão intraocular/intracraniana e em pacientes com lesões cerebrais. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 66/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                    | Via de Adm                          | Dose Usual                                                                                                                                                               | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                                                                                    |                             |                                  | Ajuste Renal                                                                                                                                                                  | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                           |                                     |                                                                                                                                                                          | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                                                                           | Estabilidade                | Tempo de Administração           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| 189910      | Morfina 1mg/mL (ampola 2mL) CRISTÁLIA              | EV<br>IM<br>Intratecal<br>Peridural | Bolus: 2,5 - 5mg 4/4h<br>SC: 5mg 4/4h<br>Infusão contínua: 1 mg/h (máx. 10mg/h)<br>Adaptação a ventilação mecânica: 1 - 10mg a cada 1 - 2h, Infusão contínua: 5 - 35mg/h | NA             | NA           | SF 0,9%          | 1 mg/mL                                                                                                            | 24h TA                      | bolus lentamente<br>Infusão      | Na insuficiência renal leve (ClCr maior que 50mL/min); NÃO é necessário ajuste; na moderada (ClCr 10-50mL/min): 75% da dose; na severa (ClCr menor que 10mL/min): 50% da dose | Deve ser administrada com extremo cuidado em pacientes idosos ou debilitados, na presença de aumento da pressão intraocular/intracraniana e em pacientes com lesões cerebrais. |
| 116246      | Naloxona 0,4mg/mL (ampola 1mL) HIPOLABOR CRISTALIA | EV<br>IM<br>SC                      | 0,4 a 2mg Depressão pós-operatória por opioide: 0,1 a 0,2 mg, a cada 2 -3 min, até obter ventilação e estado de                                                          | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 1 ampola de 1 mL (0,4 mg/mL) em 9 mL de SF 0,9% (0,04 mg/mL)<br>Infusão Contínua: 1 ampola em 100 mL (0,004 mg/mL) | 24 h TA<br>Protegido da Luz | EV lento<br>Infusão Contínua ACM | NÃO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 67/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                              | Via de Adm     | Dose Usual                                                                                           | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                          |                          |              |                        | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                     |                |                                                                                                      | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                   | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |              |                                                                                                                       |
|             |                                              |                | consciência adequados.                                                                               |                |              |                                   |                          |              |                        |              |                                                                                                                       |
| 17345       | Neostigmina 0,5mg/mL (ampola 1mL) BLAU       | EV<br>IM<br>SC | Atonia intestinal: 0,25 a 0,5mg a cada 4 - 6h<br>Reversão dos efeitos dos curarizantes 1 a 5 mg (IM) | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                  | NA                       | Uso imediato | EV muito lentamente    | NÃO          | Eventualmente pode-se utilizar Sulfato de Atropina após, para reduzir os efeitos adversos colinérgicos (bradicardia). |
| 224162      | NitroGLICERINA 5mg/mL (ampola 5mL) CRISTALIA | EV             | 5mcg/min início<br>A velocidade pode ser aumentada em 5mcg/min a cada 3-5 min até                    | NA             | NA           | SG 5%<br>SF 0,9%<br>Isento de PVC | 500 mL<br>100 mcg/mL     | 24h TA       | A critério médico      | NÃO          | Retirar da embalagem original apenas no momento do uso e armazenar protegido da luz.                                  |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                        |  |                             |                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                 |  | MA.UFCLI.001 – Página 68/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                        |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                | Via de Adm | Dose Usual                            | RECONSTITUIÇÃO           |                           | DILUIÇÃO                                |                          |                                       |                                      | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                       |            |                                       | Tipo e Volume            | Estabilidade              | Tipo da solução                         | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                          | Tempo de Administração               |              |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                |            | 20mcg/min<br>Dose máx:<br>400 mcg/min |                          |                           |                                         |                          |                                       |                                      |              |                                                                                                                                                                                                        |
| 17426       | NitroPRUSSATO de Sódio<br>25mg/mL<br>(ampola 2mL)<br>CRISTALIA | EV         | Dose máx:<br>8 mcg/kg/min             | 2 mL do diluente próprio | 4h TA<br>Protegido da luz | 248 mL<br>SG 5%<br>(volume final 250mL) | 200mcg/mL                | 24h TA<br>Protegido da luz            | Velocidade de infusão de 3mcg/kg/min | NÃO          | Conservar protegido da luz.<br>A cor da solução após reconstituição é castanha ou levemente alaranjada. Se a cor da solução se apresentar vermelha, azul, verde ou descolorida, deverá ser desprezada. |
| 155284      | NOREpinefrina<br>2mg/mL<br>(ampola 4mL)<br>UNIAO QUIMICA       | EV         | Adulto:<br>3,3 mcg/kg/min             | NA                       | NA                        | SG 5%<br>(preferência)<br>SF 0,9%       | 4 mcg/mL a 1160 mcg/mL   | 24h TA<br>(SG 5%)<br>Protegido da luz | Infusão contínua em CVC              | NÃO          | De preferência, proteger da luz e calor.<br>De preferência, utilizar equipo âmbar.                                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  | MA.UFCLI.001 – Página 69/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                        | Via de Adm | Dose Usual                              | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                                             |                                                                |                  |                                                                                                            | Ajuste Renal     | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                               |            |                                         | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                                                      | Volume e/ou Concentração                                       | Estabilidade     | Tempo de Administração                                                                                     |                  |                                                                                                                             |
| 17434       | Ocitocina 5UI/mL (ampola 1mL)<br>UNIAO QUIMICA         | EV<br>IM   | 20 a 40mU/min                           | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5%                                                                     | 5 a 10UI em 500mL (máx: 40UI em 1.000mL)                       | 24h TA           | Infusão contínua 2 a 8 gotas/min e aumentar gradativamente a cada 20 minutos. Velocidade máx. 40 gotas/min | Usar com cautela | Não deve administrar EV em bolus, pode causar hipotensão aguda de curta duração acompanhada de rubor e taquicardia reflexa. |
| 213659      | Octreotida 0,1mg/mL (ampola 1mL)<br>SUN PHARMACEUTICAL | EV<br>SC   | Adultos: 0,05 a 0,1mg, a cada 8h ou 12h | NA             | NA           | SF 0,9% (preferível)<br>SG 5% *<br>* Octreotida pode afetar a homeostase da glicose. | 12mL SF 0,9% a cada ampola (0,1mg)<br>Subcutânea: sem diluição | 24h TA<br>24h TR | EV direto: 3 min.<br>Infusão: 15 - 30 minutos                                                              | NÃO              | Deve ser conservado sob refrigeração. Estável por 2 semanas em TA. Antes da administração a solução deve estar a TA.        |
| 136026      | Oligoelementos Adulto (ampola 5mL)<br>VMG FARMACEUTICA | EV         | 1 a 2 mL ao dia                         | NA             | NA           | SG 5%                                                                                | 250mL                                                          | Uso imediato     | Infusão Contínua 12h                                                                                       |                  | NÃO INFUNDIR COM NPT. DILUIR EXCLUSIVAMENTE EM SG 5%.                                                                       |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 70/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                              | Via de Adm | Dose Usual                                                     | RECONSTITUIÇÃO         |              | DILUIÇÃO                                                               |                          |                                         |                                                                                                                                                                                     | Ajuste Renal     | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                     |            |                                                                | Tipo e Volume          | Estabilidade | Tipo da solução                                                        | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                            | Tempo de Administração                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                           |
| 201790      | Omeprazol 40mg (frasco-ampola) UNIÃO QUÍMICA | EV         | 40mg a cada 12h a 24h<br>Dose máx: 270mg/dia                   | Diluyente próprio 10mL | 4h TA        | SF 0,9%<br>SG 5%                                                       | 100mL                    | 12h (SF 0,9%)<br>TA<br>6h (SG 5%)<br>TA | EV DIRETO lentamente 2,5mL a 4mL/min<br><br>EV INFUSÃO deve ser administrada por um período > 20-30 minutos, podendo ser prolongada por até 12h se diluída em SF 0,9% e 6h em SG 5% | Usar com cautela | A estabilidade é pH dependente e, para assegurar a estabilidade da solução reconstituída, nenhum outro tipo de diluyente deve ser utilizado.                                                              |
| 141097      | Ondansetrona 2mg/mL (ampola 4mL) CRISTALIA   | EV<br>IM   | 4 a 8 mg a cada 8 a 12h<br>Dose máx: 24mg/dia<br>IM: 16mg/dose | NA                     | NA           | Doses superiores a 8mg até 32mg devem ser diluídas em SF 0,9% ou SG 5% | 50 a 100mL               | 48h TA                                  | Infusão lenta em 15min.<br><br>Infusão contínua de 1 mg/h por até 24 horas                                                                                                          | NÃO              | Pacientes com idade a partir de 65 anos, todas as doses devem ser diluídas e infundidas durante 15 min. Pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave a dose total diária, não deve exceder 8mg. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 71/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm | Dose Usual                                                     | RECONSTITUIÇÃO                        |                             | DILUIÇÃO                                                               |                                                              |              |                                                                                                     | Ajuste Renal                                          | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |            |                                                                | Tipo e Volume                         | Estabilidade                | Tipo da solução                                                        | Volume e/ou Concentração                                     | Estabilidade | Tempo de Administração                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| 149454      | Ondansetrona 2mg/mL (ampola 2mL) CRISTALIA | EV<br>IM   | 4 a 8 mg a cada 8 a 12h<br>Dose máx: 24mg/dia<br>IM: 16mg/dose | NA                                    | NA                          | Doses superiores a 8mg até 32mg devem ser diluídas em SF 0,9% ou SG 5% | 50 a 100mL                                                   | 48h TA       | Infusão lenta em 15min.<br>Infusão contínua de 1 mg/h por até 24 horas                              | NÃO                                                   | Pacientes com idade a partir de 65 anos, todas as doses devem ser diluídas e infundidas durante 15 min. Pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave a dose total diária, não deve exceder 8mg. |
| 17469       | Oxacilina 500mg (frasco-ampola) BLAU       | EV<br>IM   | 250 a 2.000mg a cada 4-6 horas<br>Dose máxima: 12.000mg/dia.   | IM: 2,7mL AD<br>EV: 5mL AD ou SF 0,9% | 6h TR e TA ao abrigo da luz | SF 0,9%<br>SG 5%                                                       | 100 ml - 250ml                                               | 24h TA       | Infusão > 30min<br>EV direto: 10min<br>A administração muito rápida pode causar crises convulsivas. | NÃO                                                   | Na administração EV, particularmente em pacientes idosos, deve-se ter cautela durante a aplicação devido à possibilidade de ocorrer tromboflebite.                                                        |
| 270899      | Pamidronato 90mg (frasco-ampola) EUROFARMA | EV         | 90mg a 210mg cada 4 ou 3 semanas                               | 10 mL AD                              | 24h TR                      | SF 0,9%<br>SG 5%                                                       | 100 a 500 mL<br>A concentração não deve exceder a 90mg/250mL | 24h TA       | Não administrar em bolus, a taxa de infusão não deve exceder 1mg/min. Normalmente 90mg deve ser     | Não<br>A velocidade máxima de infusão seja de 20mg/h. | Em pacientes com mieloma múltiplo e neoplasias malignas admite-se até 90 mg em 500mL em 4h.                                                                                                               |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 72/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                | Via de Adm    | Dose Usual                                         | RECONSTITUIÇÃO  |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                         | Ajuste Renal                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                       |               |                                                    | Tipo e Volume   | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                |               |                                                    |                 |              |                 |                          |              | administrada em 2 horas |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| 407132      | Paracetamol 10mg/mL (bolsa 100mL) HALEX ISTAR                                  | EV            | 1.000mg a cada 6h<br>Dose diária máx: 4.000 mg/dia | NA              | NA           | Pronto para uso | NA                       | Uso imediato | Infusão em 15 min       | O intervalo mínimo entre cada administração em doentes com insuficiência renal grave (ClCr ≤ 30 mL/min) deve ser de pelo menos 6h. | Não devem ser administradas mais do que 4 doses em 24 horas.<br>A dose diária máxima não deve exceder 3.000mg em pacientes com fatores de risco adicionais para hepatotoxicidade.             |
| 17531       | Penicilina G BENZATINA 1.200.000UI 300.000 UI/mL (frasco-ampola 4mL) EUROFARMA | IM (profunda) | 1.200.000 a 2.400.000UI 1x/dia                     | Pronto para uso | NA           | NA              | NA                       | NA           | NA                      | ClCr:<br>10-50mL/min: 75% da dose<br>menor que 10mL/min: 20-50% da dose<br>Realizar dose após hemodiálise.                         | Substituir a agulha ao preparar e administrar o medicamento.<br>IM profunda no quadrante superior da nádega.<br>Lactentes e crianças pequenas preferível administrar na face lateral da coxa. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 73/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                          | Via de Adm          | Dose Usual                                                              | RECONSTITUIÇÃO                                 |                  | DILUIÇÃO           |                            |                  |                         | Ajuste Renal                                                                                                                                        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                 |                     |                                                                         | Tipo e Volume                                  | Estabilidade     | Tipo da solução    | Volume e/ou Concentração   | Estabilidade     | Tempo de Administração  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17540       | Penicilina G POTÁSSICA 5.000.000UI (frasco-ampola) BLAU                  | EV<br>IM (profundo) | 1.000.000 a 30.000.000UI /dia dividido a cada 4 a 6h                    | 10 mL AD<br>Vol final: 12mL (500.000UI/mL)     | 24h TA e TR      | SF 0,9%<br>SG 0,5% | 100mL<br>50.000UI/mL       | 24h TA e TR      | Infusão<br>30 a 60 min  | CICr:<br>10-50mL/min:<br>0,5 a 4 milhões de UI de 8/8h<br>menor que 10mL/min:<br>0,5 a 4 milhões de UI de 12/12h<br>Realizar dose após hemodiálise. | Altas doses devem ser feitas lentamente devido a desequilíbrio eletrolítico de Potássio. Administração IM deve ser realizada profundamente no quadrante superior da nádega ou na face lateral da coxa. Variar o local da injeção IM. |
| 17566       | Penicilina PROCAÍNA 300.000UI + POTÁSSICA 100.000UI (frasco-ampola) BLAU | IM                  | 600.000 a 1.200.000 UI/dia                                              | 2mL AD                                         | 24h TA<br>48h TR | NA                 | NA                         | NA               | NA                      | NÃO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 402780      | Piperacilina 2.000mg + Tazobactam 250mg (frasco-ampola) EUGIA            | EV                  | 12.000mg Piperacilina + 1.500mg de Tazobactam divididos em doses a cada | 10mL AD<br>SF0,9%<br>SG 5%<br>Vol final 11,5mL | 24h TA<br>48h TR | SF 0,9%<br>SG 5%   | 50 a 150mL<br>20 - 50mg/mL | 24h TA<br>48h TR | Infusão LENTA:<br>30min | CICr:<br>maior que 40 mL/min: Sem ajuste<br>20-40 mL/min 12 g/1,5 g/dia em doses divididas 4 g/500 mg a                                             | Caso haja prescrição de aminoglicosídeos, administrar com intervalo de 30 a 60min.                                                                                                                                                   |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 74/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                               | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                                            | RECONSTITUIÇÃO                                                           |                  | DILUIÇÃO         |                            |                  |                         | Ajuste Renal                                                                                                                                                                                         | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                      |            |                                                                                                                                                                       | Tipo e Volume                                                            | Estabilidade     | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração   | Estabilidade     | Tempo de Administração  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|             |                                                               |            | 6 ou 8 horas. Infecções graves podem ser usadas 18.000mg de Piperacilina + 2.250mg Tazobactam                                                                         | 174mg/mL de Piperacilina                                                 |                  |                  |                            |                  |                         | cada 8 horas menor que 20 mL/min: 8 g/1 g/dia em doses divididas 4 g/500 mg a cada 12 horas                                                                                                          | Dose suplementar de 0,75g, após hemodíalise                                                                                    |
| 248665      | Piperacilina 4.000mg + Tazobactam 500mg (frasco-ampola) EUGIA | EV         | 12.000mg Piperacilina + 1.500mg de Tazobactam divididos em doses a cada 6 ou 8 horas. Infecções graves podem ser usadas 18.000mg de Piperacilina + 2.250mg Tazobactam | 20mL AD<br>SF0,9%<br>SG 5%<br>Vol final 23mL<br>174mg/mL de Piperacilina | 24h TA<br>48h TR | SF 0,9%<br>SG 5% | 50 a 150mL<br>20 - 50mg/mL | 24h TA<br>48h TR | Infusão LENTA:<br>30min | CICr:<br>maior que 40 mL/min: Sem ajuste<br>20-40 mL/min: 12 g/1,5 g/dia em doses divididas 4 g/500 mg a cada 8 horas menor que 20 mL/min: 8 g/1 g/dia em doses divididas 4 g/500 mg a cada 12 horas | Caso haja prescrição de aminoglicosídeos, administrar com intervalo de 30 a 60min. Dose suplementar de 0,75g, após hemodíalise |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 75/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                            | Via de Adm             | Dose Usual                                                                         | RECONSTITUIÇÃO                                                                                             |                                          | DILUIÇÃO                             |                                                                                    |                  |                        | Ajuste Renal                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                   |                        |                                                                                    | Tipo e Volume                                                                                              | Estabilidade                             | Tipo da solução                      | Volume e/ou Concentração                                                           | Estabilidade     | Tempo de Administração |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 272925      | Polimixina B 500.000 (frasco-ampola) EUROFARMA             | EV<br>IM<br>Intratecal | 15.000 a 25.000UI/kg/dia, divididos a cada 12h<br><br>Dose máx: 2.000.000UI/kg/dia | EV:<br>2mL<br>AD<br>10mL<br>SF0,9%<br><br>INTRATECAL:<br>10mL<br>SF 0,9%<br><br>IM:<br>2mL<br>AD<br>SF0,9% | 72h TR (AD e SF0,9%)<br>24h TA (SF 0,9%) | SG 5% (preferencialmente)<br>SF 0,9% | 300mL a 500mL<br>1.000 a 1663UI/mL<br>IM: 250.000UI/mL (glúteo)<br>IT: 50.000UI/mL | 24h TA<br>48h TR | Infusão: 60-120min     | NÃO                                                                                         | Para a via IM, reconstituir 1 frasco com 2mL de AD, SF 0,9% ou Lidocaína 1%, permanecendo estável por 72h (TR). A via IM, não é recomendada rotineiramente devido à dor severa no local da injeção. |
| 289135      | Polivitaminas para nutrição PARENTERAL (ampola 5mL) Baxter | EV<br>IM               | 1 a 3 frascos por dia                                                              | 5mL (EV)<br>2,5mL (IM)<br>AD                                                                               | Uso imediato                             | AD<br>SF 0,9%<br>SG 5%               | 100mL (AD)<br>250mL (SF 0,9% ou SG 5%)                                             | 24h TR           | Infusão 2 a 3 horas    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 17760       | Prometazina 25mg/mL (ampola 2mL) HIPOLABOR                 | IM                     | não deve exceder 100mg/dia                                                         | NA                                                                                                         | NA                                       | NA                                   | NA                                                                                 | NA               | IM profunda            | NÃO<br>Em pacientes com insuficiência renal ou hepática ocorre risco de acúmulo do fármaco. | Pode causar Síndrome Neuroléptica Maligna. Não é recomendado a administração EV, pois pode causar necrose e gangrena                                                                                |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 76/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                          | Via de Adm | Dose Usual                                                                                   | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                                                                          |                                                                                       |                              | Ajuste Renal     | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                 |            |                                                                                              | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração                                                 | Estabilidade                                                                          | Tempo de Administração       |                  |                                                                                                                                |
|             |                                          |            |                                                                                              |                |              |                 |                                                                          |                                                                                       |                              |                  | periférica. Não é recomendado a administração SC, pode causar necrose local.                                                   |
| 289059      | Propofol 10mg/mL (ampola 10mL) CRISTALIA | EV         | A dose é individualizada com base em fatores do paciente e agentes anestésicos concomitantes | NA             | NA           | SG 5%           | Puro ou diluído<br>A diluição não pode exceder proporção de 1:5 (2mg/mL) | Deve ser usado em até 6 horas após diluição.<br><br>Não diluído, usar em até 12 horas | Infusão contínua e EV direto | Usar com cautela | Agitar a ampola antes do uso. Não deve ser administrado através de filtro microbiológico. Não fazer bolus em pacientes idosos. |
| 138983      | Propofol 10mg/mL (ampola 20mL) CRISTALIA | EV         | A dose é individualizada com base em fatores do paciente e agentes anestésicos concomitantes | NA             | NA           | SG 5%           | Puro ou diluído<br>A diluição não pode exceder proporção de 1:5 (2mg/mL) | Deve ser usado em até 6 horas após diluição.<br><br>Não diluído, usar em até 12 horas | Infusão contínua e EV direto | Usar com cautela | Agitar a ampola antes do uso. Não deve ser administrado através de filtro microbiológico. Não fazer bolus em pacientes idosos. |
| 218499      | Propofol 10mg/mL (frasco-ampola 50mL)    | EV         | A dose é individualizada com base em fatores                                                 | NA             | NA           | SG 5%           | Puro ou diluído<br>A diluição não pode exceder proporção de 1:5 (2mg/mL) | Deve ser usado em até 6 horas após diluição.                                          | Infusão contínua e EV direto | Usar com cautela | Agitar a ampola antes do uso. Não deve ser administrado através de filtro                                                      |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 77/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                  | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                                                                  | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                   |                          |                                   |                                                                                                                                                                    | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                         |            |                                                                                                                                                                                             | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução            | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                      | Tempo de Administração                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | CRISTALIA                                        |            | do paciente e agentes anestésicos concomitantes                                                                                                                                             |                |              |                            |                          | Não diluído, usar em até 12 horas |                                                                                                                                                                    |              | microbiológico. Não fazer bolus em pacientes idosos.                                                                                                                                                                                                                        |
| 181277      | Protamina 10mg/mL (ampola 5 mL)<br>UNIAO QUIMICA | EV         | O uso desse medicamento deve ser somente administrado após aplicação de heparina.<br><br>50mg<br><br>Antagonista da Heparina: Cada 1mL (10mg) neutraliza 1.000UI de Heparina não fracionada | NA             | NA           | NA                         | NA                       | Uso imediato                      | EV direto: lento 1 mL em 1 a 3 min<br><br>Interromper a administração da protamina quando o tempo de protrombina for normalizado, para evitar excesso de protamina |              | Acidentes com história de alergia à peixe podem desenvolver reações de hipersensibilidade à protamina. Pacientes diabéticos que estejam recebendo Insulina NPH têm um risco aumentado de desenvolvimento de reações adversas à Protamina incluindo hipotensão e anafilaxia. |
| 268798      | Remilfentanila 2mg (frasco-ampola)               | EV         | 2 mcg/kg                                                                                                                                                                                    | 2 mL AD        | 24h TA       | SF 0,9%<br>SG 5%<br>SGF 5% | NA                       | 24h TA                            | EV bolus (Na indução da anestesia não                                                                                                                              | NÃO          | Não deve ser misturado com o                                                                                                                                                                                                                                                |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 78/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                      | Via de Adm                                                             | Dose Usual                                                                                                                                                | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO        |                          |              |                                                                                                                                                     | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                             |                                                                        |                                                                                                                                                           | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração                                                                                                                              |              |                                                                            |
|             | CRISTALIA                                            |                                                                        |                                                                                                                                                           |                |              |                 |                          |              | deve ser < 30 segundos<br>Infusão contínua<br>0,025 a 0,1 mcg/kg/min                                                                                |              | Propofol na mesma solução.                                                 |
| 242888      | Rocurônio 10mg/mL (ampola 5mL)<br>CRISTALIA          | EV                                                                     | 0,6 a 0,12 mg/kg e manutenção 0,15 mcg/kg/min                                                                                                             | NA             | NA           | NA              | NA                       | 24H TR       | NA                                                                                                                                                  | NÃO          | Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.     |
| 248576      | Ropivacaína 2mg/mL (0,2%) (ampola 20mL)<br>CRISTALIA | Peridural Lombar e torácica<br>Bloqueio de campo e nervo so periférico | Bolo peridural: (20–40 mg)<br>Infusão contínua peridural: (12–28mg/h)<br>Bloqueio de campo: (2–200mg)<br>Bloqueio periférico: (10–20mg/h)<br>Máx.: 3mg/kg | NA             | NA           | SF 0,9%         | NA                       | 24H TA       | Bolo peridural: 10-20mL (mínimo de 30min.)<br>Infusão contínua peridural: 6-14mL/h<br>Bloqueio de campo: 1-100mL/h<br>Bloqueio periférico: 5-10mL/h | NÃO          | Não usar por via Intravenosa, podem ocorrer sintomas de toxicidade do SNC. |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 79/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                            | Via de Adm                         | Dose Usual                                                                                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                                  |                              |              |                                                                | Ajuste Renal                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                   |                                    |                                                                                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                                           | Volume e/ou Concentração     | Estabilidade | Tempo de Administração                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18520       | Salbutamol 0,5mg/mL (ampola 1mL) HIPOLABOR | Adulto: EV/IM /SC<br>Pediatría: EV | 250 mcg (4 mcg/kg), se necessário, repetir a dose.<br>500 mcg (8 mcg/kg) SC ou IM, repetidos a cada 4 h, se necessário | NA             | NA           | Se necessário, pode ser diluído em AD<br>SF 0,9%<br>SG 5% | 10 a 100mL<br>50 a 500mcg/mL | TA 24h       | Bolus 50mcg/mL em 1 min;<br>Infusão 10mcg/mL<br>2 -5mcg/kg/min | NÃO há ajuste de dose recomendado para pacientes com insuficiência renal. Usar com cautela e observar resposta clínica do paciente | Não deve ser utilizado com medicamentos betabloqueadores não seletivos, como o Propranolol. A administração com corticosteroides pode aumentar esse efeito. O aumento dos níveis de lactato pode causar dispneia e hiperventilação compensatória, o que levaria a interpretações erradas de sinais de falha terapêutica e conduziria o médico a intensificar indevidamente o tratamento com agonistas beta2-adrenérgicos de curta duração. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                 |  |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                          |  | MA.UFCLI.001 – Página 80/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                 |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                 | Via de Adm | Dose Usual                                                                                      | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO                                     |                                       |              |                            | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                        |            |                                                                                                 | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução                              | Volume e/ou Concentração              | Estabilidade | Tempo de Administração     |              |                                                                                                                                                                                                       |
| 405650      | Soro AntiESCORPIÔNICO 1mg/mL (frasco-ampola 5mL) – SUS INSTITUTO BUTANTAN       | EV         | A dose varia de acordo com a gravidade do quadro. Moderado: 2 a 3 ampolas Grave: 4 a 6 ampolas. | NA             | NA           | Pode ser diluído somente em SF 0,9% e SG 5%. | À razão de 1:2 a 1:5.                 | Uso imediato | Infusão: 8 a 12mL/min.     | NÃO          | O soro antiescorpiônico é indicado para o tratamento de envenenamentos moderados e graves por escorpiões do gênero Tityus. Não administrar com outros medicamentos na mesma via. Risco de anafilaxia. |
| 405649      | Soro AntiTETÂNICO (frascos-ampola 5mL) – SUS INSTITUTO BUTANTAN                 | EV IM      | 4 frascos-ampola (20.000 UI), podendo-se aplicar metade da dose IM e metade EV                  | NA             | NA           | SF 0,9% SG 5%                                | À razão de 1:2 a 1:5.                 | Uso imediato | Infusão: gotejamento lento | NÃO          |                                                                                                                                                                                                       |
| 406262      | Soro AntiBOTRÓPICO (pentavalente) (frasco-ampola 10mL) – SUS INSTITUTO BUTANTAN | EV         | A dose varia de acordo com a gravidade do quadro. Leve: 2 a 4 ampolas                           | NA             | NA           | SF 0,9% SG 5%                                | Puro ou diluído À razão de 1:2 a 1:5. | Uso imediato | Infusão: 8 a 12mL/min      | NÃO          | O soro Antibotrópico (pentavalente) e antilaquético é um antiveneno que pode ser utilizado para o tratamento de picadas por serpentes                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 81/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                  | Via de Adm | Dose Usual                                                                             | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                          |              |                                                  | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                         |            |                                                                                        | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração                           |              |                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |            | Moderados: 4 a 8 ampolas<br>Grave: 12 ampolas                                          |                |              |                  |                          |              |                                                  |              | do gênero Bothrops e da espécie Lachesis muta (jararaca, jararacuçu, cotiara, urutú, caíçaca e outras) e Lachesis muta (surucucu pico-de-jaca) |
| 405646      | Soro AntiCROTÁLICO (frasco-ampola 10mL) – SUS INSTITUTO BUTANTAN | EV         | Caso leve: 5 ampolas<br>Caso moderado: 10 ampolas<br>Caso grave: 20 ampolas            | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído          | Uso imediato | EV direto: 20 a 60min.<br>Infusão: 8 a 12 ml/min | NÃO          | Este produto é indicado para o tratamento de pacientes picados por serpentes da espécie Crotalus durissus (cascavéis).                         |
| 405644      | Soro AntiIRRÁBICO 200UI/mL (frasco-ampola 5mL) – SUS BUTANTAN    | IM         | A dose indicada é de 40 UI/kg, devendo o total administrado ser de, no máximo 3.000 UI | NA             | NA           | SF 0,9%          | NA                       | NA           | IM                                               | NÃO          |                                                                                                                                                |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 82/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                     | Via de Adm  | Dose Usual                                        | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                                                              |                            |                                                       | Ajuste Renal                                                                                                                                                                     | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                            |             |                                                   | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                                                     | Estabilidade               | Tempo de Administração                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| 401998      | Sufentanila, Citrato (Sufentanila 5mcg/mL) (ampola 2mL) CRISTALIA   | EV Epidural | Analgesia: 1 a 8mcg/kg<br>Anestesia: 8 a 30mcg/kg | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Puro ou diluído                                                                              | 24h TA<br>Protegido da luz | EV bolus por pelo menos 2 minutos ou infusão contínua | Utilizar com cautela                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| 406008      | Sugamadex 100mg (frasco-ampola 2mL)                                 | EV          | 2 a 16 mg/kg                                      | NA             | NA           | NA               | Puro ou diluído em SF 0,9% (10mg/mL)                                                         | 48h TA e TR                | EV bolus 10 segundos                                  | Insuficiência renal grave é contraindicado.                                                                                                                                      | O Sugamadex sódico pode ser utilizado para reverter diferentes níveis de bloqueio neuromuscular induzido por Rocurônio ou Vecurônio.                                                                     |
| 12858       | Sulfametoxazol 80mg/mL + Trimetoprima 16mg/mL (amp 5mL) NEO QUIMICA | EV          | 5mg - 20mg/kg/Dia a cada 6h ou 12h.               | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Cada ampola (5mL) em um volume de 75 a 125mL. Concentração máxima: 5mL para 75mL do diluente | 6h TA                      | Infusão: 30-60min.                                    | ClCr maior que 30mL/min: NÃO é necessário ajuste 15-30mL/min: 50% da dose recomendada menor que 15mL/min: NÃO é recomendado Hemodiálise Intermitente: Administrar após a diálise | Devem ser sempre utilizadas após a diluição, não devendo ser injetadas diretamente na veia ou pela borracha do soro. Pacientes com restrições hídricas, usar soluções 75mL/ampola SG 5%, estável por 2h. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 83/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                            | Via de Adm | Dose Usual                                                                                                                                              | RECONSTITUIÇÃO |              | DILUIÇÃO         |                                                                                                 |              |                        | Ajuste Renal                                                                                                         | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                                   |            |                                                                                                                                                         | Tipo e Volume  | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                                                        | Estabilidade | Tempo de Administração |                                                                                                                      |                                                              |
| 289023      | Sulfato de Magnésio 10% 100mg/mL - 0,8mEq/mL (ampola 10mL) Cada ampola contém 1.000mg de Magnésio ISOFARMA | EV<br>IM   | Anticonvulsivante na eclâmpsia/pré-eclâmpsia: 4.000 e 2.000mg/h.<br><br>Restaurador de eletrólitos: 1.000mg a cada 6h ou 250mg/kg/dia ou 5.000mg por 3h | NA             | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Concentração de até 20%<br>Até 1.000mg em 100mL<br>Até 2.500mg em 500mL<br>Até 5.000mg em 500mL | 24h TA       | 20 a 120 min           | Insuficiência renal: Administrar com extrema cautela. Em caso de ClCr menor que 25 mL/min, NÃO deve ser administrado | E os níveis de Magnésio devem ser monitorados rigorosamente. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 84/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                                                                                       | Via de Adm      | Dose Usual                                                                                                                                                    | RECONSTITUIÇÃO              |              | DILUIÇÃO         |                                                                                                                                                  |              |                                                                            | Ajuste Renal                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                                                                              |                 |                                                                                                                                                               | Tipo e Volume               | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração                                                                                                                         | Estabilidade | Tempo de Administração                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18015       | Sulfato de Magnésio 50%<br>500mg/mL - 4,06 mEq/mL<br>(ampola 10mL)<br>Cada ampola contém 5.000mg de Magnésio ISOFARMA | EV<br>IM        | Anticonvulsivante na eclâmpsia/pré-eclâmpsia:<br>4.000 e 2.000mg/h.<br><br>Restaurador de eletrólitos:<br>1.000mg a cada 6h ou 250mg/kg/dia ou 5.000mg por 3h | NA                          | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | Até 200mg em 100mL de<br>Até 500mg em 250mL<br><br>Até 1.000mg em 500mL de Infusão contínua: até 1.000mg em 500mL<br>Acima de 1.000mg em 1.000mL | 24h TA       | EV não deve exceder a 150 mg/min, exceto em eclâmpsia severa com convulsão | É contraindicado em casos de insuficiência renal severa.    | Diluir antes da administração.<br>É contraindicado em casos de insuficiência renal, bloqueio cardíaco ou danos no miocárdio e depressão respiratória.<br>A intoxicação é manifestada por ausência do reflexo patelar, queda da PA e paralisia respiratória.<br><b>Antagonista:</b><br><b>Gluconato de Cálcio 10% (10 a 20mL em bolus)</b> |
| 289072      | Suxametônio 100mg<br>(frasco-ampola)<br>UNIÃO QUIMICA                                                                 | EV<br>IM        | 0,3 a 1,1 mg/kg                                                                                                                                               | 10mL AD                     | 24h TR       | SF 0,9%<br>SG 5% | 250 a 1.000mL (1 a 2mg/mL)                                                                                                                       | 24h TR       | Infusão contínua 0,5 mg a 10mg/min<br>IM: músculo deltoide                 | NÃO                                                         | A Via IM só deve ser usada em caso de impossibilidade da via EV<br>Reversor: Atropina                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 143847      | Teicoplanina 200 mg                                                                                                   | EV<br>IM<br>*VO | Dose de ataque de 6 a 12mg/kg a                                                                                                                               | 3 mL diluente próprio ou AD | 24h TR       | SF 0,9%<br>SG 5% | 20 - 200mL                                                                                                                                       | 24h TR       | EV direto 3-5min<br>Infusão 30 min                                         | CICr 40-60 mL/min: 50% da dose inicial a cada 24h ou 100% a | As soluções de Teicoplanina e Aminoglicosídeos são                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 85/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                        | Via de Adm      | Dose Usual                                                                                                                | RECONSTITUIÇÃO                 |                      | DILUIÇÃO         |                          |                                                         |                                       | Ajuste Renal                                                                                                                                                             | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                               |                 |                                                                                                                           | Tipo e Volume                  | Estabilidade         | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade                                            | Tempo de Administração                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | (frasco-ampola)<br>UNIÃO QUÍMICA                       |                 | cada 12h por<br>3 a 5 doses<br>Dose<br>manutenção:<br>6 a 12mg/kg<br>uma vez dia                                          |                                |                      |                  |                          |                                                         |                                       | cada dois dias;<br>ClCr menor que 40<br>mL/min: 1/3 da dose<br>inicial ou 100% a cada<br>três dias.                                                                      | incompatíveis<br>quando misturadas<br>diretamente e não<br>devem ser<br>misturadas antes da<br>injeção.<br>Na Hemodiálise:<br>20mL em bolus com a<br>máquina em UF<br>(banho desligado).<br>*Uso off label:<br>Diarreia por<br><i>Clostridium difficile</i> :<br>200mg VO 2x/dia por<br>7-14 dias |
| 143855      | Teicoplanina<br>400 mg<br>(frasco-ampola)<br>EUROFARMA | EV<br>IM<br>*VO | Dose de<br>ataque de 6<br>a 12mg/kg a<br>cada 12h por<br>3 a 5 doses<br>Dose<br>manutenção:<br>6 a 12mg/kg<br>uma vez dia | 3 mL diluente<br>próprio ou AD | 48h TA<br>11 dias TR | SF 0,9%<br>SG 5% | 20 - 200mL               | 48h TR<br>(SF 0,9%)<br>48h TA e<br>7 dias TR<br>(SG 5%) | EV direto<br>3-5min<br>Infusão 30 min | ClCr 40-60 mL/min:<br>50% da dose inicial a<br>cada 24h ou 100% a<br>cada dois dias;<br>ClCr menor que 40<br>mL/min: 1/3 da dose<br>inicial ou 100% a cada<br>três dias. | As soluções de<br>Teicoplanina e<br>Aminoglicosídeos são<br>incompatíveis<br>quando misturadas<br>diretamente e não<br>devem ser<br>misturadas antes da<br>injeção.<br>Na Hemodiálise:<br>20mL em bolus com a                                                                                     |





MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 86/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                           | Via de Adm | Dose Usual                                                              | RECONSTITUIÇÃO                 |              | DILUIÇÃO          |                          |              |                        | Ajuste Renal                                                                                                                   | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                                  |            |                                                                         | Tipo e Volume                  | Estabilidade | Tipo da solução   | Volume e/ou Concentração | Estabilidade | Tempo de Administração |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|             |                                                           |            |                                                                         |                                |              |                   |                          |              |                        |                                                                                                                                | máquina em UF (banho desligado).<br>*Uso off label:<br>Diarreia por <i>Clostridium difficile</i> :<br>200mg VO 2 vezes/dia por 7-14 dias |
| 222216      | Tenoxicam 20mg (frasco-ampola) EUROFARMA                  | EV<br>IM   | Adulto: 20mg a 40mg a cada 24h                                          | 2 mL de diluente próprio ou AD | Uso imediato | NA                | NA                       | NA           | NA                     | NÃO                                                                                                                            | Não recomendada a administração por infusão                                                                                              |
| 13412       | Terbutalina 0,5mg/mL (ampola 1mL) HIPOLABOR UNIÃO QUÍMICA | EV<br>SC   | (SC)<br>0,25 a 0,5 mg 4x/dia.<br>Dose máx: 0,5 mg/dia<br><br>EV:<br>5mg | NA                             | NA           | SG 5%<br>SF 0,9%* | 5mcg/mL                  | 12h TA       | 20 - 30 gotas/min      | Correção pelo ClCr (ml/min) de 80-50 = 100% da dose.<br>De 50-10: 50% da dose<br>Menor que 10 = administração NÃO recomendada. | *SF 0,9% deve ser evitada, pois pode aumentar o risco de edema pulmonar.                                                                 |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 87/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFGD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                 | Via de Adm | Dose Usual                                                                                             | RECONSTITUIÇÃO                                                                                                |              | DILUIÇÃO         |                                 |                  |                                    | Ajuste Renal | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                        |            |                                                                                                        | Tipo e Volume                                                                                                 | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração        | Estabilidade     | Tempo de Administração             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| 18589       | Tiamina (Vitamina B1) 100mg/mL (ampola 1mL) VGM | EV IM      | PROFILAXIA:<br>100 a 200 mg<br>3 vezes ao dia<br><br>TRATAMENT<br>O:<br>200 a 500 mg<br>3 vezes ao dia | NA                                                                                                            | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 100 mL                          | Uso imediato     | EV Lento<br>por mais de 30 minutos | NÃO          | O produto é fotossensível, porém, não é necessário equipo especial. Não deixar o produto sob luz direta. Permitido luz indireta ou fluorescente, porém não ultrapassar período de 8 h.                    |
| 980231      | Tigeciclina 50mg (frasco-ampola) UNIAO QUIMICA  | EV         | ADULTOS:<br>100mg EV,<br>seguida de<br>50mg a cada<br>12h.<br><br>Dose máxima:<br>100mg/dia            | 5,3mL<br>SF 0,9%<br>SG 5%<br>10mg/mL<br><br>Aspirar<br>5 mL<br><br>O frasco-ampola contém um excedente de 6%. | Uso imediato | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL<br>( menor que<br>1mg/mL) | 24h TA<br>48h TR | 30 - 60 min                        | NÃO          | Agitar o frasco delicadamente com movimentos circulares até o medicamento se dissolver. A solução reconstituída deve ter a coloração amarela a alaranjada; caso contrário, a solução deve ser desprezada. |
| 138355      | Tiopental 500mg (frasco-ampola) CRISTALIA       | EV         | Indução lenta da anestesia 50                                                                          | 500 mg em 20mL<br>SF 0,9%                                                                                     | 24h TR       | SF 0,9%<br>SG 5% | 100mL                           | NA               | NA                                 | 75% da dose  | Convulsões após administração da anestesia local: 125 a                                                                                                                                                   |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                         |  |                             |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                  |  | MA.UFCLI.001 – Página 88/90 |                             |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br>NO HU-UFGD |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                         |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                         | Via de Adm | Dose Usual                                                                                               | RECONSTITUIÇÃO                       |                      | DILUIÇÃO        |                          |                      |                                                             | Ajuste Renal                                                                                                                       | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                |            |                                                                                                          | Tipo e Volume                        | Estabilidade         | Tipo da solução | Volume e/ou Concentração | Estabilidade         | Tempo de Administração                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                         |            | a 75mg, em intervalos de 20 a 40 segundos. Se necessário, utilizar doses adicionais de 25 a 50mg.        |                                      |                      |                 |                          |                      |                                                             |                                                                                                                                    | 150mg, ao longo de 10 min. Estado epiléptico tônico-clônico generalizado: 3 a 5 mg/kg seguida em 30 min por infusão contínua de 1 a 3 mg/kg/hora.                                                  |
| 280046      | Tramadol 50mg/mL (ampola 1mL) HIPOLABOR | EV IM      | 50 a 100 mg a cada 6 ou 8h.<br><br>Dose Máx: 400mg dia                                                   | NA                                   | NA                   | SF 0,9% SG 5%   | 100 mL                   | Uso imediato         | EV direto: 1mL/min<br>Infusão:                              | 50-100 mg 12/12h<br>Máx 200 mg 24/24h                                                                                              | Insuficiência hepática: Cirrose: 50mg, a cada 12h. A dose diária total de 8 mg/kg ou 400 mg, o que for menor, não deve ser excedida.                                                               |
| 18465       | Vancomicina 500 mg (frasco-ampola) ABL  | EV VO*     | Dose de ataque: 25-30mg/kg, seguida de 15 a 20mg/kg/dose a cada 8 ou 12 h;<br>Dose máxima: 2.000mg/dose. | 10 mL AD<br>Vol final 10,2mL 49mg/mL | 24h TA<br>14 dias TR | SF 0,9% SG 5%   | 100mL (4,5mg/mL)         | 24h TA<br>14 dias TR | 60 min.<br>Não ultrapassar 10 mg/min<br>Recomendado 2 horas | CICr 20-49mL/min: Inicia com 15 a 20mg/kg/dose (usual: 750-1500mg) a cada 24 h;<br>CICr menor que 20mL/min: Intervalos mais longos | Aparência da solução reconstituída: incolor ou marrom claro.<br>*A administração VO é off-label.<br>Reconstituir o medicamento conforme orientação do fabricante e diluir em 50mL de água potável. |



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



|                     |                                                                                                                  |  |                             |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                                           |  | MA.UFCLI.001 – Página 89/90 |                             |
| Título do Documento | <b>PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS<br/>INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS<br/>NO HU-UFOD</b> |  | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão:<br>12/2025 |
|                     |                                                                                                                  |  | Versão: 03                  |                             |

| MEDICAMENTO |                                                   | Via de Adm     | Dose Usual                                                                                  | RECONSTITUIÇÃO                    |              | DILUIÇÃO         |                          |                 |                                                      | Ajuste Renal                                                                                                                                | INFORMAÇÕES IMPORTANTES                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGHU        | Apresentação Padronizada                          |                |                                                                                             | Tipo e Volume                     | Estabilidade | Tipo da solução  | Volume e/ou Concentração | Estabilidade    | Tempo de Administração                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 136239      | VASOpressina 20UI/mL (ampola 1mL) BIOLAB          | EV<br>IM<br>SC | 5 a 10UI, a cada 12h ou 8h<br>0,01 a 0,04U/min                                              | NA                                | NA           | SF 0,9%<br>SG 5% | 0,1 a 1UI/mL             | Uso imediato    | 20UI em 20 a 30min<br>Infusão contínua 0,2 a 1UI/min | CICr 20 a 9mL/min:<br>15 a 20mg/kg/dose<br>CICr menor que 20mL/min intervalo mais longo                                                     | Pode ser usada em AVP, porém devido ao risco de necrose decorrente de extravasamento, é preferível a utilização de AVC.                                      |
| 408525      | VORIconazol 200mg (frasco-ampola) SUS DR. REDDY'S | EV             | Dose de ataque: 6mg/kg a cada 12h (primeiras 24h)<br>Dose Manutenção: 3 a 4mg/kg a cada 12h | 19mL AD<br>Vol final 20mL 10mg/mL | 24h TR       | SF 0,9%<br>SG 5% | 0,5 a 5mg/mL             | 24h TR          | Infusão máxima 3 mg/kg/h durante 1 a 2 horas         | É hemodialisável com um clearance de 121 mL/min                                                                                             | Medicamento não padronizado. Fornecido pelo Ministério da Saúde                                                                                              |
| 232890      | Zidovudina 20mL (frasco-ampola) SUS CRISTALIA     | EV             | 1mg /kg a cada 4 horas até que a terapia VO possa ser iniciada                              | NA                                | NA           | SG 5%            | < 4 mg/mL                | 8H TA<br>24H TR | Infusão constante durante 1 hora                     | A dose recomendada para pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal (clearance de creatinina < 15 mL/min) é de 1mg/kg a cada 6 a 8 horas | Pacientes com anemia ou granulocitopenia significativa podem necessitar de redução da dose até que haja recuperação da medula óssea ou suspensão da terapia. |

|                     |                                                                                                  |                             |                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo do Documento   | MANUAL                                                                                           | MA.UFCLI.001 – Página 90/90 |                          |
| Título do Documento | PREPARO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS PARA ADULTOS NO HU-UGD | Emissão: 12/2025            | Próxima revisão: 12/2027 |
|                     |                                                                                                  | Versão: 03                  |                          |

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA       | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO                                                   |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01     | 04/05/2017 | Elaboração do Manual                                                     |
| 02     | 30/06/2023 | Revisão do documento. Alteração de unidade funcional, da UDF para UFCLI. |
| 03     | 10/08/2025 | Revisão do documento. Inclusão de novos medicamentos                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Elaboração</b><br>Ariadne de Santana Tolosa Pedroso<br>Flávia Santos Araújo<br>Leonora Correa da Costa de Marchi<br>Magda Laíse Oliveira<br>Marcelo da Silva<br>Marcelo Konorat<br>Pedro Henrique Érnica                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data: 04/05/2017                         |
| <b>Revisão</b><br>2ª Versão: Adriely Cordeiro Pastori; Ana Paula dos Santos Mira<br>André Ronchoni Salmazo; Cleide Adriane Signor Tirloni<br>Gabriella Gomes Barasuol; Magda Laíse Oliveira Tanaka<br>Marcelo da Silva; Larry Jimenez Alves; Marciane Maximo<br>Pedro Henrique Érnica; Tatiane Nantes Ferreira Siena<br><br>3ª Versão: Matheus Carvalho Reis; Rubenilson Almeida Souza<br>Sara Maria Santos Portela; Magda Laíse Oliveira Tanaka<br>Tatiane Nantes Ferreira Siena | Data: 30/06/2023<br><br>Data: 10/08/2025 |
| <b>Validação</b><br>Fuad Fayez Mahmoud – STGQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data: 10/12/2025                         |
| <b>Aprovação</b><br>Rafaele Carla Pivetta de Araujo – Chefe do SFH<br>Colegiado Executivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data: 10/12/2025<br>Data: 11/12/2025     |

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.014487/2023-59