

La siguiente transcripción de examen tiene muchas respuestas mal escritas y respuestas que se dan como correctas pueden no serlo, todo fue sacado de:

<https://cdem.com.ar/12780/Examen-Completo-Residencia-2017-Examen-Unico>

Examen Único 2017

1. ¿Cuándo le solicitaría serología a un niño de 30 días de vida, hijo de una madre con enfermedad de chagas, que es traído a la consulta y no se le ha realizado aún ningún estudio complementario para descartar esta infección?
 - a. En esta consulta.
 - b. A los 2 meses de edad.
 - c. A los 6 meses de edad.
 - d. **A los 10 meses de edad.**

2. ¿Cuál de los siguientes marcadores indica una infección aguda por el virus de la hepatitis B?
 - a. **HBsAg.**
 - b. HbcAg.
 - c. Anti HBs.
 - d. Anti HBc.

3. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 19 años, nulípara, que cursa 33 semanas de gestación, que durante el control gestacional se constata TA 150/100 mmHg, y el valor se repite 30 minutos después? No ha presentado ginecorragia ni rotura de membranas. Durante la evaluación tiene tono uterino normal, dinámica uterina negativa, frecuencia cardíaca: fetal 145 latidos por minuto, con movimientos fetales presentes y en el tacto vaginal tiene un cuello cerrado posterior, no acortado. Los exámenes de laboratorio solicitados son normales.
 - a. Manejo ambulatorio, alfametildopa vía oral, maduración pulmonar fetal y control en 24 horas por consultorio externo.
 - b. **Internación, alfametildopa vía oral, maduración pulmonar fetal y control en 24 horas por consultorio externo**
 - c. Internación, labetalol intravenoso, maduración pulmonar fetal y finalización del embarazo luego de cumplida la maduración.
 - d. Manejo ambulatorio con labetalol vía oral, no es necesario realizar maduración pulmonar fetal.

4. ¿Cuál de las siguientes modalidades de tratamiento preventivo con aerosoles con budesonide es la más adecuada para un niño de dos años con broncopatía obstructiva recidivante (BOR) que estuvo internado en una oportunidad?
 - a. Inhalador de polvo seco más aerocámara.
 - b. **Inhalador de dosis medida (IDM) con aerocámara.**
 - c. Inhalador de dosis medida (IDM) con espaciador bucal.
 - d. Inhalador de polvo seco.

5. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios es necesario realizar a un bebé con síndrome de Down en la etapa neonatal debido a la frecuente asociación de comorbilidades con esta discapacidad?
- a. Radiografía de columna cervical.
 - b. Anticuerpos para enfermedad celíaca.
 - c. Ecocardiograma.**
 - d. Electroencefalograma (EEG).
6. ¿Cuál es la causa más probable de somnolencia de un paciente de 80 años de edad que ingresó a la guardia por insuficiencia renal secundaria a hipertrofia prostática, el cual se le colocó una sonda vesical para evacuar retención urinaria y presentó en los días sucesivos una diuresis de más de 3 litros/día?
- a. Hiponatremia.**
 - b. Hipocalemia.
 - c. Hiperglucemia.
 - d. Acidosis metabólica.
7. ¿Cuál sería la conducta más adecuada para una paciente de 52 años, menopáusica, que consultó por metrorragia de 3 meses de evolución? Se le realizó histeroscopia y en el estudio citológico se informa hiperplasia con atipia.
- a. Indicar 40mg/día de acetato Medroxiprogesterona.
 - b. Histerectomía total.
 - c. Control con histerectomía en 3 a 6 meses.
 - d. Anexohisterectomía.**
8. ¿Cuál de las siguientes alteraciones cardíacas ocurridas en los seis meses previos a la cirugía se relaciona con el aumento de la mortalidad perioperatoria?
- a. Bloqueo AV de primer grado.
 - b. Trastornos de la repolarización.
 - c. Infarto agudo de miocardio.**
 - d. Bloqueo de rama derecha.
9. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años que consulta en guardia por cefalea y fiebre de cuatro semanas de evolución y en el examen físico tiene rigidez de nuca y presencia de signos meníngeos? Se le realiza punción lumbar y el LCR es claro con el siguiente estudio físico químico: Glucosa: 22 mg/dl; proteínas 3.4 g/l; 300 leucocitos/mm³ a predominio mononuclear.
- a. Meningitis tuberculosa.**
 - b. Criptococosis meníngea.
 - c. Meningoencefalitis por virus Herpes.
 - d. Meningoencefalitis por Listeria Monocytogenes.


10. ¿A cuál de los siguientes pacientes diabéticos le indicaría administración de insulina?
- Paciente con diabetes de reciente diagnóstico, IMC de 26 y glucemia en ayunas de 210 mg/dl.
 - Paciente con diabetes de reciente diagnóstico, IMC de 30 y glucemia en ayunas de 240 mg/dl.
 - Paciente diabético tipo 2 de 10 años de evolución, en tratamiento de hipoglucemiantes orales y que a veces tiene glucemia elevada.
 - Paciente con control metabólico inadecuado luego de 6 meses de tratamiento con hipoglucemiantes orales combinados dieta.**
11. ¿Cuál es la conducta más adecuada con un adulto de 36 años, afebril, que cursa catarro de vías aéreas superiores, y lo consulta porque le indicaron la vacuna doble bacteriana y no sabe si vacunarse o no con este cuadro clínico?
- Puede aplicarse la vacuna.**
 - Puede vacunarse inmediatamente después de la curación del cuadro actual.
 - Debe postergar la vacunación hasta dos semanas después del curado el cuadro.
 - Debe postergar la vacunación hasta un mes después de curado el cuadro.
12. ¿Cuál es la causa más frecuente de moderado aumento de temperatura axilar en el puerperio inmediato?
- Ingurgitación láctea.**
 - Mastitis.
 - Endometritis.
 - Infección de la episiorrafia.
13. ¿Cuál es la conducta más adecuada para completar el esquema de vacunación en el caso de un joven de 25 años que recibió, hace un año, una sola dosis de vacuna contra hepatitis B?
- Iniciar el esquema de vacunación nuevamente.
 - Completar el esquema con las dosis faltantes.**
 - Dar una doble dosis inicialmente y a los 6 meses la tercera dosis.
 - Solicitar serología y decidir según el título de anticuerpos.
14. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente que presenta microhematuria con leucocituria y un análisis de orina?
- Glomerulonefritis membranosa.
 - Tumor renal.
 - Infección urinaria.**
 - Malformación vascular.
15. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 40 años, trabajador rural de la provincia de Córdoba que consulta por presentar fiebre, pérdida de peso y dolor lumbar de 2 meses de evolución? La fiebre no es constante y en ocasiones se acompaña de mucha sudoración. En su medio laboral está en contacto con proveedores, y realiza faena de animales, en el examen físico presenta hepatoesplenomegalia y dolor a la palpación de columna lumbar y zona sacra ilíaca. En los exámenes de laboratorio tiene serología negativa para HIV, anemia y leucopenia.
- Brucelosis.**
 - Leptospirosis.
 - Fiebre hemorrágica argentina.
 - Hidatidosis.

16. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 25 años que comenzó hace tres días con un exantema maculopapular pruriginoso que inició en tronco y se extendió a extremidades? El paciente refiere como antecedente la toma de los comprimidos de antiinflamatorios no esteroides por un dolor muscular, trabaja en una oficina y no tiene pareja.

En el examen físico presenta el siguiente exantema: ver imagen 5 del anexo

- a. Pitiriasis rosada de Gilbert.
- b. Sarampión.
- c. Sífilis secundaria.
- d. **Farmacodermia.**

IMAGEN 5



17. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 35 años que consulta una semana después de un parto por cesárea, por el enrojecimiento y dolor en el lado derecho de la operación, que apareció a las 48 horas posteriores al mismo? En el examen físico se encuentra eupneica, con temperatura axilar de 37 °C, presión arterial 188/78 mmHg, FC 88 latidos / min; presenta eritema e induración alrededor de la incisión.

En el margen derecho de la incisión hay una masa fluctuante.

- a. Indicar tratamiento con antibióticos vía oral.
- b. indicar tratamiento con antibióticos vía parenteral.
- c. **Incisión y drenaje.**
- d. Laparotomía.

18. ¿Cuál es la conducta más adecuada con respecto a la evaluación prequirúrgica de un joven de 25 años, sano, asintomático, que va a ser sometido a una cirugía de varicocele y tiene un examen físico normal?


- a. Solicitar electrocardiograma (ECG).
- b. Solicitar hemogramas radiografía de tórax.
- c. Solicitar recuento de plaquetas y ECG.
- d. **No solicitar examen pre quirúrgico.**

19. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se previene con la ingesta de calcio durante el embarazo?
- Defectos del cierre del tubo neural.
 - Preeclampsia.**
 - Recién nacidos de bajo peso.
 - Disminución de la densidad ósea materna.
20. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 65 años, obesa que consulta por presentar dolor de rodilla izquierda de varios meses de evolución a predominio vespertino? En el examen físico presenta deformidad articular, temperatura y pierde el área normales, crepitación y leve hipotrofia del cuádriceps.
- Osteoartritis.**
 - Artritis séptica.
 - Artritis gotosa.
 - Rotura de meniscos.
21. ¿Cómo continuaría la evaluación de una paciente de 45 años con metrorragia intermitente y sangrado durante las relaciones sexuales de 6 meses de evolución? Trae a la consulta una biopsia de úlcera de cuello uterino en la cual se informa carcinoma escamoso invasor.
- Tacto recto-vaginal, cistoscopia y rectoscopia.**
 - RNM (Resonancia nuclear magnética) y laparoscopia ginecológica.
 - Tacto recto-vaginal, centellograma óseo y linfografía.
 - Ecografía abdominal y urografía excretora.
22. ¿Cuál de los siguientes exámenes directos de esputo es de una muestra representativa de la vía aérea inferior?
- Menos de 10 células escamosas, más de 25 leucocitos campo de 10X, germen predominante.**
 - Menos de 10 células escamosas, menos de 25 leucocitos campo de 10X y flora polimicrobiana
 - Más de 25 células escamosas, menos de 10 leucocitos en campo de 10X, germen predominante.
 - Menos de 10 células escamosas, más de 15 leucocitos en campo de 10X, flora polimicrobiana.
23. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 25 años que consulta por aumento del flujo vaginal en las últimas semanas y su pareja presenta secreción ureteral pero no quiere consultar? Utiliza anticonceptivos orales combinados.
- En el examen físico el abdomen es blando no doloroso, en el examen ginecológico no tiene dolor y presenta abundante flujo purulento saliendo por el orificio cervical externo.
- Indicar tratamiento con metronidazol ambos.
 - Cultivo de secreción cervical y citar en 48 horas con la pareja para iniciar tratamiento según resultados.
 - Solicita ecografía urgente para definir internación, tratamiento empírico con ceftriaxona y doxiciclina a ambos.
 - Cultivo de secreción cervical, tratamiento con ceftriaxona o azitromicina a ambos.**

24. ¿Cuál de las siguientes determinaciones le solicitaría un paciente que tiene el siguiente hallazgo electrocardiográfico? Ver imagen dos del anexo

- a. CPK.
- b. CPK-MB.
- c. **Potasio sérico.**
- d. Calcio sérico.

IMAGEN 2



25. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer multípara en semana 37 de gestación, que se encuentra en trabajo de parto desde hace 5 horas y en el examen físico tienen dilatación completa del cuello uterino y cabeza posando en segundo plano? La frecuencia cardíaca: fetal es de 170 latidos por minuto.

- a. **Esperar la evolución del parto normal.**
- b. Cesárea.
- c. Aplicar fórceps.
- d. Realizar presión fúndica del útero.

26. Según la guía del Ministerio de Salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), ¿a cuál de los siguientes grupos de pacientes solicitaría Glucemia: en ayunas para detectar la enfermedad en el primer nivel de atención?

- a. Mujeres que tienen ovario poliquístico.
- b. Mujeres con antecedentes de hipertensión inducida por el embarazo.
- c. **Individuos asintomáticos después de los 45 años.**
- d. Todos los individuos tabaquistas.

27. ¿Cuál de los siguientes fármacos previene la insuficiencia renal aguda asociada a la quimioterapia?

- a. **Allopurinol.**
- b. Furosemida.
- c. Nifedipina.
- d. Difenhidramina.

28. ¿Cuál es la causa más probable de hipertensión arterial en una paciente de 42 años que ha presentado en reiteradas oportunidades registros de TA de 160/100 mmHg y calambres en miembros inferiores? Tiene un examen físico normal y en los exámenes de laboratorio constata K⁺ sérico de 3,2 mEq/l.
- Hiperaldosteronismo primario.**
 - Feocromocitoma.
 - Hipertiroidismo.
 - Síndrome de Cushing.
29. ¿Cómo interpretaría el cuadro clínico de un niño de 7 años que es traído al control por una neumonía tuberculosa y está en tratamiento desde hace 25 días con isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida? Tiene hemogramas con plaquetopenia sin otras alteraciones en el examen de sangre periférica.
- En el examen físico se observan lesiones purpúricas y especiales en miembros inferiores de reciente aparición, sin linfadenopatías ni hepatoesplenomegalia.
- Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) por pirazinamida.
 - Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) por rifampicina.**
 - Vasculitis por hipersensibilidad a isoniacida.
 - Vasculitis por hipersensibilidad a etambutol.
30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 13 años que consulta por dolor abdominal periumbilical y vómitos de 24 hs de evolución? Hoy a la mañana empezó con fiebre y el dolor se focalizó en la fosa ilíaca derecha e hipogastrio.
- En el examen físico se observa posición en flexión, respiración superficial, palidez cutánea mucosa y dolor con defensa muscular en fosa ilíaca derecha.
- Folículo ovárico roto.
 - Pielonefritis aguda.
 - Estreñimiento agudo.
 - Apendicitis aguda.**
31. ¿Cuáles de las siguientes características indican la presencia de un síndrome metabólico?
- Diabetes tipo 2 + dislipemia.
 - Diabetes tipo 2 + hipertensión arterial (HTA).
 - Diabetes tipo 2 + hipertrigliceridemia + obesidad central.**
 - HTA + diabetes tipo 2 + dislipemia.
32. ¿Cómo interpreta que la recomendación simvastatina en pacientes con enfermedad coronaria e hipercolesterolemia se considera de tipo A con evidencia grado 1?
- Indica que existe evidencia científica para adoptar la práctica obtenida de al menos un ensayo clínico randomizado, controlado y bien diseñado.**
 - Indica que es una recomendación basada en experiencias clínicas suficientes, estudios descriptivos y opinión de expertos.
 - Indica que existe cierta evidencia científica para adoptar la práctica proveniente de estudios de casos y grupo control.
 - Indica que existe evidencia científica para adoptar la práctica obtenida a partir de estudios de cohortes los equipos y retrospectivos.

33. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de muerte materna postaborto?
- Hemorragia.
 - Intoxicaciones o lesiones por acción cáustica.
 - Lesiones traumáticas.
 - Infección.**
34. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una embarazada de 28 semanas, que estuvo ayer en contacto con un sobrino de 14 años al cual se le diagnosticó varicela? Ella no tiene evidencias de inmunidad.
- Administrar vacuna contra varicela.
 - Administrar gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de las 96 horas posteriores a la exposición.**
 - Administrar gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de las siete horas posteriores a la exposición.
 - Administrar gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de las 96 horas posteriores a la exposición más vacuna contra varicela.
35. ¿Cuál de los siguientes estudios solicitaría una paciente de 40 años, obesa, sin antecedentes patológicos, que fue tratada hace un mes por candidiasis vaginal y que ahora nuevamente presenta el mismo cuadro? La paciente realizó tratamiento con óvulos vaginales con antimicóticos en forma adecuada y no recibió ningún otro tratamiento.
- Orina completa.
 - Hormonas tiroideas.
 - Glucemia.**
 - Hemograma.
36. Por el gasto energético que produce, ¿cuál de las siguientes actividades serían más recomendada para un paciente con sobrepeso?
- Caminar tres veces por semana durante 15 minutos.
 - Andar en bicicleta de paseo 15 minutos tres veces por semana.
 - Hacer tareas de jardinería dos veces por semana.
 - Bailar diariamente durante 30 minutos.**
37. ¿Cuál es la conducta más adecuada de un adolescente de 17 años que tiene dos serologías reactivas (ELISA e IFI) para Enfermedad de chagas, ECG y radiografía de tórax normales?
- Realizar tratamiento con benznidazol.**
 - Repetir la serología con otro método.
 - Control periódico con ECG, radiografía de tórax y ecocardiograma.
 - Solicitar parasitemia y realizar tratamiento con benznidazol.
38. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 53 años, con antecedentes de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, que consulta por disnea de 5 días de evolución en las últimas 48 horas agregó astenia, palpitaciones y mareos con el cambio de decúbito? En el examen físico presenta ingurgitación venosa yugular, hipotensión arterial moderada en decúbito dorsal, caída de la tensión arterial sistólica de 10 mmHg en inspiración profunda y ausencia de choque de punta.
- Taponamiento cardíaco.**
 - Derrame pleural.
 - Neumotórax.
 - tromboembolismo pulmonar.

39. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de anemia a un paciente de 45 años que fue sometido a la antrectomía por carcinoma de estómago?
- Deficiencia de hierro.
 - Aplasia medular.
 - Anemia sideroblástica.
 - Deficiencia de vitamina B12.**
40. ¿Cuál de las siguientes mediciones antropométricas es un marcador de riesgo de morbimortalidad cardiovascular?
- Índice de masa corporal.
 - Índice cintura/cadera.
 - Perímetro de la muñeca.
 - Circunferencia de la cintura.**
41. ¿Cuál es la conducta más adecuada con respecto a la profilaxis antitetánica con un niño de 13 años que presentó una herida cortante por caída en un árbol que fue suturado el día anterior en guardia? Le indicaron gammaglobulina antitetánica y toxoide tetánico. Pero no se consiguió la gammaglobulina y la madre trae el carnet de vacunación del niño en el cual se constata que tiene todas las vacunas aplicadas adecuadamente hasta los 5 años.
- No indica ninguna vacuna por tener el calendario completo.
 - Le recomienda que aplique la gammaglobulina y cambie el toxoide por dT (Doble bacteriana).
 - Le recomienda que aplique la gammaglobulina y cambie el toxoide por dTpa (Triple bacteriana acelular).
 - Le indica solamente dTpa.**
42. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas son de notificación obligatoria?
- Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, chagas y sarampión.**
 - Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, chagas y Escarlatina.
 - Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, chagas y Faringitis por Estreptococo.
 - Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, chagas y Osteomielitis.
43. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 30 años con debilidad muscular intensa y mialgias de 3 semanas de evolución, que en el examen físico presenta reflejos osteotendinosos levemente disminuidos en los exámenes de laboratorio tiene una CPK:800, eritrosedimentación (VSG): 88mm/1hora y FAN positivo?
- Artritis reumatoidea.
 - Lupus eritematoso sistémico.
 - Polimiositis.**
 - Vasculitis sistémica.
44. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de una joven de 12 años que no ha tenido su primera menstruación, no es sexualmente activa y que consulta por flujo vaginal de color blanquecino, sin olor, desde hace 2 meses? No refiere picazón, ardor y dolor. La joven inició el desarrollo mamario a los nueve años de edad, su desarrollo puberal y examen físico son normales.
- Vaginosis bacteriana.
 - Vulvovaginitis por Candida sp.
 - Leucorrea fisiológica.**
 - Tricomoniasis.

45. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención primaria del cáncer de cuello uterino?
- Papanicolaou.
 - Vacunación contra HPV.**
 - Colposcopia.
 - Tacto vaginal.
46. ¿Cuál de las siguientes es una medida que favorece la curación de la úlcera gastroduodenal?
- Evitar comidas ácidas.
 - Evitar el tabaquismo.**
 - Realizar dieta blanda.
 - Evitar el consumo de café o té.
47. ¿Cuál es la conducta más adecuada que un lactante de nueve meses de vida que presenta una gastroenterocolitis aguda y en el examen físico se encuentra afebril, con leve distensión abdominal y signos de deshidratación moderada? No tiene antecedentes de salud significativos.
- Indicar hidratación endovenosa en forma inmediata.
 - Realizar una interconsulta con gastroenterólogo infantil.
 - Indicar un plan de rehidratación oral en la guardia por seis horas.**
 - Recomendar pautas de alarma para la rehidratación en el hogar.
48. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una adolescente que está tomando anticonceptivos orales y lo consulta porque se olvidó tomar el comprimido el día de ayer?
- Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y usar métodos de barrera durante 7 días.
 - Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y usar métodos de barrera los días siguientes.**
 - Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y no realizar descanso.
 - Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos luego descansar siete días y comenzar nueva caja.
49. Teniendo en cuenta la imagen del examen parasitológico, ¿cuál considera es el diagnóstico de un joven de 21 años que presenta diarrea desde hace tres semanas, ha perdido peso y no ha viajado en este período? Ver imagen 6 del anexo
- Amebiasis.
 - Giardiasis.**
 - Blastocistosis.
 - Uncinariasis.



50. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un joven de 19 años que consulta por presentar vómitos y diarrea acuosa desde hace 48 horas?
- Gastroenteritis.**
 - Giardiasis.
 - enfermedad celíaca.
 - Enfermedad inflamatoria intestinal.
51. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una paciente de 29 años, asintomática, que durante el control de salud usted palpó un pequeño nódulo de 0.5 cm el lóbulo derecho de la tiroides y las determinaciones de hormonas tiroideas son normales? El nódulo se visualizó por una ecografía tiroidea y el resto de la glándula es normal.
- Tomografía computada del cuello.
 - Centellograma corporal total con Iodo radioactivo.
 - Remoción quirúrgica del nódulo.
 - Punción con aguja fina.**
52. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 54 años, menopáusica que tiene anemia microcítica hipocrómica?
- Indicar sulfato ferroso y estudiar el tubo digestivo.**
 - Indicar sulfato ferroso hasta completar depósitos y evaluar nuevamente.
 - Descartar patología de médula ósea.
 - Descartar patología ginecológica.
53. ¿Qué indicación considera más adecuada en relación a la alimentación de una recién nacida término con peso adecuado para la edad gestacional (RNT PAEG), que es alimentada con lactancia materna exclusiva cada 2-3 horas desde el nacimiento y durante el control a los 18 días de vida se encuentra sana y pesa 3360 g? Nació por parto eutócico con presentación cefálica de un embarazo controlado sin patología gestacional.
El peso de nacimiento fue 3300 g, y egresó de la maternidad a las 48 horas del nacimiento con peso de 3210 g.
- Continuar con la lactancia materna cada dos o tres horas.**
 - Indicar reemplazo de lactancia materna por fórmula humanizada.
 - Indicar mayor frecuencia de lactancia materna.
 - Indicar complemento.
54. ¿Cuál de los siguientes estudios solicitaría a un paciente de 69 años, sin antecedentes significativos, que consulta por pérdida de peso en los últimos tres meses y trae un hemograma con HB: 8g/dl y volumen corpuscular medio (VCM) 70fl (80-96)? En el examen físico sólo presenta leve palidez de piel y mucosas.
- Tomografía computada de abdomen.
 - Endoscopia digestiva alta y colonoscopia.**
 - Ecografía de abdomen.
 - Radiografía de abdomen simple y endoscopia digestiva alta.

55. ¿Cuál es la intoxicación más probable de un grupo familiar (matrimonio y los hijos adolescentes) que consulta a la guardia durante la madrugada, por vómitos, cefalea, decaimiento y palpitaciones? No tienen antecedentes patológicos.

Uno de los hijos presentó un cuadro compatible con convulsiones.

En el examen físico todos están hipotensos, tienen taquicardia y leve midriasis.

- a. Intoxicación por organofosforados.
- b. botulismo.
- c. Intoxicación por piretroides.
- d. **Intoxicación por monóxido de carbono.**

56. ¿Cuál de los siguientes estudios es más útil para confirmar el diagnóstico de un joven de 20 años, fumador, consulta por disnea al correr, ningún otro síntoma acompañante y que tiene examen físico, hemograma y radiografía de tórax normales?

- a. Espirometría antes y después de broncodilatadores.
- b. **Espirometría antes y después del ejercicio.**
- c. Gases arteriales antes y después del ejercicio.
- d. Medición de lactato antes y después del ejercicio.

57. ¿Cuál es la conducta adecuada con un adolescente de 16 años que consulta porque ha tenido relaciones sin uso del preservativo y quiere realizarse serología de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)?

- a. Pedir serología de VIH previo consentimiento informado de los padres.
- b. Aconsejar no realizar la serología en este momento y brindar consejería sobre uso del preservativo.
- c. Pedir serología de VIH previo consentimiento informado de los padres y del adolescente.
- d. **Pedir serología de VIH previo consentimiento informado del adolescente.**

58. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable de un recién nacido de 14 días que ingresa por presentar fiebre, irritabilidad y cianosis distal? Nació a término por parto vaginal y presentó conjuntivitis purulenta de ambos ojos al nacer.

En el examen físico presenta cianosis distal en miembros inferiores, frecuencia cardiaca 134 x min; temperatura: 38 °C, frecuencia respiratoria: 30 x min.; Peso: 3400 g.

Se le realizaron diferentes estudios y una punción lumbar con el siguiente examen físico químico: 177 células, polimorfonucleares, proteínas totales 1.45 g/l glucorraquia baja.

- a. **Meningoencefalitis por Streptococcus beta hemolítico grupo B.**
- b. Sepsis por citomegalovirus.
- c. Meningoencefalitis Neisseria gonorrhoeae.
- d. Meningoencefalitis por virus herpes.


59. ¿Cuál es la intoxicación más probable en una niña de 5 años, procedente de área rural, que es derivada al hospital por debilidad en miembros inferiores, dificultad para la marcha y caídas frecuentes? La madre refiere que los síntomas se han hecho progresivos en los últimos meses y que ha presentado también episodios de vómito y dolor abdominal.

En los análisis realizados se constató anemia microcítica e hipocrómica, hepatograma y función renal normales.

- a. **Plomo.**
- b. Organofosforados.
- c. Organoclorados.
- d. Tolueno.

60. ¿Cuál es la conducta más adecuada para un bebé nacido en la semana 37 de gestación de una madre con la siguiente serología para hepatitis B: HBsAg reactivo y HBeAg negativo?
- Inmunización activa (vacuna) y pasiva (gammaglobulina) inmediatamente después del parto.**
 - Inmunización pasiva inmediatamente después del parto y activa al año de edad.
 - Solamente inmunización pasiva inmediatamente después del parto.
 - Solamente inmunización activa inmediatamente después del parto.
61. ¿Quién o quiénes están facultados para tomar decisiones sobre alta de internación, o permisos de salida de una persona que cursa una internación psiquiátrica según el capítulo VII de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657)?
- Únicamente el psiquiatra, con autorización del juez.
 - El equipo de salud, con autorización del juez.
 - El equipo de salud, sin requerir autorización del juez.**
 - El juez.
62. ¿Cuál es la conducta más adecuada, luego de las medidas de estabilización iniciales, para una niña de 7 años que ingresa la guardia luego de un accidente automovilístico en la ruta y que se encuentra irritable con trastornos del sensorio, y ha presentado durante el traslado episodio compulsivo y vómitos?
- Realizar radiografía de cráneo y dejar en observación por 12 horas.
 - Realizar tomografía axial computada (TAC) del cerebro y deja de observación 24 horas.
 - Realizar radiografía de cráneo y si es normal dar de alta con cita en una semana.
 - Realizar TAC de cerebro y referir al neurocirujano infantil.**
63. ¿Cuál de los siguientes tratamientos indicaría un paciente de 22 años, asmático de larga data, que ingresa guardia por presentar disnea de 24 horas de evolución que ha empeorado progresivamente a pesar de la utilización de nebulizaciones con ipratropio y salbutamol? Tiene una historia de crisis asmáticas con varias internaciones, una de ellas en terapia intensiva. Tiene una saturación de O₂ 92%.
- Adrenalina subcutánea.
 - Hidrocortisona intravenosa.**
 - Nebulizaciones con beclometasona.
 - Teofilina intravenosa.
64. ¿En cuál de los siguientes cuadros clínicos es posible observar vesículas en el exantema?
- Rubéola.
 - Stevens-Johnson.**
 - Escarlatina.
 - Sarampión.
65. ¿La ausencia de cuál de las siguientes hitos madurativos constituye un signo de alarma en un niño de 18 meses?
- Seguir un dedo que señala un objeto.**
 - Decir mamá u otras palabras simples.
 - Caminar.
 - Subir escaleras gateando.

66. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría una joven de 16 años, que no tiene pareja estable y recientemente ha iniciado relaciones sexuales?
- a. Diafragma.
 - b. **Preservativo.**
 - c. Anticoncepción hormonal + diafragma.
 - d. Anticoncepción hormonal.
67. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios permite diferenciar una hipertensión crónica con una inducida por el embarazo?
- a. **Fondo de ojo.**
 - b. Proteinuria.
 - c. Creatininemia.
 - d. Electrocardiograma.
68. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones corresponden al ECG de un paciente de 50 años que concurre al control de salud? Ver imagen 3 del anexo
- a. Bloqueo de rama derecha.
 - b. Bloqueo auriculoventricular.
 - c. **Sobrecarga ventrículo izquierdo.**
 - d. Sobrecarga de ventrículo derecho.




69. ¿Cuál es la conducta correcta, según la ley 26.529, cuando un paciente solicita un resumen de historia clínica para realizar otra consulta médica a fin de obtener una segunda opinión sobre la enfermedad que está padeciendo?
- a. Entregar una receta con la impresión diagnóstica.
 - b. Solicitar una nota escrita del interconsultor solicitando el resumen de historia clínica.
 - c. Entregar su número de celular para que el otro médico se comuniquen con usted.
 - d. **Entregar resumen de historia clínica.**

70. ¿Cuál de los siguientes elementos puede estar presente en el sedimento urinario de una persona sana y no indique un riesgo para la salud?

- a. Cilindros granulosos.
- b. **Cilindros hialinos.**
- c. Cilindros hemáticos.
- d. Células espumosas.

71. ¿Cuál de las siguientes es la forma correcta de colocar una máscara para reanimar neonato y obtener una ventilación efectiva durante la reanimación cardiopulmonar? Ver imagen 1 anexo

- a. a
- b. b
- c. c
- d. d



72. ¿Cuál de las siguientes conductas es la correcta según las normas de Vigilancia Epidemiológica al asistir en guardia a un niño de 16 meses con exantema febril?

- a. Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y avisar al personal administrativo para que notifique el caso.
- b. **Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia en la ficha de notificación específica y dar aviso a Epidemiología Local.**
- c. Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y en la ficha de notificación específica.
- d. Registrar el diagnóstico a la hoja de atención de guardia y en la ficha de notificación específica y avisará enfermería para que notifique al caso.

73. ¿Cuál es el modo de transmisión que origina con mayor frecuencia brotes de leptospirosis en humanos?

- a. Contacto con sangre de animales infectados.
- b. Ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de animales infectados.
- c. **Contacto con agua o vegetación contaminadas con orina de animales infectados.**
- d. Transmisión interhumana.

74. ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en el segundo día de postoperatorio de colectomía por oclusión intestinal comienza con secreción serohemática a través de los puntos de piel?
- Apertura de la herida y tratamiento antibiótico.
 - Recomendar uso de faja elástica o faja de Montgomery.**
 - Aplicación de azúcar en la herida quirúrgica.
 - Realizar nueva intervención quirúrgica y cierra con puntos capitonados.
75. ¿En cuál de las siguientes causas pensaría para explicar la conducta de un adolescente de 15 años, que es llevado a la consulta por sus padres, porque tuvo un desempeño decreciente en la escuela en los últimos seis meses, está irritable, y no asume responsabilidades domésticas que con anterioridad sostenía? Los padres comentan que también ha cambiado su grupo de amigos y ha disminuido la higiene personal.
- Trastorno Bipolar.
 - Abuso de sustancias.**
 - Depresión mayor.
 - Trastorno de angustia.
76. ¿Cuál considera que es la conducta más adecuada como una adolescente de 15 años que solicita anticonceptivos a la empleada de admisión del Centro de salud?
- Programar un turno para que concurra con alguno de sus padres o tutor.
 - Programar un turno según disponibilidad para realizar consejería.
 - Autorizar la entrega en el día de anticonceptivos a través del personal de admisión.
 - Evaluar en el día a la paciente realizar consejería sobre métodos anticonceptivos.**
77. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada como un niño de 12 años que se ha fracturado un diente definitivo durante una caída?
- Rescatar el fragmento expulsado, mantenerlo en medio húmedo y realizar consulta inmediata**
 - Descartar el fragmento ya que no debe implantarse.
 - Rescatar el fragmento expulsado, envolverlo en una gasa y conducir al odontólogo en las próximas 24 horas.
 - Tomar el diente por la raíz, enjuagarlo y realizar consulta inmediata.
78. ¿Cuál es la conducta más adecuada con un niño de 18 meses, previamente sano que cursa catarro de vías aéreas superiores, se encuentra irritable, con llanto fácil y con un registro de 38 °C en las últimas 24 horas? Es llevado al control en el centro de salud y al realizar endoscopia se observa membrana timpánica izquierda eritematosa, abombada y por transparencias de contenido blanco amarillento.
- Conducta expectante y analgésicos.
 - Ceftriaxona 50 mg/kg/día y antihistamínicos.
 - Amoxicilina 80 mg/kg/día y analgésicos.**
 - Derivación a otorrinolaringólogo.+


79. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un bebé de 2 meses de edad que desde hace 48 horas presenta agitación y dificultad para succionar el pecho? En el examen físico presenta frecuencia cardíaca: 160 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 60/minuto, temperatura axilar 37,6 °C, rales difusos bilaterales y sibilancias respiratorias.

La niña nació a término con peso adecuado para edad gestacional, sin antecedentes perinatales y con desarrollo pondoestatural y psicomotriz adecuados.

- a. Síndrome coqueluchoide.
- b. **Bronquiolitis.**
- c. Neumonía aguda.
- d. Reflujo gastroesofágico.

80. ¿Qué observa en la radiografía de tórax? Ver imagen 4 del anexo

- a. Derrame pleural izquierdo.
- b. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo.
- c. Consolidación del lóbulo inferior izquierdo.
- d. Hidroneumotórax izquierdo.



81. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es útil para evitar la caída de los ancianos en el domicilio?

- a. Utilizar iluminación tenue.
- b. Utilizar sillas sin apoyabrazos.
- c. Bajar el inodoro.
- d. **Instalar barras de agarre en la bañera.**

82. ¿Qué edad tiene un niño que sabe su nombre completo, dibuja algunas formas, y puede saltar en un pie pero aún no dibuja una figura humana completa?
- 6 años.
 - 4 años.**
 - 3 años.
 - 2 años.
83. ¿Qué valoración funcional corresponde, según la escala NYHA (New York Heart Association), a un paciente de 45 años que refiere que la actividad física menor (higienizarse, comer, etc.) le causa palpitaciones y disnea, y se manifiesta confortable en situaciones de reposo?
- Clase funcional I.
 - Clase funcional II.
 - Clase funcional III.**
 - Clase funcional IV.
84. ¿Cuál es el factor desencadenante que sospecha como más probable en un paciente con antecedentes de Epilepsia que recibe tratamiento con fenitoína y presenta cuadro convulsivo, traído por su esposa a la guardia luego de presentar convulsiones hace aproximadamente una hora.?
- En el examen físico el paciente se encuentra sin recuperación completa de la conciencia, afebril; TA: 100/60 mmHG; FC: 110 latidos/minuto; FR: 20/minuto.
- Durante el examen presenta nuevo episodio de convulsión tónica clónica.
- Consumo de alcohol.
 - Traumatismo de cráneo.
 - Hipoxia.
 - Incumplimiento con el tratamiento.**
85. ¿Cuál es la conducta más adecuada con una paciente de 43 años que concurre a la consulta con una mamografía en la que se informa: opacidad nodular irregular, de bordes estipulados en cuadrante superior externo de mama izquierda? En la ecografía se observan nódulos sólidos de 10 × 7 mm, irregulares.
- Citar a control en 6 meses.
 - Solicitar resonancia magnética nuclear.
 - Realizar tumorectomía con biopsia diferida.
 - Solicitar punción para histología.**
86. Según la Ley 17.132 (Ejercicio de la Medicina, odontología y actividades de colaboración), ¿cuál es la conducta correcta, ante la convocatoria que realiza el Ministerio de Salud de la Nación para colaborar en la atención de las víctimas del terremoto que afectó tres provincias del oeste de nuestro país?
- Negarse porque el terremoto no afectó la jurisdicción donde trabaja.
 - Prestar colaboración porque lo requiere la autoridad sanitaria.**
 - Negarse porque no puede abandonar su trabajo en el hospital.
 - Prestar colaboración si recibe los honorarios que percibirá en su actividad privada (lucro cesante).

87. ¿Cuál es la orientación que le brinda a los padres de un niño de 2 años que consultan preocupados por el desempeño escolar de su hijo? El niño está ligeramente retrasado en los hitos de maduración de la motricidad gruesa, se expresa adecuadamente con frases de tres o cuatro palabras y tienen examen neurológico normal.
- Explica que el desarrollo de la motricidad gruesa es un factor asociado al desarrollo intelectual.
 - Explica que el desarrollo del lenguaje es un factor pronóstico de la función intelectual.**
 - Indica interconsulta con psicomotricista o fisioterapeuta para estimar el desarrollo de la motricidad gruesa.
 - Indica consulta psicopedagoga para evaluar función intelectual.
88. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es la causa más común de discapacidad intelectual en la infancia?
- Mielomeningocele.
 - Síndrome de Down.**
 - Parálisis cerebral.
 - Hipoacusia neurosensorial.
89. ¿Qué profesionales deben realizar la notificación según la Ley Nacional 15.465 de Enfermedades de Notificación Obligatoria?
- Médicos.
 - Médicos y bioquímicos.
 - Médicos, bioquímicos, veterinarios.**
 - Médicos y veterinarios.
90. Como parte de un estudio nutricional, en un centro de salud se está realizando una investigación sobre la evolución de la obesidad de los niños y adolescentes atendidos en los últimos 10 años. Se trabaja con tablas anuales que registran el peso y la altura de todos los pacientes atendidos. ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central le permitirá analizar la distribución de peso y altura de los niños y adolescentes evaluados?
- Media**
 - Coefficiente de variación.
 - Modo.
 - Desvío estándar.
91. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para un paciente de 64 años, tabaquista, que presenta tos, pérdida de peso y hemoptisis y que en una tomografía de tórax presenta un nódulo sólido en el campo superior derecho de 6 cm, adenomegalias parahiliares e ipsilaterales? Se realizó una punción aspirativa y el estudio patológico estableció el diagnóstico de cáncer de pulmón en células no pequeñas.
- Cirugía resectiva, con quimioterapia adyuvante.**
 - Radioterapia adyuvante.
 - Quimioterapia más radioterapia y control entre tres meses.
 - Quimioterapia y control en 6 meses.

92. ¿Cuál de los siguientes métodos complementarios considera adecuado para completar el diagnóstico de un paciente de 50 años que tiene TSH disminuida y T4 libre elevada?
- Resonancia nuclear de hipófisis.
 - Tomografía computada de cuello.
 - Punción con aguja fina (PAAF).
 - Gammagrafía tiroidea (I131).**
93. ¿Cuál de los siguientes signos permiten reconocer el inicio del trabajo de parto?
- Reblandecimiento y centralización del cuello uterino.**
 - Pérdida de líquido amniótico.
 - Contracciones de intensidad intermedia y frecuencia no regular.
 - Pérdida del tapón mucoso.
94. ¿A qué edad se debe aplicar a las niñas la vacuna contra el virus del papiloma humano (HVP)?
- 9 años
 - 11 años**
 - 13 años
 - 16 años
95. ¿Cuál es la conducta más adecuada para garantizar el cuidado de un recién nacido que es hijo de una madre soltera de 15 años, sin controles durante el embarazo, que vive sola con su abuela de 80 años en un barrio precario? El bebé fue producto de un embarazo no deseado y nació por parto vaginal con buen peso para la edad gestacional, y tanto él como su madre se encuentran en buenas condiciones de salud luego de 48 horas del parto.
- Dar de alta y citar a control en una semana.
 - Dar de alta y pautar controles periódicos.
 - No dar de alta hasta establecer seguimiento por el pediatra del centro de salud más próximo a su residencia.
 - No dar de alta hasta establecer consejería y consultar a equipo interdisciplinario del Centro de Salud más próximo a su residencia.**
96. ¿Cuál considera puede ser la causa más probable por la que un paciente de 25 años que fue sometido a una colecistectomía laparoscópica hace 10 horas, comienza con débito bilioso por el drenaje abdominal? Se encuentra afebril y son dolor abdominal.
- Lesión intestinal.
 - Deslizamiento de la ligadura del conducto cístico o bilirragia de los conductos aberrantes.**
 - Ligadura inadvertida de arteria hepática.
 - Estenosis de vía biliar por lesión térmica de la misma.
97. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica con un niño de 5 años que ha sido llevado reiteradamente a la guardia del hospital por síntomas extraños que no coinciden con ninguna enfermedad? Se lo ha internado en varias oportunidades por síndrome febril de varios días de evolución referido por su madre, que luego durante la estadía hospitalaria no pudo ser confirmado.
- Maltrato infantil.**
 - Madre hipocondríaca.
 - Fiebre de origen desconocido.
 - Fiebre facticia.

98. ¿Qué indica la presencia de una onda P picuda con ramas simétricas en el electrocardiograma?
- a. Crecimiento de la aurícula izquierda.
 - b. Crecimiento de la aurícula derecha.**
 - c. Crecimiento del ventrículo izquierdo.
 - d. Crecimiento del ventrículo derecho.
99. ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente de 35 años, sin antecedentes patológicos, que fue tratado por una bronquitis aguda con amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 10 días y consulta por la persistencia de todos no productiva una semana después de haber finalizado el tratamiento?
- a. Indicar loratadina 10 mg/día por 3 días.
 - b. Explicar que la tos se resolverá espontáneamente.**
 - c. Solicitar radiografía de tórax.
 - d. Indicar levofloxacina 700 mg/día por 5 días.
100. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe descartar hipertensión arterial secundaria?
- a. Mujer, 42 años, índice de masa corporal (IMC) 24, TA 140/90 mmHg.
 - b. Mujer de 30 años, IMC 24, TA 150/100 mmHg.**
 - c. Hombre de 50 años, obeso, TA 160/90 mmHg.
 - d. Hombre de 60 años, IMC 35, TA 150/100 mmHg.