

DIRECCION de LABORATORIO Y CONTROL
DPTO. DIAG. ENF. INFECT. EMERGENTES Y REEMERGENTES
SECTOR LEPTOSPIROSIS
Tel: 0221-4223310.

email: infectocontagiosos@yahoo.com.ar
leptospirosis_lcsp@ms.gba.gov.ar

LEPTOSPIROSIS

Denuncia obligatoria de enfermedades
Ley 15.465 - Decreto 2771/79

DATOS DEL PACIENTE

Apellido y Nombres: _____ Edad _____ Sexo F ☐ M ☐

Domicilio: _____ DNI: _____

Localidad _____

Ocupación: Tareas rurales ☐ Empl. frigorífico ☐ Obrero constr. ☐ Otra: ☐

SINTOMAS

FECHA DE LOS PRIMEROS SINTOMAS: ____ / ____ / ____ TOMA DE MUESTRA: ____ / ____ / ____.

EL PACIENTE ESTA HOSPITALIZADO? :Si ☐ No ☐ ¿ESTA BAJO TRATAMIENTO ANTIBIOTICO?:Si ☐ No☐

Ictericia		Cefalea repentina		Insuficiencia renal	
Inyecc. conj. bilat.		Síndrome Meningeo		Nauseas/vomitos	
Mialgias en pantorrillas		Fiebre (39° o más)		anorexia	
Mialgias resto del cuerpo		Neumonía		Erupción cutanea	
Diarrea		Hemorragia pulmonar		Otros:	

DATOS DEL LABORATORIO

ERS (1 hora) _____

LEUCOCITOS _____

PLAQUETAS (valor) _____

Uremia	Normal		Elevada	
Bilirrubina Directa	Normal		Elevada	
TGP	Normal		Elevada	
CPK	Normal		Elevada	

FUENTE PROBABLE DE INFECCIÓN

Contacto con: Animales domésticos ☐ Roedores ☐ Alcantarillas ☐

Inundaciones ☐ Ríos / Arroyos ☐ Laguna ☐

OTROS _____

NOTIFICACIÓN

Establecimiento _____ Tel. Fax: _____

Domicilio _____ Localidad _____

e-mail: _____

MÉDICO TRATANTE: _____
Nombre y Apellido

Firma y Sello

LEPTOSPIROSIS

ENVÍO DE MUESTRAS

Envase para envío de material biológico:

Colocar la muestra en el envase primario (preferentemente de polipropileno), con tapa a rosca.

Identificar la muestra (**ROTULAR**) **CON N° Y DATOS DEL PACIENTE QUE CONCUERDEN CON LOS DE LA FICHA.**

Envolver él o los envases primarios con material absorbente.

Introducir en el envase secundario. Agregar material absorbente para impedir cualquier movimiento durante el traslado.

Cerrar la tapa a rosca, del envase secundario de plástico.

Introducir el envase secundario en el envase terciario.


Colocar el protector de cartón, sobre la tapa del envase secundario.

Incluir la información sobre la muestra.(ficha) **CON N° Y DATOS DEL PACIENTE QUE CONCUERDEN CON LOS DEL ROTULO DEL ENVASE PRIMARIO.**

Cerrar el envase terciario.

Adherir la etiqueta autoadhesiva, identificando el contenido como material infeccioso y/o perecedero.

Asegurar el cierre con cinta transparente de embalaje.



A. HEMOCULTIVO

Se enviará sangre total para aislamiento de leptospiras cuando:

- El paciente tenga una evolución no mayor a 10 (diez) días.
- Preferentemente, en estado febril.
- Unicamente si no fue tratado con antibióticos.

Procedimiento:

- 1) Colocar en un tubo estéril con **heparina** o **EDTA** (vacutainer) 8 a 10 ml de sangre entera y enviar refrigerada lo mas rápido posible.
- 2) **También puede solicitar a este Laboratorio medios de transporte adecuados y coordinar el envío del material. (colocar 0,5 ml de sangre recién extraída de la jeringa en frasco con medio para leptospiras , en condiciones adecuadas de esterilidad. Mantener a temperatura ambiente hasta su remisión.**
- 3)Presentar FICHA EPIDEMIOLOGICA COMPLETA.

B. LIQUIDO CEFALORAQUIDEO

Se enviará L.C.R. Para aislamiento de leptospiras cuando:

- El paciente presente signos meníngeos.
- Tenga una evolución no mayor de 10 (diez) días.

Procedimiento:

- 1)Extraer en forma estéril y colocarlo en un frasco con tapa a rosca estéril.
- 2)**Solicitar a este Laboratorio medios de transporte adecuados y coordinar el envío del material. (idem ítem A-2)**
- 3)Presentar FICHA EPIDEMIOLOGICA COMPLETA.

C. ORINA

Se enviará orina para el aislamiento de leptospiras cuando:

- La evolución del paciente supere los 7 días.
- No haya sido medicado con antibióticos.

Procedimiento:

- 1) Toma de muestra: chorro medio, punción de sonda , o punción suprapúbica ,como para urocultivo (extremar las condiciones de esterilidad), colocar en un frasco estéril con tapa a rosca.
- 2) **Solicitar a este Laboratorio medios de transporte adecuados y coordinar el envío del material. (idem ítem A-2)**
- 3) Presentar FICHA EPIDEMIOLOGICA COMPLETA.

D. SUERO

Se enviará suero refrigerado cuando se sospeche de un caso de leptospirosis (fiebre de etiología desconocida y epidemiología compatible). Se acompañará a cada una de las muestras anteriores (Sangre, L.C.R. y Orina) y además cuando se hayan superado los 7 (siete) días de evolución.

Presentar FICHA EPIDEMIOLOGICA COMPLETA.

CUALQUIER MUESTRA DEBE SER REFRIGERADA, NUNCA CONGELADA.

SE DEBERÁ ENVIAR OTRA MUESTRA DE SUERO CON 7 a 15 DÍAS DE INTERVALO, PARA COMPLETAR EL ESTUDIO.

Los días y el horario de recepción de muestras es de Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.