

CASO 1: Varón de 45 años



Médico: Buenos días. Pase, por favor. ¿Qué le trae hoy a consulta?

Paciente: Buenos días, doctor. Desde ayer por la mañana noto que la mitad derecha de mi cara no se mueve bien. Me cuesta hablar, sonreír y cerrar el ojo.

Médico: ¿Puede describirme cómo empezó todo?

Paciente: Sí. Me desperté notando como una sensación rara en la cara, como tirantez. Pensé que se me pasaría, pero a lo largo del día empecé a ver que la boca se me desviaba y no podía levantar la ceja derecha.

Médico: ¿Los síntomas aparecieron de manera brusca o progresiva?

Paciente: Fueron bastante rápidos. En cuestión de horas ya tenía claramente afectado todo ese lado de la cara.

Médico: ¿Ha mejorado o empeorado desde entonces?

Paciente: Diría que está igual o un poco peor. Sobre todo el ojo, que no puedo cerrarlo bien y se me reseca muchísimo.

Médico: ¿Ha sentido dolor alrededor del oído o detrás de la mandíbula?

Paciente: Sí, sobre todo ayer. Un dolor sordo detrás de la oreja derecha.

Médico: ¿Ha notado cambios en el gusto?

Paciente: Sí, como si la comida no tuviera sabor en parte de la lengua.

Médico: ¿Le ha molestado el ruido más de lo habitual?

Paciente: A veces algunos sonidos me resultan demasiado fuertes del lado derecho.

Médico: ¿Ha tenido lagrimeo excesivo o, por el contrario, resequedad del ojo?

Paciente: Resequedad. Siento que el ojo se me queda demasiado abierto.

Médico: ¿En qué trabaja usted?

Paciente: Trabajo como **responsable de atención al cliente en una empresa de logística**. Paso muchas horas hablando con clientes, tanto por teléfono como en persona.

Médico: ¿Y cómo le está afectando esta situación en su trabajo?

Paciente: Bastante, la verdad. Me cuesta pronunciar bien algunas palabras y noto que se me escapa la saliva si hablo mucho. Además, la expresión facial es importante cuando atiendo a clientes cara a cara, y ahora la mitad de mi cara no responde. Me siento inseguro y evito mirar directamente a las personas porque temo que se note demasiado.

Médico: ¿Ha tenido dificultad para comer o beber mientras está en el trabajo?

Paciente: Sí, se me cae un poco el líquido al beber si no tengo cuidado. Y para comer necesito hacerlo despacio porque los alimentos se me quedan en la mejilla del lado afectado.

Médico: ¿Padece alguna enfermedad crónica?

Paciente: Tengo hipertensión controlada con medicación. Nada más importante.

Médico: ¿Ha tenido infecciones recientes, resfriados o fiebre?

Paciente: Hace una semana tuve un resfriado leve, con algo de congestión, pero nada más.

Médico: ¿Algún traumatismo, golpe en la cabeza o intervención dental reciente?

Paciente: Ninguno.

Médico: ¿Algún antecedente familiar de problemas neurológicos?

Paciente: No, que yo sepa.

Médico: ¿Tiene dificultad para mover brazos o piernas?

Paciente: No, sólo es la cara.

Médico: ¿Ha tenido mareos, visión doble o dolores de cabeza intensos?

Paciente: No, nada de eso.

Médico: Cuando intenta sonreír, ¿se desvía la boca hacia un lado?

Paciente: Sí, se va claramente hacia el izquierdo. El derecho no responde.

Médico: ¿Puede cerrar el ojo del lado afectado completamente?

Paciente: No, queda un huequito. A veces tengo que ayudarme con la mano para parpadear.

Médico: ¿Cómo está llevando esta situación emocionalmente?

Paciente: Me tiene preocupado. En mi trabajo estoy siempre de cara al público y ahora me da vergüenza. Me da miedo que se piense que estoy sufriendo un ictus o que estoy enfermo contagioso. Y también me preocupa no poder hacer bien mi trabajo si esto dura mucho.

Médico: Entiendo su preocupación. Con lo que me comenta y lo que observo, es muy probable que se trate de una parálisis facial periférica, posiblemente del tipo de parálisis de Bell. Vamos a comenzar tratamiento lo antes posible y veremos cómo evoluciona.

Paciente: Muchas gracias, doctor. Aprecio que me explique todo tan claro.