

Každý příklad píše na samostatnou stránku a ofoťte do samostatného souboru, jehož jméno (bez přípony) je číslo příkladu.

Každý příklad musí mít nejen odpověď, ale i postup. Odpověď bez postupu se nepočítá.

1. **(5b)** Stroj na lisování plastů umí vyrábět dva druhy výrobků (v jeden okamžik ovšem umí vyrábět jen jeden druh), hadičky a gumičky. Hadičky vyrábí rychlostí 200 kg/hod, gumičky rychlostí 140 kg/hod. Je namítáno, že hadiček se nesmí vyrobit více než 6000 kg a gumiček se nesmí vyrobit více než 4000 kg. Z prodeje hadiček je zisk 25 Kč/kg, z prodeje gumiček 30 Kč/kg. Kolik kg máme vyrobit hadiček a gumiček, chceme-li největší zisk a máme-li k dispozici 40 hodin práce stroje? Cenu surovin a cenu za běh stroje nepočítáme. Napište jako lineární program.
2. **(4b)** V geometrii počítačového vidění se vyskytuje rovnice $\mathbf{x}^T \mathbf{F} \mathbf{y} = 0$, kde $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ jsou známé vektory a $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ je neznámá matice. Tato rovnice se dá zapsat ve tvaru $\mathbf{a}^T \mathbf{f} = 0$, kde $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^9$ je sloupcový vektor vytvořený ze sloupečků matice \mathbf{F} zapsaných pod sebou a $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^9$ je sloupcový vektor, jehož složky jsou výrazy obsahující složky vektorů $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ a $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$. Najděte vektor \mathbf{a} .
3. Máme podprostor $U = \text{span}\{(1, 2, 0), (0, 1, -1)\}$ prostoru \mathbb{R}^3 .
 - (a) **(2b)** Najděte libovolnou bázi podprostoru U^\perp .
 - (b) **(4b)** Najděte ortogonální projekci vektoru $\mathbf{x} = (-1, 1, 0)$ na podprostor U . Z možných postupů výpočtu zvolte takový, který vykoná co nejméně aritmetických operací (plus, mínus, krát, dělení) za předpokladu, že už máte bázi podprostoru U^\perp . Tento postup jednoznačně popište.
4. Hledáme extrémy funkce $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + 2y$ na množině $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 4x + y^2 = 0\}$.
 - (a) **(3b)** Úlohu vyřešte algebraicky. U každého extrému napište, zda je lokální nebo globální. Pro každý stacionární bod odůvodněte, proč je to minimum, maximum nebo nic z toho. K tomu nemusíte použít podmínky druhého řádu, ale můžete uvést jiný argument (vycházející např. z náčrtku).
 - (b) **(3b)** Ověřte výsledek úvahou pomocí náčrtku. Na náčrtku musí být množina X , všechny extrémy, a vrstevnice funkce f procházející každým extrémem.
5. Jsou dány body $(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n) \in \mathbb{R}^3$. Hledáme čísla $a, b \in \mathbb{R}$ taková, aby součet druhých mocnin (kolmých) vzdáleností bodů od roviny $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = ax + by\}$ byl minimální.
 - (a) **(3b)** Má tato úloha vždy optimální řešení? Vysvětlete.
 - (b) **(3b)** Napište algoritmus, který spočítá čísla a, b .
6. **(4b)** Máme dvě rovinné křivky popsané rovnicemi $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = a$ a $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = b$, kde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ a $a, b \in \mathbb{R}$. Hledáme průsečík těchto křivek Newtonovou metodou. Napište iteraci metody.
7. Jsou dány spojitě diferencovatelná funkce $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, nenulový vektor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ a číslo $b \in \mathbb{R}$. Hledáme vzdálenost množiny $X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$ od nadroviny $H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} = b\}$.
 - (a) **(3b)** Formulujte tuto optimalizační úlohu. Ve vaší formulaci musí být jednoznačně vidět, co jsou proměnné, co účelová funkce a co omezující podmínky.
 - (b) **(4b)** Dokažte toto tvrzení: Nechť \mathbf{x} je bod množiny X , který je nejblíže nadrovině H . Jestliže $X \cap H = \emptyset$ a $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$, pak tečný prostor k množině X v bodě \mathbf{x} je rovnoběžný s H . (Nápověda: můžete použít podmínky prvního řádu na extrémy vázané rovnostmi.)
 - (c) **(4b)** Najděte vzdálenost dvou křivek v rovině: přímky $y = 2x - 3$ a paraboly $y = x^2$.
8. Máme lineární program $\min\{\mathbf{b}^T \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{0} \leq \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{1}\}$, kde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ jsou dány.
 - (a) **(5b)** Napište duální úlohu a upravte ji do co možná jednoduchého tvaru (jednoduchost se hodnotí).
 - (b) **(3b)** Jaké musí být \mathbf{A} a \mathbf{b} , aby primární úloha měla optimální řešení? Odpověď napište co možná výstižně a jednoduše. Odpověď odůvodněte. (Nápověda: můžete využít výsledek minulého podúkol.)

Bodů celkem: 50