कोंबड्यांचे आजार, लक्षणे व त्यावरील औषधांची यादी

1. मरेक्स रोग (Mareks Disease)



लक्षणे

- पंख गळणे
- वजन कमी होणे
- मान गळून जाणे अथवा लकवा येणे
- लंगडणे
- तुऱ्याचा रंग जांभळा होणे
- श्वास घेताना त्रास होणे
- पंखात लकवा येणे

प्राथमिक उपचार

- योग्य लसीकरण आवश्यक आहे.
- फार्मची योग्य स्वच्छता नियमितपणे करणे आवश्यक आहे

औषधे

- Marek's लस

2. एस्पर्जिलोसिस रोग

(ASPERGELOSES) बुरशीजन्य संसर्ग आहे



लक्षणे

- ताप येणे
- अन्न पाणी सोडणे
- तोंडाने श्वास घेणे
- जोराने श्वास घेणे
- पिल्ले अशक्त होणे
- मान जाड होणे
- थर थर कापणे

प्राथमिक उपचार

- शेडमधील खालील तुस व कोंडा बदलावा
- धान्यात ओलावा नाही याची खात्री करावी

औषधे

- Antibiotic देणे
- कॉपर सल्फेट ०. ५ ग्राम १ लिटर पाण्यात द्यावे
- २५ ग्राम कॉपर सल्फेट १५ लिटर पंपात घेऊन धान्याची व पाण्यानी भांडी बाजूला काढून फार्म वर फवारणी करावी







3. गाऊट रोग (Gout Disease)



लक्षणे

- पांढरी विष्ठा (संडास) करणे
- पातळ विष्ठा (संडास) करणे
- पायाला किंवा बोटांना सूज येणे

प्राथमिक उपचार

- प्रथम युरोफ्रेश औषध द्या जे शरीरातून युरिक ॲसिड काढून टाकते. त्यानंतर २ दिवस नेफ्रोकेअर औषध द्या.

औषधे

- Urofesh
- Nephrocare





4. व्हिटॅमिनची कमतरता
(Vitamin Deficiency)




लक्षणे
- मान वाकणे
- पाय वाकणे

प्राथमिक उपचार
- मल्टीविटामिन द्या

औषधे
- Vimeral
- Multistar
- B-Complex








5. इकोलाई संसर्ग (E-Coli)





लक्षणे

- एका जागेवर बसून राहणे
- अन्न पाणी सोडणे
- डोळे बारीक होणे
- पाय सुकणे
- डोक्याला सूज येणे
- अमोनिया गॅस बनणे

प्राथमिक उपचार

- सर्व पाण्याची भांडी स्वच्छ करा.
- पक्ष्यांना स्वच्छ पाणी द्या

औषधे

- Enrocin BH Antibiotic देणे





6. पुलोरम रोग(Pullorum Disease)



लक्षणे

- पिल्लांची पांढरी विष्ठा मागच्या बाजूला चिकटलेली असते
- योग्य ब्रूडिंगमध्येही पिलांना थंडी जाणवते.

प्राथमिक उपचार

- संक्रमित पिल्ले इतर पिल्लांपासून वेगळी करा.
- Antibiotic+Multivitamin देणे

औषधे

- Lexin powder Antibiotic देणे



7. रक्ती हगवण (coccidiosis)



लक्षणे

- रक्ती हगवण येणे
- जुलाब होणे
- कमकुवत होणे
- अन्न पाणी न खाणे
- डोळे मिटून बसून राहणे

प्राथमिक उपचार

- संक्रमित कोंबडीला इतरांपासून वेगळे करा.
- चांगला आहार द्या

औषधे

- एम्प्रोलियम पावडर - 30 ग्रॅम पावडर 25 लिटर पाण्यात 5-7 दिवसांसाठी १०० पिलांसाठी
- सुपर कॉक्स - १४ दिवसांच्या वयाच्या पिलांसाठी २ ग्रॅम पावडर १ लिटर पाण्यात 5-7 दिवसांसाठी देणेसुपरकॉक्स - ४ ते ५ आठवडे वयाच्या पिलांसाठी ४ ग्रॅमपावडर १. ५ लिटर पाण्यात 5-7 दिवसां साठी देणेसुपरकॉक्स - ८ ते १० आठवडे वयाच्या पिलांसाठी ६ ग्रॅम पावडर २ लिटर पाण्यात 5-7 दिवसांसाठी देणे





8. रानीखेत रोग(Newcastle Disease ND)

लक्षणे

- मान झटकणे
- लकवा येणे
- मांन वाकडी होणे अथवा आकाशाकडे बघणे
- हिरवी विष्ठा करणे
- अन्न पाणी न खाणे

प्राथमिक उपचार

- ६,२१,५१ दिवशी राणीखेत लस देणे
- 5ml Paracetamol
  +
  2 limcee Vitamin C tablets
  +
  2 Evion 400 Tablets
  +
  2 Litre Water
- हे सूत्र पक्ष्यांना ५ दिवसांसाठी द्या.

औषधे

- Paracetamol लहान पोरांचा
- Limcee Vitamin C
- Evion 400 Vitamin E





9. गंबोरो (Infectious Bursal Disease (IBD)

लक्षणे

- पाय दाबून खाली बसणे
- पंख पसरून बसणे
- डोके जमिनीवर ठेवणे
- शौचाच्या जागी स्वतः चावणे किंवा टोचा मारणे
- शौचाला पिवळी व पातळ करणे
- अन्न पाणी न खाणे

प्राथमिक उपचार

- ६,२१,५१ दिवशी राणीखेत लस देणे
- 5ml Paracetamol

+

2 limcee Vitamin C tablets

+

2 Evion 400 Tablets

+

2 Litre Water

- हे सूत्र पक्ष्यांना ५ दिवसांसाठी द्या.

औषधे

- Paracetamol लहान पोरांचा
- Limcee Vitamin C
- Evion 400 Vitamin E





10. संसर्गजन्य ब्रॉंकायटिस(Infectious Bronchitis IB)

लक्षणे

- कोंबडीमध्ये तोंड उघडे श्वास घेणे
- श्वास घेताना कोंबडीतून शिट्टीचा आवाज येतो.
- डोळ्यातून सतत पाणी वाहते
- डोळ्यांजवळ केस गळतात
- कोंबडी माणसांसारखी सरळ चालते.

प्राथमिक उपचार

- IB लस
- Tetracycline पावडर पान्यात देने
- इलेक्ट्रोलाइट पावडर without रक्त बफर सोडियम

औषधे

- Tetracyline powder
- Electrolyte powder





11. क्रोनिक रेस्पोरेटरी डिसेस (CRD)

लक्षणे

- कोंबडीला शिंका येणे
- मान झटकणे
- डोळ्यातून व नाकातून पाणी येणे
- अन्न पाणी कमी खाणे
- डोळे बंद करून उभे राहणे
- शौचास पांढरी होणे
- हया आजाराच्या कोंबड्यांचे शवविच्छेदन केल्यानंतर असे दिसून येते कि कोंबडीचे हृदय मोठे झाले आहे आणि श्वसन नलिकेत कफ जमा झालेला आहे

प्राथमिक उपचार

- १०० ग्राम लसूण
- १०० ग्राम आले
- ५० ग्राम ओवा
- २० काळी मिरी
- १० लवंग
- आर्धा चमचा हळद पावडर
- ५० ग्राम गुळ
- वरील सर्व एकत्र करून ५०० मिली पाण्यामध्ये १० ते १५ मिनिटे उकळून घ्यावे साधारणपणे ४०० मिली काटा होईपर्यंत उकळावे नंतर थंड झाल्यावर न गाळता कोंबड्यांच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये चहाचा कपभर मिसळावे, फार्म छाया सगळ्या भांड्यांमध्ये प्रत्येकी १ कप मिसळावे. आठवड्यातून एकदा कोंबड्याना दिल्यावर आपल्या फार्म मध्ये CRD येत नाही. तयार झालेले मिश्रण ४५ दिवसापर्यंत प्लास्टिक च्या बाटली मध्ये ठेवू शकतो

औषधे





12. फाउल पॉक्स(Fowl Pox)



लक्षणे

- तोंडावर किवा तुर्यावर फोड्या येणे

प्राथमिक उपचार

- फाऊल फॉक्स झालेल्या जागी डेटॉल किंवा सपट लोशन हलक्या हाताने चोळून लावावे ३ ते ५ दिवसांत फरक पडतो. किंवा
- कडुलिंबाचा पाला बारीक पावडर करून त्यात थोडे मोहरीचे तेल मिसळून जखमांवर हलक्या हाताने चोळावे फरक पडतो.

औषधे

- ह्या रोगावरची पहिली लस ४२ ते ४५ दिवसांत द्यावी लागते (0.25 एमएल) ह्या रोगावरची दुसरी लस ९० ते १०० दिवसांत द्यावी लागते (0.5 एमएल)
- THUJA 200 (थुजा 200) - 10 मिली प्रति 100 पिल्ले 2 लिटर पाण्यात 5 दिवसांसाठी



13. संसर्गजन्य कोरिझा(Infectious Coryza)



लक्षणे

- डोळ्यातून पाणी येणे
- नाकातून पाणी येणे
- डोळे चिकटणे
- डोळ्यात घाण जमा होणे
- श्वासोच्छवास घेण्यास त्रास होणे

प्राथमिक उपचार

- बाधित कोंबड्यांना लगेचच फार्मच्या इतर कोंबड्यांपासून वेगळे ठेवा.
- कोंबडीचा चिकटलेला डोला स्वच्छ करुण घेण

औषधे


- AZYTHROMYCIN द्रव / पावडर - ५ मिली/५ ग्रॅम औषध, १ लिटर पाण्यात 100 पिल्लांसाठी, २-३ दिवस ४ ते ५ आठवड्याच्या पिलांसाठी तसेच मोठ्या कोंबड्यांसाठी १० मिली / १० ग्रॅम औषध, ३ लिटर पाण्यात प्रत्येकी 100 पिल्लांसाठी/ कोंबड्यांसाठी, २-३ दिवस
- BETNESOL बेटनेसॉल - एन (आय ड्रॉप्स) GENTAMYCIN जेंटामायसिन (आय ड्रॉप्स) दिवसातून २ वेळा एक थेंब कोंबडीच्य डोळ्यामध्ये कुठल्याही वेळी टाकू शकता







14. कॅनिबालिझम(CANABALISM)



लक्षणे

- प्रोटीन, कॅल्शियम कमी होणे किवा कमी देणे
- मादी कोंबडीच्या तुलनेत नर कोंबडीची संख्या जास्त आहे.
- कोंबड्याना जागेची कमतरता भासने

प्राथमिक उपचार

- Proper Nutrition

औषधे

- Himax Cream -हे क्रेमआयन जखमेवर लावा



15. लंगडेपणा आजार

लक्षण

- कॅल्शिअम ची कमी होणे
- व्हिटॅमिन B ची कमी होणे
- व्हिटॅमिन E ची कमी होणे

प्राथमिक उपचार

- १ लिटर गावरान गाईच्या कच्च्या दूधामध्ये १०० ग्राम साखर मिसळून ते १०० पिल्लाना आणि मोठ्या ५० कोंबड्याना ३ दिवस देणे, लंगडेपणा कमी होतो

औषधे

- न्यूरोबियन फोर्ट (NEUROBION FORTE) - 1 टॅब्लेट पाण्यात विरघळवून 200 पिल्ले किंवा 50 कोंबड्यांवर पिण्याच्या पाण्यात मिसळून ५ दिवस देणे
- न्यूरोकाइंड-प्लस (NEUROKIND-PLUS VET) - पायात किंवा डाव्या विंगमध्ये 0.5 एमएल इंजेक्शन कोंबड्याना दिवसातून दोनदा ३ दिवस देणे
- ट्रायबिवेट (TRIBIVET) - 0.5 एमएल इंजेक्शन कोंबडीच्या पायात किंवा डाव्या पंखात दिवसातून एकदा दिवसाआड ३ दिवस देणे







16. पोटॅट जंत होन (Worms inside Chicken Stomach)

लक्षणे	प्राथमिक उपचार	औषधे
• वजन कमी होणे • मल मध्ये जंत दिसतात	• दार 30 दिवस लिंबाचा पल्याचा रस पणीत मिक्स करूण दे	• Albomar



- धन्यवाद