

Cálculo I-C

Slides de apoio às aulas


Integral de Riemann. Teorema Fundamental do Cálculo  
Integral. Cálculo de áreas.

Departamento de Matemática  
Universidade Aveiro

Slides com ligeiras adaptações de outros já existentes fortemente baseados nos textos da Prof.  
Doutora Virgínia Santos (indicados na bibliografia).



# Motivação

**Questão:** Como determinar um valor aproximado para a área  $A$  da região do plano delimitada pelo gráfico de uma função contínua e positiva  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , pelo eixo das abscissas e pelas retas de equações  $x = a$  e  $x = b$ ?



# Motivação

Esta área pode ser aproximada de diversas formas. Por exemplo, como a soma das áreas de rectângulos:



# Motivação

Se denotarmos por  $s_{\mathcal{P}}(f)$  e  $S_{\mathcal{P}}(f)$ , respetivamente, a soma das áreas dos rectângulos da 1ª figura e da 2ª figura do slide anterior, podemos concluir que

$$s_{\mathcal{P}}(f) \leq A \leq S_{\mathcal{P}}(f),$$

isto é,  $s_{\mathcal{P}}(f)$  é uma aproximação por defeito da área  $A$  e  $S_{\mathcal{P}}(f)$  é uma aproximação por excesso da área  $A$ .

Como veremos mais à frente,  $s_{\mathcal{P}}(f)$  e  $S_{\mathcal{P}}(f)$ , são designadas, respetivamente, de soma inferior de Darboux e de soma superior de Darboux da função  $f$  relativamente à partição  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_5\}$ .

**Questão:** Como determinar o valor (exato) para a área  $A$  da região do plano delimitada pelo gráfico de uma função contínua e positiva  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , pelo eixo das abcissas e pelas retas  $x = a$  e  $x = b$ ?

Para responder a esta questão, iremos introduzir um novo conceito, o **integral de Riemann**.

# Partição de um intervalo

**Definição:** Chama-se **partição do intervalo**  $[a, b]$  a todo o conjunto finito de pontos de  $[a, b]$

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

tal que

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

**Nota:** Observe que  $\mathcal{P}$  determina  $n$  subintervalos  $[x_{i-1}, x_i]$  de  $[a, b]$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  e

$$[a, b] = \bigcup_{i=1}^n [x_{i-1}, x_i].$$

**Definição:** Uma partição  $\mathcal{P}^*$  de  $[a, b]$  diz-se um **refinamento** da partição  $\mathcal{P}$  se todos os pontos de  $\mathcal{P}$  forem pontos de  $\mathcal{P}^*$ . Neste caso, também se diz que  $\mathcal{P}^*$  é **mais fina** do que  $\mathcal{P}$ .

# Somas de Darboux

Sejam  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  limitada e  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  uma partição de  $[a, b]$ . Para cada  $i = 1, \dots, n$ , definam-se

$$M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} \quad e \quad m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\}.$$

**Definição:** As somas

$$S_{\mathcal{P}}(f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}) \quad e \quad s_{\mathcal{P}}(f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1})$$

designam-se, respetivamente, por **soma superior de Darboux** e **soma inferior de Darboux** (da função  $f$  relativas à partição  $\mathcal{P}$ ).

# Somas de Darboux

## Observações:

- As somas de Darboux estão bem definidas (porque  $f$  é limitada).
- Para qualquer função limitada  $f$  e qualquer partição  $\mathcal{P}$ ,

$$s_{\mathcal{P}}(f) \leq S_{\mathcal{P}}(f).$$

**Proposição:** Se  $\mathcal{P}^*$  é um refinamento de  $\mathcal{P}$ , então

$$s_{\mathcal{P}}(f) \leq s_{\mathcal{P}^*}(f) \leq S_{\mathcal{P}^*}(f) \leq S_{\mathcal{P}}(f).$$

**Proposição:** Para quaisquer duas partições  $\mathcal{P}_1$  e  $\mathcal{P}_2$  de  $[a, b]$ , tem-se

$$s_{\mathcal{P}_1}(f) \leq S_{\mathcal{P}_2}(f).$$

# Integrais de Darboux

## Observações:

- o conjunto de todas as somas superiores de Darboux de  $f$  (correspondentes às possíveis partições de  $[a, b]$ ) é limitado inferiormente (e não vazio);
- o conjunto de todas as somas inferiores de Darboux de  $f$  (correspondentes às possíveis partições de  $[a, b]$ ) é limitado superiormente (e não vazio).

**Definição:** Seja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  limitada. As quantidades

$$\overline{\mathcal{I}}(f) = \inf \{ S_{\mathcal{P}}(f) : \mathcal{P} \text{ é partição de } [a, b] \}$$

e

$$\underline{\mathcal{I}}(f) = \sup \{ s_{\mathcal{P}}(f) : \mathcal{P} \text{ é partição de } [a, b] \}$$

designam-se, respetivamente, por **integral superior de Darboux** e **integral inferior de Darboux** da função  $f$  em  $[a, b]$ .



# Integral de Riemann

**Definição:** Uma função limitada  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  diz-se **integrável** em  $[a, b]$  (no sentido de Riemann) se

$$\underline{\mathcal{I}}(f) = \overline{\mathcal{I}}(f).$$

Se  $f$  é integrável em  $[a, b]$ , chama-se **integral definido** (ou **integral de Riemann**) de  $f$  em  $[a, b]$  ao valor  $\underline{\mathcal{I}}(f) = \overline{\mathcal{I}}(f)$  e representa-se por

$$\mathcal{I}(f) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Dizemos que  $a$  é o limite inferior de integração,  $b$  é o limite superior de integração,  $f$  é a função integranda e  $x$  a variável de integração.

**Nota:** O símbolo  $\int_a^b f(x) \, dx$  lê-se integral de  $a$  até  $b$  de  $f(x)$  ou integral de  $f$  de  $a$  para  $b$ .

# Integral de Riemann

**Nota:** A variável de integração é muda, logo podemos escrever

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots$$

**Observação:** Note-se que na definição de integral de Riemann de  $f$  de  $a$  para  $b$  pressupõe-se que  $a < b$ .

Vamos agora dar significado ao símbolo  $\int_a^b f(x) dx$  quando  $a = b$  e quando  $a > b$ . Sendo  $f$  integrável em  $[a, b]$ , escrevemos, por convenção, que

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad e \quad \int_a^a f(x) dx = 0.$$

# Observações

- A definição de integral de Riemann pode também ser apresentada usando as **somas de Riemann**:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*)(x_i - x_{i-1})$$

onde, para  $i = 1, 2, \dots, n$ ,  $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$  e  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ .

- As somas de Darboux são casos particulares das somas de Riemann.

**Nota:** A definição de integral de Riemann baseada nas somas de Riemann não exige que  $f$  seja limitada em  $[a, b]$ . No entanto, pode-se demonstrar que, se  $f$  for integrável no sentido de Riemann no intervalo  $[a, b]$ , então  $f$  é limitada em  $[a, b]$ . Prova-se também que o conceito de integral usando somas de Riemann ou somas de Darboux são equivalentes. Nestes slides, optou-se por definir o integral usando as somas de Darboux por serem mais simples do ponto de vista prático.

# Integral de Riemann

**Proposição:** Uma função limitada  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é integrável em  $[a, b]$  se e só se existe uma sucessão de partições  $(\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  do intervalo  $[a, b]$  tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_{\mathcal{P}_n}(f) - s_{\mathcal{P}_n}(f)) = 0.$$

Neste caso,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{\mathcal{P}_n}(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_{\mathcal{P}_n}(f).$$

## Exercícios

- ① Seja  $f(x) = k$ ,  $x \in [a, b]$  (onde  $k$  é uma constante real). Prove que  $f$  é integrável em  $[a, b]$  e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b k dx = k(b - a).$$

- ② Considere a função  $h$  definida por  $h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$   
Prove que  $h$  não é integrável em  $[0, 1]$ .

**Nota:** O cálculo do valor de  $\int_a^b f(x) dx$  usando a definição ou o resultado apresentado na página anterior é, no caso geral, bastante complicado. Mais à frente veremos como determinar o valor do integral de Riemann conhecendo apenas uma primitiva de  $f$  em  $[a, b]$ .

# Observação

**Observação:** É importante observar que a condição de  $f$  ser limitada em  $[a, b]$  não é, por si só, suficiente para garantir que a função seja integrável nesse intervalo.

**Exemplo:** A função  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

é limitada em  $[0, 1]$ , mas não é integrável em  $[0, 1]$ .

# Condições suficientes de integrabilidade

**Proposição (Condições suficientes de integrabilidade):** Seja  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função.

- Se  $f$  for contínua em  $[a, b]$ , então  $f$  é integrável em  $[a, b]$ .
- Se  $f$  for limitada em  $[a, b]$  e descontínua apenas num número finito de pontos, então  $f$  é integrável em  $[a, b]$ .
- Se  $f$  for monótona em  $[a, b]$ , então  $f$  é integrável em  $[a, b]$ .

**Proposição:** Sejam  $f$  e  $g$  funções definidas em  $[a, b]$ . Se  $f$  é integrável em  $[a, b]$  e  $g$  difere de  $f$  apenas num número finito de pontos (isto é,  $f(x) = g(x)$ , para todo o  $x \in [a, b]$ , excepto para um número finito de  $x$ ), então  $g$  é integrável em  $[a, b]$  e

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

# Exemplos

- ① A função  $f$  definida por  $f(x) = \operatorname{arctg}(x^2 - 2x) + \cos^5 x$  é integrável em  $[-1, 3]$  (porquê?).
- ② Considere a função  $g$  definida do modo seguinte:

$$g(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{se } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 100 & \text{se } x = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

A função  $g$  é integrável em  $[0, \frac{\pi}{2}]$  (porquê?) e

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} x dx \quad (\text{porquê?}).$$

- ③ Considere a função  $h$  definida do modo seguinte:

$$h(x) = \begin{cases} e^{x^2} + 1 & \text{se } x \in [0, 10] \cap \mathbb{N} \\ 0 & \text{se } x \in [0, 10] \setminus \mathbb{N}. \end{cases}$$

A função  $h$  é integrável em  $[0, 10]$  e  $\int_0^{10} h(x) dx = 0$  (porquê?).



# Propriedades do integral de Riemann

**Proposição:** Sejam  $f$  e  $g$  funções integráveis em  $[a, b]$  e  $k \in \mathbb{R}$ .

- $f$  é integrável em qualquer sub-intervalo  $[c, d]$  de  $[a, b]$ .
- $f + g$  é integrável em  $[a, b]$  e

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

- $kf$  é integrável em  $[a, b]$  e  $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ .
- $fg$  é integrável em  $[a, b]$ .
- Se  $c \in ]a, b[$ , então

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

# Propriedades do integral de Riemann

- Se  $f(x) \geq 0$ , para todo o  $x \in [a, b]$ , então

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

- Se  $f(x) \leq g(x)$ , para todo o  $x \in [a, b]$ , então

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

- Se  $m \leq f(x) \leq M$ , para todo o  $x \in [a, b]$ , onde  $m, M \in \mathbb{R}$ , então

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

- $|f|$  é integrável em  $[a, b]$  e  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$

## Exemplos

a)  $\int_1^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos x - 4 \ln x) dx = 2 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - 4 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \ln x dx.$

b) Uma vez que  $e^{-x^2} \geq 0$  para todo o  $x \in [0, 2]$  e esta função é integrável em  $[0, 2]$ , podemos concluir que

$$\int_0^2 e^{-x^2} dx \geq 0.$$

c) A função  $f$  definida em  $[0, 4]$  por

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{se } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

é integrável em  $[0, 4]$  (porquê?) e tem-se que

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^1 (-1) dx + \int_1^2 0 dx + \int_2^4 2 dx = 3.$$

# Teorema Fundamental do Cálculo Integral

**Proposição** (Teorema Fundamental do Cálculo Integral): Seja  $f$  integrável em  $[a, b]$  (com  $a < b$ ) e seja

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

Então:

- $F$  é contínua em  $[a, b]$ .
- Adicionalmente, se  $f$  é contínua em  $c \in [a, b]$ , então  $F$  é diferenciável em  $c$  e  $F'(c) = f(c)$ .

# Teorema Fundamental do Cálculo Integral

**Corolário:** Sejam  $f$  uma função contínua em  $[a, b]$  e

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

Então  $F$  é diferenciável em  $[a, b]$  e tem-se que

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

isto é,

$$\left( \int_a^x f(t) dt \right)' = f(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

# Teorema Fundamental do Cálculo Integral

**Corolário:** Se  $f$  é contínua em  $[a, b]$ , então  $f$  é primitivável em  $[a, b]$ .

**Corolário (Teorema do valor médio para integrais):** Se  $f$  é contínua em  $[a, b]$ , então existe  $c \in ]a, b[$  tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

**Corolário (Derivação de integrais com limites de integração variáveis):**

Sejam  $I$  um intervalo aberto de  $\mathbb{R}$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua em  $]a, b[$  e  $g_1$  e  $g_2$  funções definidas em  $I$  tais que  $g_1(I) \subseteq ]a, b[$  e  $g_2(I) \subseteq ]a, b[$ . Se  $g_1$  e  $g_2$  forem diferenciáveis então, para cada  $x \in I$ ,

$$\left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(t) dt \right)' = f(g_2(x))g_2'(x) - f(g_1(x))g_1'(x).$$

**Nota:** O resultado anterior é consequência do Teorema Fundamental do Cálculo Integral e do Teorema da derivada da função composta.

# Fórmula de Barrow

**Questão:** Sendo  $f$  contínua, como calcular  $\int_a^b f(x) dx$  ?

**Proposição (Fórmula de Barrow):** Se  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua em  $[a, b]$  e se  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma primitiva de  $f$  então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) .$$

**Notação:**  $F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b = \left[ F(x) \right]_a^b$

**Exemplos:**

$$\textcircled{1} \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = \frac{8}{3} - 2 - \left( \frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{4}{3}$$

$$\textcircled{2} \int_e^{e^2} \frac{dy}{y \ln y} = \left[ \ln |\ln y| \right]_e^{e^2} = \ln |\ln(e^2)| - \ln |\ln(e)| = \ln(2)$$

# Fórmulas de integração por partes e mudança de variável

**Fórmula de integração por partes no integral definido:**

$$\int_a^b f'(x) g(x) dx = \left[ f(x) g(x) \right]_a^b - \int_a^b f(x) g'(x) dx.$$

**Fórmula de mudança de variável no integral definido:** Sejam  $f$  uma função contínua em  $I$  e  $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$  uma função diferenciável tal que  $\varphi(J) \subseteq I$  e  $\varphi'$  é contínua em  $J$ . Sejam  $a, b \in I$  e  $c, d \in J$  tais que  $\varphi(c) = a$  e  $\varphi(d) = b$ . Então

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$



## Exercício

**Exercício:** Sejam  $a > 0$  e  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua.

Mostre que:

① se  $f$  é par, então  $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$

② se  $f$  é ímpar, então  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$


# Aplicação do integral de Riemann ao cálculo de áreas

**Proposição:** Sejam  $a < b$  e  $f$  uma função contínua em  $[a, b]$ . Se  $f$  for não negativa em  $[a, b]$ , isto é,

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0,$$

então a área da região limitada do plano delimitada pelo gráfico de  $f$ , pelo eixo das abcissas e pelas retas de equações  $x = a$  e  $x = b$  é dada por

$$\int_a^b f(x) dx.$$




# Aplicação do integral de Riemann ao cálculo de áreas

**Corolário:** Seja  $f$  uma função contínua em  $[a, b]$  tal que

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \leq 0.$$

A área da região limitada do plano delimitada pelo gráfico de  $f$ , pelo eixo das abcissas e pelas retas de equações  $x = a$  e  $x = b$  é dada por

$$-\int_a^b f(x)dx.$$



# Aplicação do integral de Riemann ao cálculo de áreas

**Corolário:** Sejam  $f$  e  $g$  duas funções contínuas em  $[a, b]$  tais que

$$\forall x \in [a, b] \quad g(x) \leq f(x).$$

A área da região limitada do plano delimitada superiormente pelo gráfico de  $f$ , inferiormente pelo gráfico de  $g$ , à direita pela reta de equação  $x = b$  e à esquerda pela reta de equação  $x = a$  é dada por

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

