WAYGROUND formerly Quizizz **Lista de exercícios**

Nome

Funções trigonométricas inversas

Turma

Total de perguntas: 5

Data

Tempo da folha de exercícios: 1h 15min

1. Qual o valor exato de $\arctan\left(\tan\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)$:

a) $\frac{4\pi}{3}$

b) $-\frac{\pi}{3}$

c) $\frac{\pi}{3}$

d) $\sqrt{3}$

2. Considere a função $\arccos\left(\ln\left(x\right)\right)$. O domínio da função é:

a) $D_f = [0,\ \pi]$

b) $D_f = \left[e^{-1}, e\right]$

c) $D_f = [0,\ +\infty)$

d) $D_f = (0, e]$

3. Qual o domínio da função inversa de $f\left(x\right) = \arccos\left(\ln\left(x\right)\right)$?

a) $D_{f^{-1}} = (0, \pi]$

b) $D_{f^{-1}} = (0, 1]$

c) $D_{f^{-1}} = [0, \pi)$

d) $D_{f^{-1}} = [0, \pi]$

4. Qual o valor exato de $\arccos\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$?

a) $\frac{\pi}{3}$

b) $-\frac{\pi}{3}$

c) $\frac{5\pi}{3}$

d) $\frac{2\pi}{3}$

5. Considere a função $f(x) = \pi + \arcsin(e^x - 1)$. O contradomínio da função é:

a) $D_f = [0, \pi]$

b) $D_f = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$

c) $D_f = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

d) $D_f = (-\infty, \ln 2]$