Системный анализ процессов переработки нефти и газа

Лабораторная работа №5

Минимизация функций

Задание 1

Найдите минимум следующих функций, используя метод минимизации slsqp, доступный в функции scipy.optimize.minimize(). Начальное приближение: $x_0=[0,0]$. Необходимо найти координаты минимума и его значение для каждой функции.

1. Функция Экли:

$$f(x,y) = -20 \exp \left[-0.2 \sqrt{0.5 \left(x^2+y^2
ight)}
ight] - \exp \left[0.5 \left(\cos \left(2 \pi x
ight) + \cos \left(2 \pi y
ight)
ight)
ight] + e + 20$$

2. Функция Била:

$$f(x,y) = (1.5-x+xy)^2 + ig(2.25-x+xy^2ig)^2 + ig(2.625-x+xy^3ig)^2$$

3. Функция Гольдшейна-Прайса:

$$f(x,y) = \left[1 + (x+y+1)^2 \left(19 - 14x + 3x^2 - 14y + 6xy + 3y^2\right)
ight] \cdot \\ \cdot \left[30 + (2x - 3y)^2 \left(18 - 32x + 12x^2 + 48y - 36xy + 27y^2\right)
ight]$$

4. Функция Матьяса:

$$f(x,y) = 0.26 \left(x^2 + y^2\right) - 0.48xy$$

Задание 2

Пусть дана схема химических превращений:

$$A \stackrel{k_1}{\longrightarrow} 2B \stackrel{k_2}{\longleftrightarrow} C$$

Необходимо определить с помощью генетического алгоритма и метода Нелдера-Мида (можно воспользоваться функцией scipy.optimize.mnimize(), указав соответствующее значение опционального аргумента method) константы скоростей реакций: k_1 , k_2 и k_3 , если известно, что к моменту времени $t=1({\bf c})$ концентрации компонентов равны: $C_A=0.1423;\ C_B=1.5243;\ C_C=0.5956$ моль/л.

Начальные условия: $C_A(0)=1.0$; $C_B=0.0$; $C_C=0.5$ моль/л.

Область поиска для всех констант ограничьте интервалом $[0;\ 2].$