

# Конспект по аналитической геометрии

VG6

2 половина 1 семестра

## Содержание

<b>1</b>	<b>§8. Прямая в пространстве.</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Алгебраические линии и кривые 2 порядка</b>	<b>3</b>
2.1	Эллипс. Вывод канонического уравнения. Свойства эллипса. . . . .	3
2.2	Вывод уравнения эллипса . . . . .	3
2.3	Гипербола . . . . .	4
2.4	Эксцентриситет и директриса эллипса и гиперболы. . . . .	6
2.5	Парабола. Вывод канонического уравнения. Свойства параболы. . . . .	8
2.6	Упрощение алгебраического уравнения второго порядка на плоскости. Преобразование коэффициентов уравнений второго порядка при ортогональных преобразованиях. . . . .	9
2.6.1	Сдвиг. . . . .	9
2.6.2	Поворот. . . . .	10
2.7	Инварианта кривых второго порядка. . . . .	10
2.8	Приведение кривой второго порядка к каноническому виду ортогональными преобразованиями. . . . .	11
2.8.1	Центральная кривая . . . . .	11
2.9	Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду в случае нецентральной прямой. . . . .	13
<b>3</b>	<b>Классификация прямых 2 порядка по инвариантам.</b>	<b>15</b>
3.1	Цилиндрические поверхности . . . . .	15
3.2	Конические поверхности . . . . .	17
3.3	Поверхности вращения . . . . .	18

$$Ax + by + Cz + D = 0$$

Я всё проебал, надо написать хз что это.

Определение. Отклонение точки от плоскости

$$M_0(x_{0,0}, z_0)$$

$$\delta(M_0, \pi) = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta z_0 \cos \gamma$$

## 1 §8. Прямая в пространстве.

OXYZ - ДПСК

**Определение.** Направленный вектор L.

$$\bar{p} \neq 0, \quad \bar{q} || L$$

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

$$\bar{q} = l, m, n$$

$$M = (x, y, z)$$

$$M \in L \Leftrightarrow \overline{M_0 M} || \bar{q}$$

1.

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Канонические уравнения L.

2.

$$\overline{M_0 M} = t \bar{q}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, t \in (-\infty, +\infty) \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \text{П1: } A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ \text{П2: } A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad \bar{q} = [\overline{N_1}, \overline{N_2}]$$

Определение. Угол между прямой и плоскостью - это угол между прямой и её проекцией на эту плоскость.

$$\bar{q} = l, m, n$$

$$\overline{N} = A, B, C$$

$$\cos \psi = \sin \phi = \frac{Al + Bm + Cn}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

## 2 Алгебраические линии и кривые 2 порядка

### 2.1 Эллипс. Вывод канонического уравнения. Свойства эллипса.

**Эллипс** - множество точек плоскости таких, что сумма расстояний от них до фиксированных точек той же плоскости постоянна и равна  $2a$ .  $r_1 + r_2 = 2a$

**Фиксированные точки F1, F2** - фокусы.

**Длины r1, r2** - фокальные радиусы.

**Расстояние между F1, F2** - фокусное расстояние =  $2c$ .  $c$  может быть равен 0, тогда будет окружность.

Окружность частный случай эллипса с фокусным расстоянием 0.

По неравенству треугольника:  $a > c$

### 2.2 Вывод уравнения эллипса

Пусть фокусное расстояние не равно 0.

!!! INSERT IMAGE.

$$r_1 + r_2 = 2a \quad (1)$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (2)$$

$$x^2 + 2cy + c^2 + y^2 + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 + 2\sqrt{(x^2 + 2cx + c^2 + y^2)(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)}$$

$$2(x^2 + y^2 + c^2) + \sqrt{(x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2x^2} = 4a^2$$

$$x^2 + y^2 + c^2 = t^2$$

$$\sqrt{t^4 - 4c^2x^2} = 2a^2 - t^2 \Rightarrow t^4 - 4c^2x^2 = 4a^4 - 4a^2t^2 + t^4 - c^2x^2 = a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2)$$

$$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) =$$

$$(a^2 - c^2) > 0$$

$$= \frac{a^2 - c^2}{b^2} = \frac{b^2}{b^2} \quad \underline{a \geq b}$$

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

(3)  $\Rightarrow$  (2)-?

$$y^2 = (1 - \frac{x^2}{a^2})b^2$$

$$r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + a^2 - c^2 - \frac{a^2 - c^2}{a^2}x^2} =$$

$$\sqrt{a^2 + 2cx + (\frac{c}{a}x)^2} = \sqrt{(a + \frac{c}{a}x)^2} = |a + \frac{c}{a}x|$$

$$r_1 = |a + \frac{c}{a}x| \quad r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$r_2 = |a - \frac{c}{a}x|$$

$$1. r_1 = |a + \frac{c}{a}x| = a + \frac{c}{a}x$$

$$|x| \leq a, c < a$$

$$2. r_2 = |a - \frac{c}{a}x| = a - \frac{c}{a}x$$

Т.о. мы доказали равносильность преобразования и вывода формулы (3).

a - большая полуось

b - малая полуось

Прямоугольник со сторонами a, b - основной прямоугольник для эллипса.

$$\begin{cases} r_1 = a + \frac{c}{a}x \\ r_2 = a - \frac{c}{a}x \end{cases} \quad (4)$$

## 2.3 Гипербола

Гипербола - Множество точек плоскости таких, что модуль разности расстояний до двух фиксированных точек плоскости величина постоянная и равная  $2a$ .

**Фиксированные точки F1, F2** - фокусы.


Длины **r1, r2** - фокальные радиусы.

Расстояние между **F1, F2** - фокусное расстояние =  $2c$ .

$$c > a \quad c > 0$$

Вводим каноническую систему координат.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$|r_1 - r_2| = 2a \quad (1)$$

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a \quad (2)$$

$$x^2 + 2cy + c^2 + y^2 + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 - 2\sqrt{(x^2 + 2cx + c^2 + y^2)(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)} = 4a^2$$

$$\begin{aligned}
2(x^2 + c^2 + y^2) - 2\sqrt{(x^2 + c^2 + y^2)^2 - 4c^2x^2} &= 4a^2 \\
(x^2 + c^2 + y^2) &= t^2 \\
t^2 - 2a^2 = \sqrt{t^4 - 4c^2x^2} &\Rightarrow 4c^2x^2 - 4a^2(x^2 + c^2 + y^2) = -4a^4 \\
(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 &= a^2c^2 - a^4 = a^2(c^2 - a^2) \\
b^2x^2 - a^2y^2 &= a^2b^2
\end{aligned}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

Проверим (3)  $\Rightarrow$  (1), (2)

$$\begin{aligned}
y^2 &= \left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right)b^2 \\
r_1 &= \sqrt{(x^2 + c^2) + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2} = \\
&= \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + \frac{c^2}{a^2}x - \frac{a^2}{a^2}x^2 - c^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + 2\frac{cx}{a}a + \left(\frac{cx}{a}\right)^2} = \sqrt{\left(a + \frac{cx}{a}\right)^2} = \left|a + \frac{cx}{a}\right|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r_1 &= \left|a + \frac{cx}{a}\right| \\
r_2 &= \left|a - \frac{cx}{a}\right|
\end{aligned}$$

1.  $x > a$

$$\begin{aligned}
r_1 &= \left|a + \frac{cx}{a}\right| = a + \frac{cx}{a} \\
r_2 &= \left|a - \frac{cx}{a}\right| = -a + \frac{cx}{a} \\
|r_1 - r_2| &= \left|a + \frac{cx}{a} + a - \frac{cx}{a}\right| = |2a|
\end{aligned}$$

2.  $x < -a$

$$\begin{aligned}
&|r_1 - r_2| \\
r_1 &= \left|a + \frac{x}{a}c\right| = -a - \frac{x}{a}c \\
\left|\frac{x}{a}\right| &> 0, \quad c > x \quad \frac{x}{a} < 0 \\
r_2 &= \left|a - \frac{c}{a}x\right| = a + \frac{c}{a}x \\
|r_1 - r_2| &= \left|-a - \frac{x}{a}c - a + \frac{c}{a}x\right|
\end{aligned}$$

Введём  $\hat{y}_1 = \frac{b}{a}x$

Введём  $\hat{y}_2 = -\frac{b}{a}x$

Это будут уравнения диагоналей прямоугольника (асимптоты)


$$y > 0, x \rightarrow +\infty$$

$$y = \sqrt{\left(\frac{b^2}{a^2} - 1\right)b^2}$$

$$y(x) - \hat{y}_1(x) = \sqrt{\left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right)b^2} - \frac{b}{a}x = \frac{\frac{x^2 b^2}{a^2} - b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2}{\sqrt{\frac{x^2 b^2}{a^2} - b^2} + \frac{b}{a}x} = \frac{-b^2}{\sqrt{\frac{b^2}{a^2} - b^2} \frac{b}{a}x} \xrightarrow{+\infty} 0$$

a - действительная полуось

b - мнимая полуось




Свойства гиперболы:

1. Симметрична относительно центра (начала координат)
2. Фокусы вне прямоугольника
3. b и a никак не св. Директриса и экс. / Директриса и экс.

## 2.4 Эксцентриситет и директриса эллипса и гиперболы.

Определение. Эксцентриситет это  $e = \frac{c}{a}$



Для эллипса:  $0 \leq e < 1$  Для окружности:  $e = 1$

Для гиперболы:  $e > 1$

$$1 - e^2 = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2}$$

Эллипс:  $1 - e^2 = \frac{b^2}{a^2}$

Гипербола:  $e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$

**Определение.** Директрисы - это прямые ... в проебал

$$\rho(D_i, 0) = \frac{a}{e} \left( \text{or } \frac{\pi}{e} \right)$$

$$D_1 : -x = \frac{a}{e}$$

$$D_2 : x = \frac{a}{e}$$

$$-x - \frac{a}{e} = 0$$

$$x - \frac{a}{e} = 0$$

**Теорема.**  $M(x, y)$

$r_i$  - ... радиусы =  $\rho(M, F_1)$

$d_1 = D_i$

$$\frac{r_i}{d_i} = e, \quad i = 1, 2$$

### Доказательство

1. Эллипс

$$r_1 = \left| a + \frac{c}{a}x \right| = a + \frac{c}{a}x = a + cx$$

$$d_1 = \left| -x - \frac{a}{e} \right| = \left| x + \frac{a}{e} \right| = x + \frac{a}{e} = \frac{ex + a}{e}$$

$$\frac{r_1}{d_1} = e$$

$$r_2 = \left| a - \frac{c}{a}x \right| = a - \frac{c}{a}x = a - cx$$

$$d_1 = \left| x - \frac{a}{e} \right| = -x + \frac{a}{e} = \frac{-ex + a}{e}$$

$$\frac{r_2}{d_2} = e$$

Для эллипса доказали.

2. Гипербола. Рассмотрим 1 случай, остальное по аналогии.

$$x \geq a, i = 2$$

$$r_2 = \left| a - \frac{c}{a}x \right| = -a + \frac{c}{a}x = -a + cx$$

$$d_2 = \left| x - \frac{a}{e} \right| = x - \frac{a}{e} = \frac{ex - a}{e}$$



$$\frac{r_2}{d_2} = e$$

Доказали для гиперболы.

## 2.5 Парабола. Вывод канонического уравнения. Свойства параболы.

Парабола - множество точек плоскости таких что расстояние от которых до фиксированной точки плоскости (фокуса) равно расстоянию до фиксированной прямой (директрисы).

Фокус на директрисе не лежит.



$$r = d \quad (1)$$

Фокальный параметр параболы:  $P = \rho(F, D)$   $D : -x - \frac{P}{2} = 0$


$$\sqrt{\left(x - \frac{P}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{P}{2}\right| \quad (2)$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px \quad (3)$$





Свойства параболы:

- Симметрично относительно  $Ox$
- Расположено в правой полуплоскости ( $x > 0$ )

## 2.6 Упрощение алгебраического уравнения второго порядка на плоскости. Преобразование коэффициентов уравнений второго порядка при ортогональных преобразованиях.

### 2.6.1 Сдвиг.


У нас есть ДПСК.  $OXY \rightarrow O'X'Y'$

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$  - квадратная часть. ( $A^2 + B^2 + C^2 > 0$ )

$2Dx + 2Ey$  - линейная часть

$F$  - свободный член.



$$\begin{cases} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{cases}$$

$$A'x'^2 + 2B'x'y' + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0$$

$$A(x'^2 + 2x'x_0 + x_0'^2) + 2B(x' + x_0)(y' + y_0) + C(y'^2 + 2y'y_0 + y_0'^2) + 2D(x' + x_0) + 2E(y' + y_0) + F = 0$$

$$A' = A$$

$$B' = B$$

$$C' = C$$

$$D' = Ax_0 + By_0 + D$$

$$E' = Bx_0 + Cy_0 + E$$

$$F' = Ax_0^2 + 2Bx_0y_0 + Cy_0^2 + 2Dx_0 + 2Ey_0 + F$$

### 2.6.2 Поворот.

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$

$$A(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)^2 + 2B(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + C(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)^2 + \\ + 2D(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + 2E(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + F = 0$$

$$A(x'^2 \cos^2 \alpha - 2x'y' \sin \alpha \cos \alpha + y'^2 \sin^2 \alpha) + 2B(x'^2 \cos \alpha \sin \alpha - x'y' \sin^2 \alpha + x'y' \cos^2 \alpha - y'^2 \sin \alpha \cos \alpha) + \\ + C(x'^2 \sin^2 \alpha + 2x'y' \sin \alpha \cos \alpha + y'^2 \cos^2 \alpha) + 2D(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + 2E(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + F = 0$$

$$A' = A \cos^2 \alpha + 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \sin^2 \alpha = \frac{A}{2}(1 + \cos 2\alpha) + B \sin 2\alpha + \frac{C}{2}(1 - \cos 2\alpha) = \frac{A + C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$B' = -A \sin \alpha \cos \alpha + B(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + C \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{A}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha + \frac{C}{2} \sin 2\alpha = -\frac{A - C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha$$

$$C' = A \cos^2 \alpha - 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \sin^2 \alpha = \frac{A}{2}(1 - \cos 2\alpha) - B \sin 2\alpha + \frac{C}{2}(1 + \cos 2\alpha) = \frac{A + C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$A' = \frac{A + C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$B' = -\frac{A - C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha$$

$$C' = \frac{A + C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

### 2.7 Инварианта кривых второго порядка.

$$J_1 = A + C$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}$$

**Теорема.**  $J_1, J_2, J_3$  - ортогональны инвариантной кривой  $2^{20}$  порядка.

#### Доказательство

Для  $J_1$  и  $J_2$

1.  $A' = A, B' = B, C' = C // J_1' = J_1, J_2' = J_2$  - см формулы пересчёта для сдвига.
2.  $J_1' = A' + C' = \frac{A+C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha + \frac{A+C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha = A + C$   
 $J_2' = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = A'C' - B'^2 = (\frac{A+C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha)(\frac{A+C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha) - (-\frac{A-C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha)^2 = \frac{(A+C)^2}{4} - (B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha)^2 - (-\frac{A-C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha)^2 = (\frac{A+C}{4})^2 - B^2 \sin^2 2\alpha - B(A-C) \sin 2\alpha \cos 2\alpha - (\frac{A-C}{2})^2 \sin^2 2\alpha + B(A-C) \sin 2\alpha \cos 2\alpha - B^2 \cos^2 2\alpha = (\frac{A+C}{2})^2 - (\frac{A-C}{2})^2 - B^2 = AC - B^2$

Кривая называется **центральной** если у неё есть единственный центр симметрии.

Кривая **не центральная** если у неё нет центров симметрии, или их больше 1.

**Теорема 2.**

Кривая второго порядка центральная  $\Leftrightarrow J_2 \neq 0$   
 Кривая второго порядка нецентральная  $\Leftrightarrow J_2 = 0$

Эллипс:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$J_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{a^2 b^2} > 0$$

Гипербола:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$J_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{b^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{a^2 b^2} < 0$$

Парабола:  $y^2 = 2px$

$$J_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

## 2.8 Приведение кривой второго порядка к каноническому виду ортогональными преобразованиями.

### 2.8.1 Центральная кривая

1. Сдвиг. Цель - убрать линейные слагаемые (найти  $O' (x_0, y_0)$  решить систему)

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + D = 0 \\ Bx_0 + Cy_0 + E = 0 \end{cases} *$$

Её доказывать не будем:

**Теорема Крамера.** (\*) имеет единственное решение  $\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \neq 0$  Найдём  $O'(x_0, y_0)$

$$A\xi'^2 + 2B\xi'\psi' + C'y'^2 + F' = 0$$

$$A' = A, B' = B, C' = C$$

2. Поворот. Цель - убрать  $B'$  угол  $\alpha$  :  $-\frac{A'-C'}{2} \sin 2\alpha + B' \cos 2\alpha = 0$   
beginenumerate

Если  $B' = 0$  то ничего делать не надо

$$B' \neq 0 \quad \text{ctg } 2\alpha = \frac{A'-C'}{2B'}$$

$$\begin{cases} x' = x'' \cos \alpha - y'' \sin \alpha \\ y' = x'' \sin \alpha + y'' \cos \alpha \end{cases}$$

$$A''x''^2 + C''y''^2 + F'' = 0$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} A'' & 0 \\ 0 & C'' \end{vmatrix} = A''C'' \neq 0 \Rightarrow A'' \neq 0 \text{ and } C'' \neq 0$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} A'' & 0 & 0 \\ 0 & C'' & 0 \\ 0 & 0 & F'' \end{vmatrix} = A''C''F'' = J_2F'' \Rightarrow F'' = \frac{J_3}{J_2}$$

$$A''x''^2 + C''y''^2 + \frac{J_3}{J_2} = 0$$

$$A''x'' + C''y'' = -\frac{J_3}{J_2}$$

1. Эллипс

$$J_2 > 0, J_2 = A''C'' > 0$$

$$A'' = C''$$

$$A'' > 0, C'' > 0$$

$$J_1 > 0$$

(a)  $J_3 < 0, J_2 > 0$

$$-\frac{J_3}{J_2} > 0$$

$$\frac{x''^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} + \frac{y''^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1$$

(b)  $J_3 = 0$

$$A''x''^2 + C''y''^2 = 0$$

Выраженный эллипс.

$$(c) \quad J_3 > 0$$

$$\frac{x'^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} + \frac{y'^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = -1$$

$$\frac{x'^2}{\frac{1}{A''}} + \frac{y'^2}{\frac{1}{C''}} = 0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = -1$$

- это мнимый эллипс

## 2. Гипербола

$$J_2 < 0, J_2 = A''C'' < 0$$

$$A'' = -C''$$

$$A'' > 0, C'' < 0$$

$$J_1 > 0$$

$$(a) \quad J_3 = 0, J_2 < 0$$

$$A''x'^2 - (-C'')y'^2 = -\frac{J_3}{J_2}$$

$$\frac{x'^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} - \frac{y'^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$\text{либо } -\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$(b) \quad J_3 = 0$$

$$A''x'^2 + C''y'^2 = 0$$

$$A'' > 0, C'' < 0$$

$$(\sqrt{A''}x'')^2 - (\sqrt{-C''}y'')^2 = 0$$

- Это 2 пересекающиеся прямые.

Замечание к сдвигу. После сдвига начало координат - центр кривой (и он единственный).

## 2.9 Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду в случае нецентральной прямой.

$$J_2 = 0$$

Поворот сдвиг. Цель - убрать B.

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{A - C}{2B}$$

$$A'x'^2 + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} A' & 0 \\ 0 & C' \end{vmatrix} = A'C' = 0 \Rightarrow A' = 0, C' = 0$$

$$C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0, C' \neq 0$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & D' \\ 0 & C' & E' \\ D' & E' & F' \end{vmatrix} = -C'D'^2$$

$$1. J_3 \neq 0 \Leftrightarrow D' \neq 0$$

$$C'y'^2 + 2E'y' = -D'x' - F'$$

$$(y' + b) = -\frac{2D'}{C'}(x' + a)$$

Сдвиг

$$\begin{cases} x'' = x' + a \\ y'' = y' + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x'' - a \\ y' = y'' - b \end{cases} \quad O''(a, b)$$

Парабола

$$y''^2 = -\frac{2D'}{C'}x''$$

$$2. D' = 0 \Leftrightarrow J_3 = 0$$

$$C'y'^2 + 2E'y' + F' = 0$$

$$y'^2 + 2\frac{E'}{C'}y' + \frac{F'}{C'} = 0$$

$$(y'^2 + 2\frac{E'}{C'}y' + \frac{E'^2}{C'^2}) + \frac{F'}{C'} - \frac{E'^2}{C'^2} = 0$$

$$(y' + \frac{E'}{C'})^2 = \frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'}$$

Сдвиг:

$$\begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + \frac{E'}{C'} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x'' \\ y' = y'' - \frac{E'}{C'} \end{cases}$$

$$y''^2 = \frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'}$$

(а)  $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} > 0$  - 2 прямые

(б)  $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} = 0$  - 2 совпадающие прямые

(с)  $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} < 0$  - 2 мнимые параллельные прямые

### 3 Классификация прямых 2 порядка по инвариантам.

$J_2 > 0$ эллиптический тип		
$J_3 < 0, J_1 > 0$ действительный эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ центральная кривая	$J_3 = 0, J_1 > 0$ выраженный эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ центральная кривая	$J_3 > 0, J_1 > 0$ мнимый эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ центральная кривая
$J_2 < 0$ гиперболический тип		
$J_3 \neq 0$ гиперкуб $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ центральная кривая	$J_3 = 0$ пара пересекающихся прямых $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ центральная кривая	height
$J_2 = 0$ параболический тип		
$J_3 \neq 0$ парабола $y^2 = 2px$  не центральная кривая Плоскости	$J_3 = 0$  а. $y^2 = a^2$ - пара паралельных прямых. б. $y^2 = 0$ - пара совпадающих прямых. с. $y^2 = -a^2$ - пара паралельных мнимых прямых. не центральная кривая	height

#### 3.1 Цилиндрические поверхности

$S$  - называется **цилиндрической повехностью** с образующей паралельной  $Oz$ , если для любой точки  $m_0 \in S$  вся прямая, проходящая через  $(.)m_0$  и лежит на  $S$ .

**Теорема.** Уравнение


$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

Задаёт цилиндрическую поверхность с образующей  $Oz$ .


$$\begin{aligned}
 S : M_0 &= (x_0, y_0, z_0) \in S \\
 F(x_0, y_0) &= 0 \\
 M_0 &\in L \text{ \& } L \parallel Oz \\
 \bar{q} &= \{0, 0, 1\} \\
 \begin{cases} x = x_0 + 0t \\ y = y_0 + 0t \\ z = z_0 + t \end{cases} & \quad M \in L \\
 F(x_0 + 0t, y_0 + 0t) = F(x, y) = 0 &\Rightarrow M \in S
 \end{aligned}$$

Пусть  $F(x, y)$  - влгебраический многочлен 2 порядка.

1.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  - эллиптический цилиндр.




2.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  - гиперболический цилиндр.



3.  $y^2 = 2px$  - параболический цилиндр.





### 3.2 Конические поверхности

$S$  - коническая поверхность с вершиной в начале координат, если  $\forall M_0 \in S$  вся прямая содержит  $O$  и  $M_0 \in S$

$F(x, y, z)$  - однородная функция порядка  $K$ , если  $\forall t \in \mathbb{R} F(tx, ty, tz) = t^K F(x, y, z)$

**Теорема.**

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

$F$  - однородная функция порядка  $K$  задаёт коническую поверхность с вершиной в  $O$ .

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$$

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$M_0, O \in L$$

$$\bar{q} = \{x_0, y_0, z_0\}$$


$$L : \begin{cases} x = 0 + x_0 t \\ y = 0 + y_0 t \\ z = 0 + z_0 t \end{cases}, M \in L$$

OXYZ - ДПСК

$$F(x, y, z) = F(x_0 t, y_0 t, z_0 t) = t^K F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$M_0 \in S$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



Сечение плоскостью  $Z=C$  - выраженный эллипс.

### 3.3 Поверхности вращения

$S$  - **поверхность вращения вокруг оси  $Oz$** , если  $\forall M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$  вся окружность лежащая в плоскости  $Z = Z_0$  с центром в  $(0, 0, z_0)$  и радиусом  $R = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} \in S$

$$F(x^2, y^2, z^2) = 0 \quad (1)$$

**Теорема.**  $S$  задаётся уравнением (1), то  $S$  - поверхность вращения вокруг  $Oz$ .

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$$

$$F(x_0^2 + y_0^2, z_0^2) = 0$$


$$z = z_0$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$

$$M \in S \Rightarrow F(x^2 + y^2, z) = F(x_0^2 + y_0^2, z_0) = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$


1. Эллипсоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$


Похож на мяч для регби. Сфера - частный случай эллипсоида.  
Сечение любыми плоскостями в пределах эллипсоида - эллипс.

## 2. Однополостный гиперболоид




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

## 3. Двуполостный гиперболоид




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

4. Эллиптический параболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$$

5. Гиперболический параболоид



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz$$

Седло ;)