

1 Неопределённые функции

Доопределять надо так, чтобы получился лучший результат. Для ДНФ доопределяем единицами, чтобы результат был короче. Для КНФ - нулями. 3 этапа:

1. Доопределение
2. Минимизация
3. Коррекция

Алгоритм минимизации существует в 2 вариантах и содержат оба варианта все 3 этапа.

Вариант 1.

- Вводится вспомогательная функция \tilde{f} совпадающая с исходной на тех наборах на которых функция определена и принимающая значение 1 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками столбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк - термы, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая минимальная совокупность столбцов и строк, которая покрывает всю функцию.

Вариант 2

- Вводится вспомогательная функция \tilde{f} которая совпадает с исходной функцией на наборах, где она определена и принимает значение 0 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками столбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк - термы, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая минимальная совокупность покрывающая все столбцы.

Условные обозначения $f(a, b, c) = \begin{cases} \sum_1(1, 2, 3) \\ X(4, 5) \end{cases}$ - запрещённые наборы

Пример

$$f(a, b, c, d) = \begin{cases} \sum_1(0, 5, 8, 12, 15), \\ X(1, 2, 3, 10, 13, 14) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\tilde{f}(a, b, c, d) = \sum_1(0, 5, 8, 12, 15, 1, 2, 3, 10, 13, 14)$$

	b	b	\bar{b}	\bar{b}
a	1	1		1
a	1	1		1
\bar{a}			1	1
\bar{a}		1	1	1
\bar{d}	d	d	d	\bar{d}

$$f(a, b, c, d) = ab + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{d} + \bar{a}\bar{c}\bar{d}$$

	0000	0101	1000	1100	1111
11-				x	x
00-		x			
-0-0		x		x	
0-01			x		

$$\bar{b}\bar{d} + \bar{a}\bar{c}\bar{d} + ab$$

Пример (минКНФ)

$$f(a, b, c, d) = \begin{cases} \Pi(3, 6, 7, 9, 11), \\ X(0, 1, 2) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a, b, c, d) = \begin{cases} \Pi(3, 6, 7, 9, 11, 0, 1, 2) \end{cases}$$

	b	b	\bar{b}	\bar{b}	
a			0		\bar{c}
a			0		c
\bar{a}	0	0	0	0	c
\bar{a}			0	0	\bar{c}
\bar{d}	d	d	d	\bar{d}	

$$(a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{d}) \cdot (a + b)$$

	0011	0110	0111	1001	1011
0-1-	x	x	x		
-0-1	x			x	x
00-	x				

$$(a + \bar{c}) \cdot (b + \bar{d})$$

2 Выполнение операции умножения над числами с фиксированной запятой.

Вопросик: Формат чисел с фиксированной запятой?

Мы будем говорить про вариант: правильная дробь.

2.1 Прямой код.

$[x]_n$	$Sign_x$	x_1	...	x_n
$[y]_n$	$Sign_y$	y_1	...	y_n

$$|x|, |y| < 1 \quad [z]_n = [x]_n \cdot [y]_n = ?$$

1. $Sibn_z = Sign_x \oplus Sign_y$

Множимое, множитель (сомножители) и произведение.

2. $0, .x_1 \dots x_n * 0.y_1 \dots y_n$

- (a) Со старших разрядов множителя.

$$z = x \cdot y = x(y_1 \cdot 2^{-1} + y_2 \cdot 2^{-2} + \dots + y_n \cdot 2^{-n}) = x \cdot 2^{-1}y_1 + x \cdot 2^{-2}y_2 + \dots + x \cdot 2^{-n}y_n$$

Обращаем внимание, что $\cdot 2^n$ - это сдвиг вправо. Всё это множимое складывается с самим собой. Всё здесь - сложение и сдвиг.

- (b) С младших разрядов множителя (Схема Горнера).

$$z = (((((0 + xy_n) \cdot 2^{-1} + xy_{n-1}) \cdot 2^{-1} + \dots + xy_2) \cdot 2^{-1} + xy_1) \cdot 2^{-1}$$

Схема на основе накопителя (аккумулятора).

Фиксированная запятая в правильной дроби.

2.2 Дополнительный код.

$[x]_d$	x_0	x_1	...	x_n
$[y]_d$	y_0	y_1	...	y_n

1. $[z]_d = [x]_d(y_1 - y_0) + [x]_d \cdot 2^{-1}(y_2 - y_1) + \dots + [x]_d \cdot 2^{-n+1}(y_n - y_{n-1}) + [x]_d \cdot 2^{-n}(y_{n+1} - y_n)$ **Замечание.**

Т.к. формат правильная дробь, то элемент y_{n+1} мы берём за 0.

Значения, которые могут появиться после вычитания:

0	0	0
0	1	-1
1	0	1
1	1	0

$$2. [z]_d = ((\dots((0 + [x]_d \cdot [y_{n+1} - y_n]) \cdot 2^{-1} + [x]_d \cdot [y_n - y_{n-1}]) \cdot 2^{-1} + \dots + [x]_d \cdot [y_2 - y_1]) \cdot 2^{-1} + [x]_d \cdot [y_1 - y_0])$$

Примерчик.

$$[x]_n = 1.1010$$

$$[y]_n = 0.1011$$

$$[z]_n = ?$$

$$1. \text{Sign}_z = \text{Sign}_x \oplus \text{Sign}_y = 1 \oplus 0 = 1$$

$$\begin{array}{r} 0.1010 \\ \hline 0.01010 \quad x \cdot 2^{-1} \cdot y_1 \\ 0.000000 \quad x \cdot 2^{-2} \cdot y_2 \\ 2. \quad 0.0001010 \quad x \cdot 2^{-3} \cdot y_3 \\ 0.00001010 \quad x \cdot 2^{-4} \cdot y_4 \\ \hline 0.01101110 \end{array}$$

$$[x]_n = 1.01101110$$

Ещё примерчик.

$$[x]_n = 1.1101$$

$$[y]_n = 1.1011$$

$[z]_n$ - с Младших разрядов.

$$1. \text{Sign}_z = 0$$

$$\begin{array}{r} 0.0000 \\ 0.1101 \quad 0 + xy_4 = \sum_1 \\ \hline 0.01101 \quad \sum_1 \cdot 2^{-1} \\ 0.1101 \quad x \cdot y_3 \\ \hline 1.00111 \quad \sum_1 \cdot 2^{-3} - xy_2 = \sum_2 \\ 2. \quad 0.100111 \quad \sum_2 \cdot 2^{-1} \\ 0.0000 \quad x \cdot y_2 \\ \hline 0.100111 \quad \sum_3 \\ 0.0100111 \quad \sum_3 \cdot 2^1 \\ 0.1101 \\ \hline 1.0001111 \cdot 2^{-1} \quad [z]_n = 0.10001111 \quad \sum_n \end{array}$$

И ещё.

$$[x]_g = 0.10101$$

$$[y]_g = 1.01101$$

$[z]_g$ - со Старших разрядов.

i	$u_i - y_{i-1}$	()		
i=1	0 - 1	-1	1.01011	$[y_1 - y_0] \cdot 2^{-0} [x]_g$
i=2	1 - 0	1	0.010101	$[y_2 - y_1] \cdot 2^{-1} [x]_g$
i=3	1 - 1	0	0.0000000	$[y_3 - y_2] \cdot 2^{-2} [x]_g$