

Complexidade de Algoritmos

Prof. Diego Buchinger
diego.buchinger@outlook.com
diego.buchinger@udesc.br

Prof. Cristiano Damiani Vasconcellos
cristiano.vasconcellos@udesc.br

Estudo da Tratabilidade de Problemas Computacionais

Problemas tratáveis e intratáveis

Problemas tratáveis: resolvidos por algoritmos deterministas que executam em tempo polinomial.

Problemas intratáveis: não se conhece algoritmos deterministas que os resolvam em tempo polinomial.

$$1 < \log \log n < \log n < n^\varepsilon < n^c < n^{\log n} < c^n$$

Problemas tratáveis e intratáveis

Problemas tratáveis: resolvidos por algoritmos deterministas que executam em tempo polinomial.

Problemas intratáveis: não se conhece algoritmos deterministas que os resolvam em tempo polinomial.

$$1 < \log \log n < \log n < n^\varepsilon < n^c < n^{\log n} < c^n$$

Categorias de Problemas

Problemas de Otimização: Cada solução possível tem um valor associado e desejamos encontrar a solução com melhor valor.

Problemas de Decisão: Problemas que tem resposta sim ou não.

Problemas de Decisão são possivelmente “mais fáceis” do que problemas de Otimização, mas com certeza “não mais difíceis”!

Exemplo:

- Qual é o menor caminho entre os vértices a e b de um grafo?
- Existe um caminho de no máximo k arestas entre a e b ?

Algoritmos Não Deterministas

Capaz de escolher uma entre várias alternativas possíveis a cada passo. A alternativa escolhida será sempre a alternativa que leva a conclusão esperada, caso essa alternativa exista.

```
int pesq(Estr *v, int n, int ch){  
    int i;  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        if (v[i].chave == ch)  
            return i;  
    return -1;  
}
```

Autômato não
determinista

```
int pesq(Estr *v, int n, int ch){  
    int i;  
    i = magicaND(0, n - 1);  
    if (v[i].chave == ch)  
        return i;  
    return -1;  
}
```


Classes de Problemas P e NP

Classe de Problemas P : Problemas que podem ser resolvidos (por algoritmos deterministas) em tempo polinomial.

Classe de Problemas NP : Problemas que podem ser resolvidos por algoritmos não deterministas em tempo polinomial (*polinomialmente verificável* ou *certificado*). Ou problemas que a solução pode ser verificada em tempo polinomial.

Pergunta do milhão: $P=NP$ ou $P \neq NP$?

Possíveis relações entre as classes:



Classes de Problemas P e NP

O status de muitos problemas NP é desconhecido:


- existe um algoritmo determinista polinomial para o problema?

Investigar a complexidade relativa dos problemas da classe NP :


- Problema A é mais fácil ou mais difícil do que B ?

Recorremos à ideia de *redução polinomial*:

- Mostra que A não é mais difícil que B
ou que A é polinomialmente redutível
ao problema B .



Redução de Problemas



Se o “Algoritmo de Redução”, o “Algoritmo que Resolve B” e a “Transformação de solução” forem polinomiais, então podemos concluir algo sobre a solução do Problema A?

Redução de Problemas

Conclusões provenientes da redução:

Se Y é polinomialmente redutível a X então Y não é mais difícil do que X .

$$Y \leq_p X$$

Cenário 1: sabe-se que X está na classe P .

Logo, Y também deve estar na classe P .

Cenário 2: não se sabe se X está ou não em P ,
mas sabe-se que Y não está em P .

Como Y não é mais difícil que X , então X deve estar fora de P .

Classes de Problemas *NP-Hard*

Se podemos determinar que um problema não é mais difícil do que outro, podemos separar os problemas mais difíceis dos mais fáceis em NP!

Assim surge a classe dos problemas mais difíceis

A classe de problemas **NP-*Hard*** ou **NP-Difícil!**

“Um problema A é NP-Difícil se todos os problemas em NP não são mais difíceis do que A”

“Um problema NP-Difícil é tão difícil quanto qualquer problema em NP”

A yellow oval with a thin blue border and a slight drop shadow, containing the text 'NP-Difícil' in a black serif font.



NP-Difícil

Classes de Problemas *NP-Hard*

Na classe NP-Difícil podemos encontrar problemas:

- Indecidíveis: ex. problema da parada e equações diofantinas;
- Decidíveis: podem ser resolvidos por um algoritmo não determinista – um problema NP-Difícil que está em NP é dito **NP-Completo**.

Duas possíveis relações considerando P vs. NP



Redução de Problemas

Relação entre Redução e Problemas NP-Completo:

Uma vez conhecido um problema NP-Completo, podemos usar *reduções polinomiais* para provar que algum problema X também é NP-Completo.

“se Y é um problema NP-completo e Y não é mais difícil que um problema X (redução) então X também é NP-completo”


$$Y \leq_p X$$

Classes de Problemas *NP-Completo*

Se um problema NP-Completo pode ser resolvido em tempo polinomial, então todo problema NP-Completo pode ser resolvido em tempo polinomial e, portanto, $P = NP$

Acredita-se que a relação correta seja $P \neq NP$

Por quê?



NP-Completo

Um problema X é ***NP-Completo*** se:

1. O problema deve ser NP:

$$X \in NP$$

- a) Conseguir um algoritmo não determinista que resolva o problema em tempo polinomial*
- b) Conseguir um algoritmo determinista que verifica em tempo polinomial se uma resposta é verdadeira ou não (**certificado**)*

2. Fazer a redução de um problema NP-Completo (Y) conhecido para o problema X :

$$Y \leq_p X \quad \text{para todo} \quad Y \in NP$$

Exercícios

Verifique se as afirmações abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**, justificando as **falsas**:

- a) Se um problema NP for resolvido em tempo polinomial então $P = NP$.
- b) Se um problema NP-Difícil (ou NP-Hard) for resolvido em tempo polinomial então $P = NP$.
- c) Se $P = NP$ então todos os problemas considerados NP-Difícil (ou NP-Hard) podem ser resolvidos em tempo polinomial.
- d) Podemos afirmar que os problemas NP-Completo possuem apenas soluções em tempo exponencial ou maior.
- e) Considerando um problema $P1$ que tem uma solução em tempo polinomial conhecida, e um problema $P2$ que é NP-Completo, apresentando uma redução que pode ser executada em tempo polinomial de $P1$ a $P2$ ($P1 \leq_p P2$) estamos provando que $P = NP$.
- f) Se $P \cap \text{NP-Completo} \neq \emptyset$ então $P = NP$.