		<h1 style="text-align: center;">SEGUNDO PARCIAL</h1> <h2 style="text-align: center;">SOLUCIONARIO DEL EXAMEN (MOSOL)</h2>	
CARRERA: CIENCIAS BASICAS		ASIGNATURA: CALCULO II	FECHA: 18/10/2021
CURSO: SEGUNDO		DOCENTE: Ing. Calixto Capriles Gamboa	
UNIDADES TEMÁTICAS A EVALUAR		1.- Comprende los orígenes y el concepto de administración; 2.- Modelos económicos 3.- Indicadores las distintas influencias y modelos.	

$$N = 10$$

1. Hallar las derivadas de segundo orden de la función

$$f(x,y) = \frac{x^2 - 10y^2}{x^2 + y^2}$$

$$f_x(x,y) = \frac{2x(x^2 + y^2) - (x^2 - 10y^2)2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{22xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = \frac{-20y(x^2 + y^2) - (x^2 - 10y^2)2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-22x^2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_{xx}(x,y) = \frac{22y^2(x^2 + y^2)^2 - 22xy^2 2(x^2 + y^2)2x}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{22y^4 - 66x^2y^2}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$f_{yy}(x,y) = \frac{-22x^2((x^2 + y^2)^2) + 22x^2y 2(x^2 + y^2)2y}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{-22x^4 + 66x^2y^2}{(x^2 + y^2)^3}$$


$$f_{xy}(x,y) = \frac{22x2y(x^2 + y^2)^2 - 22xy^2 2(x^2 + y^2)2y}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{-44xy^3 + 44x^3y}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$f_{yx}(x,y) = \frac{-22(2)xy(x^2 + y^2)^2 + 22x^2y 2(x^2 + y^2)2x}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{-44xy^3 + 44x^3y}{(x^2 + y^2)^3}$$

2. Hallar el dominio de la función y graficar dicho dominio

$$f(x,y) = \ln(-x^2 + Ny - 2)$$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / -x^2 + 10y - 2 > 0\}$$



3. Si g es una función real de dos variables independientes diferenciable, definida por $z = g(x,y) = e^{x^2y}$ pruebe que para $x \neq 0$

$$\frac{1}{N^2} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{N} 2x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{N^2} \frac{4y^2}{x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \frac{1}{N^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2(y - 2x)z$$

Solución:

$$\frac{1}{100} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{5} x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{25} \frac{y^2}{x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{50} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2(y - 2x)z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{x^2y} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2e^{x^2y} + 4x^2ye^{x^2y} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^4e^{x^2y}$$


$$\frac{1}{100} (2ye^{x^2y}(2yx^2 + 1)) + \frac{1}{5} x^2 (2xe^{x^2y}) - \frac{1}{25} \frac{y^2}{x^2} (x^4e^{x^2y}) - \frac{1}{50} (2xe^{x^2y}(yx^2 + 1)) = 2(y - 2x)e^{x^2y}$$

$$\frac{1}{50} e^{x^2y} (y - 2x - 2x^3y + 20x^3) = 2(y - 2x)e^{x^2y}$$

NO SE VERIFICA LA IGUALDAD

4. Utilizar multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones de una caja que tiene forma rectangular, cerrada es decir con tapa, con un volumen de 10 cm^3 y en la cual se utilice la menor cantidad de material para su construcción.

Solución:



$$V = xyz = 10 \quad A = 2xy + 2xz + 2yz$$

$$\begin{cases} 2y + 2z = \gamma yz \\ 2x + 2z = \gamma xz \\ 2x + 2y = \gamma xy \\ xyz = 10 \end{cases} : x = 2.1544, y = 2.1544, z = 2.1544,$$

entonces la caja debe ser un cubo.

5. Clasificar los puntos criticos de la función real de dos variables definida por

$$h(x, y) = 30x^2y + 10x^2 - 60x - 30y - 20$$

Solución.

$$h_x(x, y) = 20x + 60xy - 60$$

$$h_y(x, y) = 30x^2 - 30$$

$$\begin{cases} 20x + 60xy - 60 = 0 \\ 30x^2 - 30 = 0 \end{cases}$$

$$PC = \left\{ \left(1, \frac{2}{3}\right) \left(-1, -\frac{4}{3}\right) \right\}$$

$$h_{xx}(x, y) = 60y + 20 \quad h_{yy}(x, y) = 0 \quad h_{xy}(x, y) = 60x \quad h_{yx}(x, y) = 60x$$

$$d(x, y) = \begin{vmatrix} 60y + 20 & 60x \\ 60x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{para } \left(1, \frac{2}{3}\right)$$

$$d\left(1, \frac{2}{3}\right) = \begin{vmatrix} 60\left(\frac{2}{3}\right) + 20 & 60 \\ 60 & 0 \end{vmatrix} = -3600 < 0 \text{ entonces silla}$$

para $\left(-1, -\frac{4}{3}\right)$

$$d\left(-1, -\frac{4}{3}\right) = \begin{vmatrix} 60\left(-\frac{4}{3}\right) + 20 & 60(-1) \\ 60(-1) & 0 \end{vmatrix} = -3600 < 0 \text{ entonces silla}$$