

粒子物理基础作业

Clark

7.7 构造代表动量 p 螺旋度 ± 1 归一化的旋量 $u^{(+)}$ 和 $u^{(-)}$ 。即，找出满足方程 (7.49) 和螺旋度算符 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma})$ 的本征值 ± 1 的本征旋量的 u 。

$$\text{解: } \left[u^{(\pm)} = A \begin{pmatrix} u \\ \frac{\pm c|\mathbf{p}|}{(E+mc^2)} u \end{pmatrix}, \text{ 其中 } u = \begin{pmatrix} p_z \pm |\mathbf{p}| \\ p_x + ip_y \end{pmatrix} \text{ 且 } A^2 = \frac{(E+mc^2)}{2|\mathbf{p}|c(|\mathbf{p}| \pm p_z)} \right] \quad (1)$$

解:

由正文可知, (7.49) 为

$$(\gamma^\mu p_\mu - mc)u(p) = 0. \quad (2)$$

我们需要构造满足 Dirac 方程和螺旋度算符本征值条件的旋量。螺旋度算符定义为 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma}$, 其中 $\hat{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$ 是动量方向的单位矢量, $\boldsymbol{\Sigma}$ 是自旋算符。Dirac 理论中, 自旋算符可以表示为:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}, \quad (3)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 是 Pauli 矩阵。螺旋度算符的本征值方程为:

$$(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma})u^{(\pm)} = \pm u^{(\pm)}. \quad (4)$$

我们考虑旋量的线性组合:

$$u^{(\pm)} = au^{(1)} + bu^{(2)}, \quad (5)$$

其中 $u^{(1)}$ 和 $u^{(2)}$ 是 Dirac 方程的两个线性独立解:

$$u^{(1)} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{cp_z}{E+mc^2} \\ \frac{c(p_x+ip_y)}{E+mc^2} \end{pmatrix}, \quad u^{(2)} = N \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{c(p_x-ip_y)}{E+mc^2} \\ -\frac{cp_z}{E+mc^2} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

螺旋度算符的矩阵形式为:

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}, \quad (7)$$

其中

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \hat{p}_z & \hat{p}_x - i\hat{p}_y \\ \hat{p}_x + i\hat{p}_y & -\hat{p}_z \end{pmatrix}. \quad (8)$$

将螺旋度算符作用于 $u^{(\pm)}$:

$$\begin{aligned}
 (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma}) u^{(\pm)} &= \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} \left\{ aN \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{cp_z}{E+mc^2} \\ \frac{c(p_x+ip_y)}{E+mc^2} \end{pmatrix} + bN \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{c(p_x-ip_y)}{E+mc^2} \\ -\frac{cp_z}{E+mc^2} \end{pmatrix} \right\} \\
 &= N \left\{ a \begin{pmatrix} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \frac{c}{E+mc^2} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} p_z \\ p_x + ip_y \end{pmatrix} \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \frac{c}{E+mc^2} (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} p_x - ip_y \\ -p_z \end{pmatrix} \end{pmatrix} \right\}. \quad (9)
 \end{aligned}$$

计算各分量:

$$\begin{aligned}
 (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \hat{p}_z \\ \hat{p}_x + i\hat{p}_y \end{pmatrix}, \quad (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{p}_x - i\hat{p}_y \\ -\hat{p}_z \end{pmatrix}, \\
 (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} p_z \\ p_x + ip_y \end{pmatrix} &= |\mathbf{p}| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \begin{pmatrix} p_x - ip_y \\ -p_z \end{pmatrix} = |\mathbf{p}| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (10)
 \end{aligned}$$

代入得:

$$\begin{aligned}
 (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\Sigma}) u^{(\pm)} &= N \left\{ a \begin{pmatrix} \hat{p}_z \\ \hat{p}_x + i\hat{p}_y \\ \frac{c|\mathbf{p}|}{E+mc^2} \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} \hat{p}_x - i\hat{p}_y \\ -\hat{p}_z \\ 0 \\ -\frac{c|\mathbf{p}|}{E+mc^2} \end{pmatrix} \right\} \\
 &= \pm |\mathbf{p}| N \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{cp_z}{E+mc^2} \\ \frac{c(p_x+ip_y)}{E+mc^2} \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{c(p_x-ip_y)}{E+mc^2} \\ -\frac{cp_z}{E+mc^2} \end{pmatrix} \right\}. \quad (11)
 \end{aligned}$$

比较第一个分量:

$$a\hat{p}_z + b(\hat{p}_x - i\hat{p}_y) = \pm a. \quad (12)$$

由于 $\hat{p}_x = \frac{p_x}{|\mathbf{p}|}$, $\hat{p}_y = \frac{p_y}{|\mathbf{p}|}$, $\hat{p}_z = \frac{p_z}{|\mathbf{p}|}$, 上式可写为:

$$ap_z + b(p_x - ip_y) = \pm a|\mathbf{p}|. \quad (13)$$

解得:

$$b = \frac{\pm a|\mathbf{p}| - ap_z}{p_x - ip_y} = a \frac{\pm |\mathbf{p}| - p_z}{p_x - ip_y}. \quad (14)$$

取 $a = 1$, 则:

$$b = \frac{\pm |\mathbf{p}| - p_z}{p_x - ip_y}. \quad (15)$$

因此, 旋量可表示为:

$$u^{(\pm)} = N \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\pm |\mathbf{p}| - p_z}{p_x - ip_y} \\ \frac{cp_z}{E+mc^2} + \frac{c(p_x-ip_y)}{E+mc^2} \cdot \frac{\pm |\mathbf{p}| - p_z}{p_x - ip_y} \\ \frac{c(p_x+ip_y)}{E+mc^2} - \frac{cp_z}{E+mc^2} \cdot \frac{\pm |\mathbf{p}| - p_z}{p_x - ip_y} \end{pmatrix} \quad (16)$$

化简后可得：

$$u^{(\pm)} = A \begin{pmatrix} p_z \pm |\mathbf{p}| \\ p_x + ip_y \\ \frac{\pm c|\mathbf{p}|(p_z \pm |\mathbf{p}|)}{E + mc^2} \\ \frac{\pm c|\mathbf{p}|(p_x + ip_y)}{E + mc^2} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u \\ \frac{\pm c|\mathbf{p}|}{E + mc^2} u \end{pmatrix}, \quad (17)$$

其中 $u = \begin{pmatrix} p_z \pm |\mathbf{p}| \\ p_x + ip_y \end{pmatrix}$, $A = \frac{N}{p_z \pm |\mathbf{p}|}$ 。现在确定归一化常数 A 。归一化条件为 $u^{(\pm)\dagger}u^{(\pm)} = \frac{2E}{c}$ 。

$$\begin{aligned} u^{(\pm)\dagger}u^{(\pm)} &= |A|^2 \left(u^\dagger u + \frac{c^2|\mathbf{p}|^2}{(E + mc^2)^2} u^\dagger u \right) \\ &= |A|^2 \left(1 + \frac{c^2|\mathbf{p}|^2}{(E + mc^2)^2} \right) u^\dagger u. \end{aligned} \quad (18)$$

计算 $u^\dagger u$ ：

$$\begin{aligned} u^\dagger u &= (p_z \pm |\mathbf{p}|p_x - ip_y) \begin{pmatrix} p_z \pm |\mathbf{p}| \\ p_x + ip_y \end{pmatrix} \\ &= (p_z \pm |\mathbf{p}|)^2 + p_x^2 + p_y^2 \\ &= p_z^2 \pm 2p_z|\mathbf{p}| + |\mathbf{p}|^2 + p_x^2 + p_y^2 \\ &= 2|\mathbf{p}|^2 \pm 2p_z|\mathbf{p}| \\ &= 2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| \pm p_z). \end{aligned} \quad (19)$$

又因为 $c^2|\mathbf{p}|^2 = E^2 - m^2c^4$ ，所以：

$$1 + \frac{c^2|\mathbf{p}|^2}{(E + mc^2)^2} = 1 + \frac{E^2 - m^2c^4}{(E + mc^2)^2} = \frac{2E(E + mc^2)}{(E + mc^2)^2} = \frac{2E}{E + mc^2}. \quad (20)$$

因此：

$$u^{(\pm)\dagger}u^{(\pm)} = |A|^2 \cdot \frac{2E}{E + mc^2} \cdot 2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| \pm p_z) = |A|^2 \cdot \frac{4E|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| \pm p_z)}{E + mc^2}. \quad (21)$$

令其等于 $\frac{2E}{c}$ ：

$$|A|^2 \cdot \frac{4E|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| \pm p_z)}{E + mc^2} = \frac{2E}{c}. \quad (22)$$

解得：

$$|A|^2 = \frac{E + mc^2}{2c|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| \pm p_z)}. \quad (23)$$

因此，我们得到了满足 Dirac 方程和螺旋度算符本征值条件的归一化旋量 $u^{(\pm)}$ 。

7.14 证明 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 在方程 (7.52) 变换下是不变的。

解：

由正文可知，(7.52) 为

$$\psi \rightarrow \psi' = S\psi, \quad (24)$$

其中 S 是如下 4×4 矩阵：

$$S = a_+ + a_- \gamma^0 \gamma^1 = \begin{pmatrix} a_+ I & a_- \sigma_1 \\ a_- \sigma_1 & a_+ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_+ & 0 & 0 & a_- \\ 0 & a_+ & a_- & 0 \\ 0 & a_- & a_+ & 0 \\ a_- & 0 & 0 & a_+ \end{pmatrix}, \quad (25)$$

其中

$$a_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(\gamma \pm 1)}, \quad (26)$$

如通常一样 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 。我们需要证明赧标量量 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 在此变换下保持不变，即：

$$(\bar{\psi}\gamma^5\psi)' = \bar{\psi}\gamma^5\psi. \quad (27)$$

按照定义，变换后的量为：

$$\begin{aligned} (\bar{\psi}\gamma^5\psi)' &= (\psi'^{\dagger}\gamma^0\gamma^5\psi') \\ &= (S\psi)^{\dagger}\gamma^0\gamma^5(S\psi) \\ &= \psi^{\dagger}S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S\psi. \end{aligned} \quad (28)$$

因此，我们需要证明：

$$S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S = \gamma^0\gamma^5. \quad (29)$$

首先，我们证明 γ^5 与 S 对易。在 Dirac 表示中， γ^5 矩阵为：

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

计算 γ^5S ：

$$\begin{aligned} \gamma^5S &= \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_-\sigma_1 & a_+I \\ a_+I & a_-\sigma_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (31)$$

计算 $S\gamma^5$ ：

$$\begin{aligned} S\gamma^5 &= \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_-\sigma_1 & a_+I \\ a_+I & a_-\sigma_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (32)$$

比较两式，我们发现：

$$\gamma^5S = S\gamma^5. \quad (33)$$

因此， γ^5 与 S 对易。现在，我们需要计算 $S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S$ 。利用上面的对易关系：

$$S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S = S^{\dagger}\gamma^0S\gamma^5. \quad (34)$$

已知 $S^{\dagger}\gamma^0S = \gamma^0$ ，我们得到：

$$S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S = \gamma^0\gamma^5. \quad (35)$$

因此，变换后的赧标量为：

$$\begin{aligned} (\bar{\psi}\gamma^5\psi)' &= \psi^{\dagger}S^{\dagger}\gamma^0\gamma^5S\psi \\ &= \psi^{\dagger}\gamma^0\gamma^5\psi \\ &= \bar{\psi}\gamma^5\psi. \end{aligned} \quad (36)$$

这就证明了赝标量 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 在沿 x 方向的 Lorentz 变换下是不变的。为了完整性,我们简要说明 $S^\dagger\gamma^0S = \gamma^0$ 。对于沿 x 方向的 Lorentz 变换, 变换矩阵 S 满足:

$$S^\dagger\gamma^0S = \gamma^0. \quad (37)$$

这一性质可以通过直接计算验证。首先计算 S^\dagger :

$$S^\dagger = \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix}, \quad (38)$$

因为 a_\pm 是实数, 且 σ_1 是 Hermitian 矩阵。然后计算 $S^\dagger\gamma^0S$:

$$\begin{aligned} S^\dagger\gamma^0S &= \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_+I & -a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & -a_+I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+I & a_-\sigma_1 \\ a_-\sigma_1 & a_+I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_+^2I - a_-^2\sigma_1^2 & a_+a_-\sigma_1 - a_+a_-\sigma_1I \\ a_+a_-\sigma_1I - a_+a_-\sigma_1 & a_-^2\sigma_1^2 - a_+^2I \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (39)$$

由于 $\sigma_1^2 = I$, 且 I 与 σ_1 对易, 我们得到:

$$S^\dagger\gamma^0S = \begin{pmatrix} (a_+^2 - a_-^2)I & 0 \\ 0 & -(a_+^2 - a_-^2)I \end{pmatrix}. \quad (40)$$

由 a_\pm 的定义:

$$a_+^2 - a_-^2 = \frac{1}{2}(\gamma + 1) - \frac{1}{2}(\gamma - 1) = 1. \quad (41)$$

因此:

$$S^\dagger\gamma^0S = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} = \gamma^0. \quad (42)$$

7.26 计算在质心系中电子-缪子散射的振幅 (方程 (7.106)), 假设 e 和 μ 沿 z 轴相互接近, 相斥, 然后沿 z 轴返回。假设初态和末态粒子都具有螺旋度 $+1$ 。(答案: $\mathcal{M} = -2g_e^2$)

解:

由正文可知, (7.106) 为

$$\mathcal{M} = -\frac{g_e^2}{(p_1 - p_3)^2} [\bar{u}^{(s_3)}(p_3)\gamma^\mu u^{(s_1)}(p_1)] [\bar{u}^{(s_4)}(p_4)\gamma_\mu u^{(s_2)}(p_2)]. \quad (43)$$



在质心系中, 我们设定动量如下:

$$\begin{aligned} p_1 &= (E_e, 0, 0, p) \quad (\text{入射电子}), \\ p_2 &= (E_\mu, 0, 0, -p) \quad (\text{入射缪子}), \\ p_3 &= (E_e, 0, 0, -p) \quad (\text{出射电子}), \\ p_4 &= (E_\mu, 0, 0, p) \quad (\text{出射缪子}). \end{aligned} \quad (44)$$

其中 $p = |\mathbf{p}|$ 是动量大小, $E_e = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$, $E_\mu = \sqrt{p^2 c^2 + M^2 c^4}$, m 是电子质量, M 是缪子质量。根据螺旋度 +1 的旋量表达式, 我们有: 对于电子 (质量 m):

$$u(1) = \begin{pmatrix} a_+ \\ 0 \\ a_- \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u(3) = \begin{pmatrix} 0 \\ a_+ \\ 0 \\ a_- \end{pmatrix}, \quad (45)$$

$$a_{\pm} = \sqrt{\frac{E_e \pm mc^2}{c}},$$

对于缪子 (质量 M):

$$u(2) = \begin{pmatrix} 0 \\ b_+ \\ 0 \\ b_- \end{pmatrix}, \quad u(4) = \begin{pmatrix} b_+ \\ 0 \\ b_- \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (46)$$

$$b_{\pm} = \sqrt{\frac{E_\mu \pm Mc^2}{c}}.$$

首先计算传播子分母:

$$(p_1 - p_3)^2 = (0, 0, 0, 2p)^2 = -4p^2. \quad (47)$$

振幅可写为:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= -\frac{g_e^2}{-4p^2} [\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)] [\bar{u}(4)\gamma_\mu u(2)] \\ &= \frac{g_e^2}{4p^2} [\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)] [\bar{u}(4)\gamma_\mu u(2)]. \end{aligned} \quad (48)$$

定义电子流和缪子流:

$$J_e^\mu = \bar{u}(3)\gamma^\mu u(1), \quad J_\mu^\mu = \bar{u}(4)\gamma_\mu u(2), \quad (49)$$

使用 Dirac 表示下的 γ 矩阵:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}. \quad (50)$$

首先计算电子流 J_e^μ 。计算 $\bar{u}(3)$:

$$\bar{u}(3) = u(3)^\dagger \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix}, \quad (51)$$

时间分量:

$$\begin{aligned}
 J_e^0 &= \bar{u}(3)\gamma^0 u(1) = \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+ \\ 0 \\ a_- \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+ \\ 0 \\ -a_- \\ 0 \end{pmatrix} = 0,
 \end{aligned} \tag{52}$$

空间分量 ($i = 1, 2, 3$):

$$\begin{aligned}
 J_e^i &= \bar{u}(3)\gamma^i u(1) = \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+ \\ 0 \\ a_- \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma^i \begin{pmatrix} a_- \\ 0 \end{pmatrix} \\ -\sigma^i \begin{pmatrix} a_+ \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & a_+ & 0 & -a_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11}^i a_- \\ \sigma_{21}^i a_- \\ -\sigma_{11}^i a_+ \\ -\sigma_{21}^i a_+ \end{pmatrix} \\
 &= a_+ \sigma_{21}^i a_- - a_- (-\sigma_{21}^i a_+) = 2a_+ a_- \sigma_{21}^i.
 \end{aligned} \tag{53}$$

现在计算缪子流 $J_{\mu,\mu}$ 。计算 $\bar{u}(4)$:

$$\bar{u}(4) = u(4)^\dagger \gamma^0 = \begin{pmatrix} b_+ & 0 & b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix}, \tag{54}$$

时间分量:

$$\begin{aligned}
 J_\mu^0 &= \bar{u}(4)\gamma^0 u(2) = \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b_+ \\ 0 \\ b_- \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b_+ \\ 0 \\ -b_- \end{pmatrix} = 0,
 \end{aligned} \tag{55}$$

空间分量 ($i = 1, 2, 3$):

$$\begin{aligned}
 J_\mu^i &= \bar{u}(4)\gamma^i u(2) = \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b_+ \\ 0 \\ b_- \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma^i \begin{pmatrix} 0 \\ b_- \end{pmatrix} \\ -\sigma^i \begin{pmatrix} 0 \\ b_+ \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} b_+ & 0 & -b_- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{12}^i b_- \\ \sigma_{22}^i b_- \\ -\sigma_{12}^i b_+ \\ -\sigma_{22}^i b_+ \end{pmatrix} \\
 &= b_+ \sigma_{12}^i b_- + (-b_-)(-\sigma_{12}^i b_+) = 2b_+ b_- \sigma_{12}^i,
 \end{aligned} \tag{56}$$

现在计算流乘积:

$$\begin{aligned}
 [\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)] [\bar{u}(4)\gamma_\mu u(2)] &= J_e^\mu J_{\mu,\mu} = J_e^0 J_\mu^0 - \sum_{i=1}^3 J_e^i J_\mu^i \\
 &= 0 - \sum_{i=1}^3 (2a_+ a_- \sigma_{21}^i)(2b_+ b_- \sigma_{12}^i) \\
 &= -4a_+ a_- b_+ b_- \sum_{i=1}^3 \sigma_{21}^i \sigma_{12}^i,
 \end{aligned} \tag{57}$$

计算 Pauli 矩阵乘积求和:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^3 \sigma_{21}^i \sigma_{12}^i &= \sigma_{21}^1 \sigma_{12}^1 + \sigma_{21}^2 \sigma_{12}^2 + \sigma_{21}^3 \sigma_{12}^3 \\
 &= (1)(1) + (i)(-i) + (0)(0) = 1 + 1 + 0 = 2.
 \end{aligned} \tag{58}$$

因此:

$$[\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)] [\bar{u}(4)\gamma_\mu u(2)] = -8a_+ a_- b_+ b_- . \tag{59}$$

代入振幅表达式:

$$\mathcal{M} = \frac{g_e^2}{4p^2} (-8a_+ a_- b_+ b_-) = -\frac{2g_e^2}{p^2} a_+ a_- b_+ b_- . \tag{60}$$

计算 $a_+ a_-$ 和 $b_+ b_-$:

$$\begin{aligned}
 a_+ a_- &= \sqrt{\frac{E_e + mc^2}{c}} \sqrt{\frac{E_e - mc^2}{c}} = \sqrt{\frac{E_e^2 - m^2 c^4}{c^2}} = \frac{\sqrt{E_e^2 - m^2 c^4}}{c} = \frac{pc}{c} = p, \\
 b_+ b_- &= \sqrt{\frac{E_\mu + Mc^2}{c}} \sqrt{\frac{E_\mu - Mc^2}{c}} = \sqrt{\frac{E_\mu^2 - M^2 c^4}{c^2}} = \frac{\sqrt{E_\mu^2 - M^2 c^4}}{c} = \frac{pc}{c} = p,
 \end{aligned} \tag{61}$$

因此:

$$\mathcal{M} = -\frac{2g_e^2}{p^2} \cdot p \cdot p = -2g_e^2 . \tag{62}$$

补充 在量子电动力学 (QED) 中, $g_e = e$, 因此最终结果为:


$$\mathcal{M} = -2e^2. \quad (63)$$

7.42 推导方程 (7.176)。你将需要那个最后的 Feynman 规则: 对一个闭合费米子圈要包含一个因子 -1 并求迹。

解:

由正文可知, (7.176) 为

$$\mathcal{M} = -\frac{ig_e^4}{q^4} [\bar{u}(p_3)\gamma^\mu u(p_1)] \left\{ \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\text{tr}(\gamma_\mu(\not{p} + mc)\gamma_\nu(\not{p} - \not{q} + mc))}{(k^2 - m^2c^2)((p - q)^2 - m^2c^2)} \right\} [\bar{u}(p_4)\gamma^\nu u(p_2)]. \quad (64)$$



考虑电子-缪子散射的箱图修正, 其中包含一个闭合的电子圈。根据 Feynman 规则, 我们逐步构建振幅表达式。首先, 写出完整的振幅表达式, 包含所有传播子、顶点因子和动量守恒 δ 函数:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} = & \int \frac{d^4q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4q_4}{(2\pi)^4} \\ & \times [\bar{u}(p_3)(ig_e\gamma^\mu)u(p_1)] \frac{-ig_{\mu\lambda}}{q_2^2} [\text{LOOP}] \frac{-ig_{\kappa\nu}}{q_1^2} [\bar{u}(p_4)(ig_e\gamma^\nu)u(p_2)] \\ & \times (2\pi)^4\delta^4(p_1 - p_3 - q_2)(2\pi)^4\delta^4(q_2 - q_3 - q_4) \\ & \times (2\pi)^4\delta^4(q_3 + q_4 - q_1)(2\pi)^4\delta^4(q_1 + p_2 - p_4). \end{aligned} \quad (65)$$

其中, 闭合费米子圈 (LOOP) 的贡献为:

$$\text{LOOP} = (-1) \cdot \text{tr} \left[(ig_e\gamma^\lambda) \frac{i(\not{q}_4 + mc)}{q_4^2 - m^2c^2} (ig_e\gamma^\kappa) \frac{i(\not{q}_3 + mc)}{q_3^2 - m^2c^2} \right]. \quad (66)$$

注意闭合费米子圈规则: 包含因子 -1 并对 Dirac 矩阵求迹。现在逐步简化积分变量:

- 对 q_2 积分, 利用 $\delta^4(p_1 - p_3 - q_2)$, 得到 $q_2 = p_1 - p_3 \equiv q$;
- 对 q_1 积分, 利用 $\delta^4(q_1 + p_2 - p_4)$, 得到 $q_1 = p_4 - p_2$;
- 由动量守恒 $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$, 可得 $p_1 - p_3 = p_4 - p_2$, 因此 $q_1 = q$;
- 对 q_3 积分, 利用 $\delta^4(q - q_3 - q_4)$, 得到 $q_3 = q - q_4$;
- 重命名 q_4 为 k , 则 $q_3 = q - k$;

(f) 剩余一个 δ 函数 $(2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$ ，确保总动量守恒。

代入这些关系，振幅变为：

$$\begin{aligned} \mathcal{M} = & \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} [\bar{u}(p_3)(ig_e \gamma^\mu)u(p_1)] \frac{-ig_{\mu\lambda}}{q^2} \\ & \times \left\{ (-1) \cdot \text{tr} \left[(ig_e \gamma^\lambda) \frac{i(\not{k} + mc)}{k^2 - m^2 c^2} (ig_e \gamma^\kappa) \frac{i(\not{q} - \not{k} + mc)}{(q - k)^2 - m^2 c^2} \right] \right\} \\ & \times \frac{-ig_{\kappa\nu}}{q^2} [\bar{u}(p_4)(ig_e \gamma^\nu)u(p_2)]. \end{aligned} \quad (67)$$

现在整理常数因子：

$$\begin{aligned} & ig_e \cdot (-i) \cdot (-1) \cdot ig_e \cdot i \cdot ig_e \cdot i \cdot (-i) \cdot ig_e \\ & = i \cdot (-i) \cdot (-1) \cdot i \cdot i \cdot i \cdot (-i) \cdot i \cdot g_e^4 \\ & = i \cdot (-i) \cdot (-1) \cdot i^4 \cdot (-i) \cdot i \cdot g_e^4 \\ & = (1) \cdot (-1) \cdot (1) \cdot (-i) \cdot i \cdot g_e^4 \\ & = (1) \cdot (-1) \cdot (-i) \cdot i \cdot g_e^4 \\ & = (1) \cdot (i) \cdot i \cdot g_e^4 \\ & = (1) \cdot (-1) \cdot g_e^4 = -g_e^4. \end{aligned} \quad (68)$$

但我们需要额外乘以 i 因子（来自 LSZ 约化公式），因此总常数为 $-ig_e^4$ 。代入并整理，得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{M} = & -\frac{ig_e^4}{q^4} [\bar{u}(p_3)\gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(p_4)\gamma^\nu u(p_2)] \\ & \times \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\text{tr} [\gamma_\mu (\not{k} + mc) \gamma_\nu (\not{q} - \not{k} + mc)]}{(k^2 - m^2 c^2)((q - k)^2 - m^2 c^2)}. \end{aligned} \quad (69)$$

由于迹是标量，我们可以重新标记积分变量 $k \rightarrow -k$ ，并利用 $\not{q} - \not{k} = -(\not{k} - \not{q})$ ，但迹在同时改变所有 γ 矩阵符号时不变（因为迹是线性的且 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$ 等性质），因此可以写作：

$$\mathcal{M} = -\frac{ig_e^4}{q^4} [\bar{u}(p_3)\gamma^\mu u(p_1)] \left\{ \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\text{tr} (\gamma_\mu (\not{k} + mc) \gamma_\nu (\not{k} - \not{q} + mc))}{(k^2 - m^2 c^2)((k - q)^2 - m^2 c^2)} \right\} [\bar{u}(p_4)\gamma^\nu u(p_2)]. \quad (70)$$


7.50 (a) 在此理论中，对湮灭 ($e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$) 计算振幅 \mathcal{M} 。

(b) 计算 $\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle$ ，假设能量足够高我们可以忽略电子和“光子”的质量 ($m_e, m_\gamma \rightarrow 0$)。

(c) 在质心系中计算 (b) 的结果。用入射电子能量 E 和散射角 θ 表达你的结果。

(d) 计算质心系中对湮灭的微分截面，仍然假定 $m_e = m_\gamma = 0$ 。总截面是有限的吗？

解：



(a) 依据公式

$$\int \left[\bar{v}(p_2) i g_e \frac{i(\not{q} + m_e c)}{q^2 - m_e^2 c^2} i g_e u(p_1) \right] \times (2\pi)^4 \delta^4(p_1 - p_3 - q) (2\pi)^4 \delta^4(p_2 + q - p_4) \frac{d^4 q}{(2\pi)^4}. \quad (71)$$

于是, 对于电子-正电子湮灭为双光子的过程, 有两个 Feynman 图贡献, 对应于两个光子交换的通道。根据 Feynman 规则, 总振幅为两个图的和:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2, \quad (72)$$

其中第一个图的振幅为:

$$\mathcal{M}_1 = \frac{e^2}{(p_1 - p_3)^2 - m_e^2 c^2} \left[\bar{v}(p_2)(\not{p}_1 - \not{p}_3 + m_e c)u(p_1) \right], \quad (73)$$

第二个图的振幅为:

$$\mathcal{M}_2 = \frac{e^2}{(p_1 - p_4)^2 - m_e^2 c^2} \left[\bar{v}(p_2)(\not{p}_1 - \not{p}_4 + m_e c)u(p_1) \right], \quad (74)$$

因此总振幅为:

$$\mathcal{M} = e^2 \bar{v}(p_2) \left[\frac{\not{p}_1 - \not{p}_3 + m_e c}{(p_1 - p_3)^2 - m_e^2 c^2} + \frac{\not{p}_1 - \not{p}_4 + m_e c}{(p_1 - p_4)^2 - m_e^2 c^2} \right] u(p_1). \quad (75)$$

(b) 在零质量极限 $m_e \rightarrow 0$, $m_\gamma \rightarrow 0$ 下, 我们有:

$$(p_1 - p_3)^2 = -2p_1 \cdot p_3, \quad (p_1 - p_4)^2 = -2p_1 \cdot p_4, \quad (76)$$

并且由于 $m_e = 0$, Dirac 方程给出 $\not{p}_1 u(p_1) = 0$, $\bar{v}(p_2)\not{p}_2 = 0$ 。振幅简化为:

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{2} \bar{v}(p_2) \left[\frac{\not{p}_3}{p_1 \cdot p_3} + \frac{\not{p}_4}{p_1 \cdot p_4} \right] u(p_1). \quad (77)$$

现在计算振幅平方的平均值 $\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle$ 。对初态自旋求平均 (因子 $\frac{1}{4}$):

$$\begin{aligned} \langle |\mathcal{M}|^2 \rangle &= \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{e^2}{2} \right)^2 \sum_{\text{spins}} \left| \bar{v}(p_2) \left[\frac{\not{p}_3}{p_1 \cdot p_3} + \frac{\not{p}_4}{p_1 \cdot p_4} \right] u(p_1) \right|^2. \end{aligned} \quad (78)$$

利用迹技术:

$$\sum_{\text{spins}} |\bar{v}(p_2) A u(p_1)|^2 = \text{tr} [A \not{p}_1 \bar{A} \not{p}_2], \quad (79)$$

其中 $A = \frac{\not{p}_3}{p_1 \cdot p_3} + \frac{\not{p}_4}{p_1 \cdot p_4}$, $\bar{A} = \gamma^0 A^\dagger \gamma^0$ 。在计算后得到:

$$\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle = e^4 \left[\frac{p_2 \cdot p_3}{p_1 \cdot p_3} + \frac{p_2 \cdot p_4}{p_1 \cdot p_4} - \frac{(p_1 \cdot p_2)(p_3 \cdot p_4)}{2(p_1 \cdot p_3)(p_1 \cdot p_4)} \right]. \quad (80)$$

(c) 在质心系中, 设入射电子和正电子能量为 E , 动量大小为 $p = \frac{E}{c}$ (在零质量极限下)。选择坐标系使得电子沿 $+z$ 方向运动, 正电子沿 $-z$ 方向运动。四动量分量为:

$$\begin{aligned} p_1 &= \left(\frac{E}{c}, 0, 0, p \right), \\ p_2 &= \left(\frac{E}{c}, 0, 0, -p \right), \\ p_3 &= \left(\frac{E}{c}, \frac{E}{c} \sin \theta, 0, \frac{E}{c} \cos \theta \right), \\ p_4 &= \left(\frac{E}{c}, -\frac{E}{c} \sin \theta, 0, -\frac{E}{c} \cos \theta \right). \end{aligned} \quad (81)$$

计算所需的标量积:

$$\begin{aligned}
 p_1 \cdot p_3 &= \frac{E^2}{c^2} (1 - \cos \theta), \\
 p_1 \cdot p_4 &= \frac{E^2}{c^2} (1 + \cos \theta), \\
 p_2 \cdot p_3 &= \frac{E^2}{c^2} (1 + \cos \theta), \\
 p_2 \cdot p_4 &= \frac{E^2}{c^2} (1 - \cos \theta), \\
 p_1 \cdot p_2 &= 2 \frac{E^2}{c^2}, \\
 p_3 \cdot p_4 &= 2 \frac{E^2}{c^2}.
 \end{aligned} \tag{82}$$

代入振幅平方表达式:

$$\begin{aligned}
 \langle |\mathcal{M}|^2 \rangle &= e^4 \left[\frac{\frac{E^2}{c^2} (1 + \cos \theta)}{\frac{E^2}{c^2} (1 - \cos \theta)} + \frac{\frac{E^2}{c^2} (1 - \cos \theta)}{\frac{E^2}{c^2} (1 + \cos \theta)} - \frac{\left(2 \frac{E^2}{c^2}\right) \left(2 \frac{E^2}{c^2}\right)}{2 \left[\frac{E^2}{c^2} (1 - \cos \theta) \right] \left[\frac{E^2}{c^2} (1 + \cos \theta) \right]} \right] \\
 &= e^4 \left[\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} - \frac{2}{1 - \cos^2 \theta} \right],
 \end{aligned} \tag{83}$$

化简:

$$\begin{aligned}
 \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} &= \frac{(1 + \cos \theta)^2 + (1 - \cos \theta)^2}{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)} \\
 &= \frac{2(1 + \cos^2 \theta)}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{2(1 + \cos^2 \theta)}{\sin^2 \theta}.
 \end{aligned} \tag{84}$$

因此:

$$\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle = e^4 \left[\frac{2(1 + \cos^2 \theta)}{\sin^2 \theta} - \frac{2}{\sin^2 \theta} \right] = 2e^4 \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 2e^4 \cot^2 \theta. \tag{85}$$

(d) 在质心系中, 两体末态的微分截面公式为:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{\hbar c}{8\pi} \right)^2 \frac{S \langle |\mathcal{M}|^2 \rangle}{(E_{\text{cm}})^2}, \tag{86}$$

其中 $E_{\text{cm}} = 2E$ 是质心系总能量, $S = \frac{1}{2}$ 是全同玻色子末态的统计因子。代入 $\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle = 2e^4 \cot^2 \theta$:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \left(\frac{\hbar c}{8\pi} \right)^2 \frac{\frac{1}{2} \cdot 2e^4 \cot^2 \theta}{(2E)^2} \\
 &= \left(\frac{\hbar c}{8\pi} \right)^2 \frac{e^4 \cot^2 \theta}{4E^2} \\
 &= \left(\frac{\hbar c e^2}{16\pi E} \right)^2 \cot^2 \theta.
 \end{aligned} \tag{87}$$

总截面为:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin \theta d\theta, \tag{88}$$

代入微分截面:

$$\sigma = 2\pi \left(\frac{\hbar c e^2}{16\pi E} \right)^2 \int_0^\pi \cot^2 \theta \sin \theta d\theta. \tag{89}$$

计算积分:

$$\int_0^\pi \cot^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} d\theta. \tag{90}$$

在 $\theta \rightarrow 0$ 和 $\theta \rightarrow \pi$ 时, 被积函数发散:

$$\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \sim \frac{1}{\theta} \quad (\theta \rightarrow 0), \quad \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \sim \frac{1}{\pi - \theta} \quad (\theta \rightarrow \pi). \quad (91)$$

因此积分发散, 总截面不是有限的。这种发散是红外发散的典型例子, 在量子电动力学中需要通过包括软光子辐射来正确处理。

$$\sigma \rightarrow \infty. \quad (92)$$

总截面不是有限的, 这是由于在向前和向后方向 ($\theta = 0, \pi$) 的发散行为造成的。