ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Vermisol 75 mg/g proszek do sporządzania roztworu dla świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy g zawiera:
Substancje czynne:
Lewamizolu chlorowodorek 75 mg

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników
Laktoza jednowodna
Sacharoza

Proszek barwy białej do jasnożółtej.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Świnia

3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie inwazji pasożytniczych u świń wywołanych przez nicienie wrażliwe na działanie lewamizolu: *Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum* spp*., Strongyloides ransomi, Metastrongylus* spp.

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować równocześnie z innymi produktami o właściwościach cholinomimetycznych lub nikotynowych.
Nie podawać w okresie 14 dni przed i 14 dni po zastosowaniu związków fosforoorganicznych.
Weterynaryjnego produktu leczniczego nie stosować u loch w okresie do 14 dni przed planowanym terminem porodu.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

3.4 Specjalne ostrzeżenia

Przed podaniem weterynaryjnego produktu leczniczego należy dobrze ocenić wagę leczonych zwierząt.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas podawania produktu.
Podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego należy używać środków ochrony osobistej, na które składa się odzież ochronna.
Osoby o znanej nadwrażliwości na lewamizol powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
Po przypadkowym rozlaniu produktu na skórę miejsce kontaktu należy niezwłocznie spłukać obficie wodą. Po każdorazowym podaniu produktu należy umyć ręce.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:

Nie dotyczy.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Świnia:
Nieznane.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża:
Nie stosować u loch w okresie do 14 dni przed planowanym terminem porodu.

3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki o właściwościach cholinomimetycznych lub nikotynowych, w tym przeciwrobacze takie jak: pyrantel, insektycydy fosforoorganiczne, karbaminiany, dietylokarbamazyna, morantel oraz piperazyna nasilają działanie lewamizolu.
Aktywność lewamizolu nie ulega zmianie w przypadku istniejącej oporności na benzimidazole.

3.9 Droga podania i dawkowanie

W wodzie do picia lub w mleku.
Produkt podawać rozpuszczony w wodzie do picia lub w mleku w ilości 7,5 mg chlorowodorku lewamizolu / kg m.c., (co odpowiada 1,0 g produktu na 10 kg m.c.). Produkt podać jednorazowo, rozpuszczony w ilości wody gwarantującej jej wypicie. Odrobaczanie przeprowadzić u loch na 2-3 tygodnie przed oproszeniem i po odsadzeniu prosiąt. Prosięta odrobaczać bezpośrednio po odsadzeniu. Zabieg odrobaczania powtórzyć po 14 dniach. Zwierzęta zdrowe można odrobaczać grupowo, osobniki osłabione – indywidualnie.

Każdego dnia należy przygotować świeży roztwór leczniczy.
Masę ciała leczonych zwierząt należy określić jak najdokładniej, aby dawka stosowanego lewamizolu nie była zbyt mała.
Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt. Należy odpowiednio dostosować stężenie roztworu tak, aby uzyskać prawidłową dawkę stosowanego lewamizolu u leczonych zwierząt.

3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Przedawkowanie lewamizolu może prowadzić do występowania objawów takich jak: nadmierne ślinienie, spłycony i skrócony oddech - spowodowany skurczem oskrzeli i oskrzelików, wymioty i biegunkę - spowodowane pobudzeniem perystaltyki przewodu pokarmowego, oddawanie moczu - spowodowane skurczem pęcherza, wahania ciśnienia krwi (najpierw wzrost a potem spadek) - związane z początkowo pobudzającym, a potem blokującym działaniem lewamizolu na zwojowe receptory nikotynowe, drżenia mięśniowe i zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych - powodowane blokiem depolaryzującym płytki nerwowo-mięśniowej.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Tkanki jadalne: 28 dni.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet: QP52AE01

4.2 Dane farmakodynamiczne

Substancją czynną produktu jest lewamizol. Lewamizol jest formą lewoskrętną tetramizolu, leku przeciwrobaczego z grupy imidazotiazoli o działaniu nicieniobójczym.
W działaniu na pasożyty lewamizol jest agonistą receptorów cholinergicznych (zarówno nikotynowych jak i muskarynowych). W następstwie pobudzenia receptorów nikotynowych zwojowych oraz receptorów w płytce motorycznej dochodzi do porażenia spastycznego mięśni, paraliżu i śmierć pasożyta. Paraliż ma charakter odwracalny. Lewamizol działa zarówno na dorosłe postacie pasożyta jak również na te formy larwalne, które mają dobrze wykształcony i aktywny układ nerwowy. Z tego powodu lewamizol tylko w niewielkim stopniu działa na larwy uśpione i nie działa na jaja pasożytów.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Wchłanianie: po podaniu doustnym lewamizol bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego świń i po około 1 godzinie osiąga maksymalne stężenie w osoczu.
Metabolizm i eliminacja:
Analiza farmakokinetyczna wykazała, iż zmiany stężenia lewamizolu w organizmie świń opisuje kinetyka I-rzędu w układzie jednokompartmentowym otwartym.
Biologiczny okres półtrwania lewamizolu podanego doustnie wynosi u świń około 9,3 godziny. Metabolizm przebiega w wątrobie, przy czym po 72 godz. od podania leku w żółci stwierdza się tylko niewielką ilość lewamizolu i jego metabolitów. W początkowym okresie po podaniu, wydalanie następuje głównie z moczem. W okresie 72 godz. od podania lewamizolu około 80% podanej dawki wydala się z moczem, w tym 1/3 to lewamizol w formie niezmienionej. Pozostała część to metabolity, których wykryto około 50. Po 72 godz. przeważa wydalanie wątrobowe. Lewamizol i jego metabolity najdłużej utrzymują się w wątrobie.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Brak informacji dotyczących potencjalnych interakcji lub niezgodności tego weterynaryjnego produktu leczniczego podawanego doustnie poprzez wymieszanie z paszą płynną zawierającą produkty biobójcze, dodatki paszowe lub inne substancje stosowane w wodzie do picia.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 15 dni.
Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: należy zużyć natychmiast.

5.3 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed światłem i wilgocią.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pojemniki polietylenowe z wieczkiem zatrzaskowym zawierające po 100 g, 150 g, 300 g, 500 g produktu.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofaktor Sp. z o.o.

7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

426/97

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28/12/1997.

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

08/2026

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).