ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Apiwarol 12,5 mg tabletki fumigacyjne dla pszczół miodnych

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne:
Każda tabletka zawiera:
Amitraz 12,5 mg

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników:
Węglan etylowo-potasowy
Mączka drzewna
Skrobia zmodyfikowana, ziemniaczana
Potasu azotan
Żelatyna
Parafina ciekła

Tabletka o barwie beżowobrązowej.

3. DANE KLINICZNE

3.1. Docelowe gatunki zwierząt

Pszczoła miodna

3.2. Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół wywoływanej przez *Varroa destructor.*

3.3. Przeciwwskazania

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
Nie odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +10°C.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

3.4. Specjalne ostrzeżenia

Brak.

3.5. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
Działanie amitrazu na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. Podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego należy unikać jego kontaktu ze skórą i wdychania dymu. Podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego należy używać środków ochrony osobistej, na które składają się rękawice ochronne i maska ochronna.

W razie zaobserwowania po kontakcie z produktem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia rytmu serca, czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu.
Po zabiegu umyć ręce.

3.6. Zdarzenia niepożądane

Pszczoła miodna:

Częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych	Zamieranie czerwiu[1], zmiana zachowania: wzmożona ruchliwość pszczół[1]

[1] Może wystąpić przy niewłaściwym sposobie podawania produktu.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7. Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Nie dotyczy.

3.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

3.9. Droga podania i dawkowanie

Weterynaryjny produkt leczniczy działa wyłącznie na roztocza *Varroa destructor* znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego.
Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół.
Ze względu na możliwość przenikania amitrazu do miodu, leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpcji.

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru warstwą klejącą do góry. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

3.10. Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół.

3.11. Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12. Okresy karencji

Miód: 5 dni.
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1. Kod ATCvet:

QP53AD01

4.2. Dane farmakodynamiczne

Działanie amitrazu polega na interakcji z receptorami oktopaminy w układzie nerwowym *Varroa destructor*, powodując wzrost aktywności nerwowej i porażenie pasożyta. Porażone pasożyty odpadają od pszczół na dno ula ginąc po 2 do 72 godzinach.

4.3. Dane farmakokinetyczne

Amitraz ma działanie kontaktowe. W trakcie spalania tabletki uwolniona substancja czynna jest roznoszona z dymem we wnętrzu ula, docierając także do roztoczy bytujących na pszczołach. Amitraz nie przenika do zasklepionych komórek plastrów.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1. Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

5.2. Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 1 rok.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 24 dni.

5.3. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu w celu ochrony przed wilgocią.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4. Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pojemnik z PP z wieczkiem z LDPE, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w tekturowe pudełko.

5.5. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Weterynaryjny produkt leczniczy nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ amitraz może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet Puławy Sp. z o.o.

7. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

740/99

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21/06/1999

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2026

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).