ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bacolam Injectable (250 000 j.m. + 100 mg)/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:
kolistyny siarczan 250 000 j.m.
amoksycylina 100 mg
(w postaci amoksycyliny trójwodnej 114,8 mg)

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników
makrogologlicerolu rycynooleinian
triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Biała lub biaława homogenna zawiesina.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, świnia.

3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Weterynaryjny produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu następujących schorzeń:
- zakażenia układu oddechowego: zapalenie oskrzeli, bronchopneumonia, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, powikłania bakteryjne związane z wirusowym zapaleniem płuc, grypa cieląt, enzootyczne zapalenie płuc świń;
- zakażenia układu pokarmowego: zapalenie jelit, zapalenie dróg żółciowych i wątroby;
- kolibakterioza bydła;
- zakażenia wywołane przez paciorkowce i gronkowce u świń;
- zakażenia układu moczowego (śródmiąższowe i odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza);
- zakażenia układu płciowego;
- zakażenia skóry (wysiękowe zapalenie skóry świń);
- zakażenia stawów;
- choroba obrzękowa świń;

wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na połączenie amoksycyliny i kolistyny, w szczególności bakterie Gram-dodatnie (w tym *Actinomyces* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp. i *Streptococcus* spp.), bakterie Gram-ujemne (w tym *Actinobacillus* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp. i *Shigella* spp.) oraz *Leptospira* spp.

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na penicyliny i (lub) cefalosporyny.
Nie stosować, jeśli u zwierząt występuje niewydolność nerek i stan odwodnienia – możliwość działania nefrotoksycznego.

3.4 Specjalne ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanych dawek weterynaryjnego produktu leczniczego. W przypadku dużych zwierząt, przy większej objętości iniekcji wskazane jest podzielenie dawki, poprzez podanie jej w kilku miejscach.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego powinno być oparte na identyfikacji i badaniu lekowrażliwości patogenów docelowych. Jeżeli nie jest to możliwe, terapia powinna opierać się na informacjach epidemiologicznych i danych dotyczących lekowrażliwości patogenów docelowych na poziomie lokalnym/regionalnym.
Przed użyciem wstrząsnąć butelkę. Podczas wstrzykiwania weterynaryjnego produktu leczniczego postępować zgodnie z przyjętymi zasadami aseptyki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe powinny stosować weterynaryjny produkt leczniczy z zachowaniem ostrożności.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Nie dotyczy.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Bydło, świnie:

Rzadko (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):	Reakcja alergiczna
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):	Ból lub stwardnienie w miejscu iniekcji Grzybicze zakażenie skóry[1] Obniżenie odporności[1,2]

[1]Możliwe na skutek zbyt długiego podawania.
[2] Okresowe

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża i laktacja:
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty zobojętniające, podobnie jak neomycyna, osłabiają wchłanianie weterynaryjnego produktu leczniczego.
Nie stosować równocześnie z tetracyklinami, erytromycyną i kanamycyną, ponieważ mogą one osłabiać działanie weterynaryjnego produktu leczniczego.
Weterynaryjny produkt leczniczy nasila działanie produktów kuraromimetycznych oraz nefrotoksyczne działanie cefalosporyn.

3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie domięśniowe.
Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Podawać drogą głębokiej iniekcji domięśniowej w dawce 10 ml/100 kg m.c., co odpowiada 10 mg/kg m.c. amoksycyliny i 25 000 j.m./kg m.c. siarczanu kolistyny. Zalecaną dawkę należy podawać jeden lub dwa razy dziennie przez 3 – 5 dni, niezależnie od gatunku.

3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

W zalecanych dawkach weterynaryjny produkt leczniczy jest dobrze tolerowany.
Przedawkowanie kolistyny może powodować blok nerkowy z martwicą kanalikową: w takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 24 dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie:
Tkanki jadalne: 10 dni.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet: QJ01RA01

4.2 Dane farmakodynamiczne

Amoksycylina jest półsyntetyczną pochodną penicyliny o szerokim zakresie działania bakteriobójczego w stosunku do bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Wrażliwa na penicylinazę. Jej mechanizm działania polega na hamowaniu procesu transpeptydacji niezbędnego do realizacji ostatniego etapu biosyntezy ściany komórki bakteryjnej.
Kolistyna jest antybiotykiem polipeptydowym z grupy polimiksyn. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne, w tym *E. coli*, *Salmonella* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Haemophilus* spp., *Pseudomonas* spp., *Shigella* spp. i *Bordetella* spp. Jej mechanizm działania polega na uszkadzaniu błony cytoplazmatycznej bakterii.
Połączenie amoksycyliny i kolistyny wykazuje działanie przeciwbakteryjne względem bakterii Gram-dodatnich (w tym *Actinomyces* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp. i *Streptococcus* spp.),

bakterii Gram-ujemnych (w tym *Actinobacillus* spp., *Bordetella bronchiseptica, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella pneumoniae, Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella* spp. i *Shigella* spp.) oraz *Leptospira* spp.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Amoksycylina po podaniu pozajelitowym łączy się z białkami osocza i bardzo szybko osiąga stężenie terapeutyczne w tkankach wykazując szczególne powinowactwo do płuc i błon śluzowych oskrzeli. Słabo przenika przez błony biologiczne, przenika jednak przez barierę łożyska i w małej ilości do mleka. Wydalana jest w postaci niezmienionej, głównie przez nerki i w niewielkim stopniu wraz z żółcią i mlekiem.
Maksymalne stężenie amoksycyliny w surowicy krwi u bydła, któremu podawano ją domięśniowo w dawce 13 mg/kg m.c. (C_{max}) wynosiło 2,70 ± 1,15 μg/ml. Takie stężenie utrzymywało się przez czas (T_{max}) 1,37 ± 0,46 godziny, a okres półtrwania w fazie eliminacji ($t_{1/2}$) wynosił 9,00 ± 0,50 godziny. Całkowity klirens wynosił 6 ± 0,1 ml/min./kg po dożylnym podaniu w dawce 3,83 mg/kg m.c.
Kolistyna po podaniu pozajelitowym słabo łączy się z białkami krwi szybko osiągając wysokie stężenie w tkankach, a stosunkowo niskie w płynach ustrojowych i mleku. Słabo przenika przez barierę łożyska i do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest dobrze tolerowana przez organizm. W postaci aktywnej jest szybko wydalana przez nerki (około 80 %).
U cieląt, którym podawano kolistynę domięśniowo w dawce 5 mg/kg m.c. maksymalne stężenie w surowicy krwi (C_{max}) obserwowano po upływie 1 godziny i wynosiło ono 5 μg/ml, a okres półtrwania w fazie eliminacji ($t_{1/2}$) wynosił 4-5 godzin.
U prosiąt, którym podawano domięśniowo kolistynę w dawce 10 mg/kg m.c. przez 5 dni nie obserwowano działania toksycznego. Po podaniu kolistyny w dawce 2,5 i 5,0 mg/kg m.c. maksymalne stężenie w surowicy osiągało wartości odpowiednio 3,73 ± 0,28 μg/ml oraz 6,40 ± 0,18 μg/ml w czasie 32 i 34 minut. Dla dawki 2.5 mg/kg m.c. okres półtrwania ($t_{1/2}$ beta) wynosił 256 ± 14 min a biodostępność 95,94 %, zaś w przypadku dawki 5,0 mg/kg m.c. wartości te wynosiły odpowiednio 264 ± 29 min oraz 88,45 %.
Stężenie weterynaryjnego produktu leczniczego w surowicy krwi określano w badaniach na cielętach po domięśniowym podawaniu w dawce 1 ml/10 kg m.c. przez 3 dni. W dwie godziny po ostatnim podaniu maksymalne stężenie w surowicy wynosiło 2 μg/ml amoksycyliny i 10,5 μg/ml kolistyny. Stężenia te spadały do poziomu połowy podanych wartości po upływie 6 – 8 godzin.
Weterynaryjny produkt leczniczy umożliwia skuteczną terapię ogólnoustrojową, gdyż dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych, amoksycyliny i kolistyny, zmniejszone jest ryzyko wystąpienia oporności, zwłaszcza w przypadku bakterii Gram-dodatnich.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 7 dni.

5.3 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
Przechowywać w suchym miejscu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki wykonane ze szkła krzemionkowego typu I zamknięte korkiem z elastomeru zabezpieczonym kołnierzem aluminiowym, pakowane pojedynczo w tekturowe pudełka.

Wielkości opakowań:
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 50 ml.
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 100 ml.
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

FATRO S.p.A.

7. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1098/00

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05/01/2001.

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2026

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).