*[Version 9.1,11/2024]*

**ANEKS I**

**CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

## 1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ECOMECTIN 18,7 mg/g pasta doustna dla koni.

## 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy g zawiera:

**Substancje czynne:**
Iwermektyna 18,7 mg

**Substancje pomocnicze:**

| **Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników** | **Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego.** |
|---|---|
| Tytanu dwutlenek (E171) | 20 mg |
| Olej rycynowy, uwodorniony | |
| Hydroksypropyloceluloza GF | |
| Glikol propylenowy | |

Biała, homogenna pasta

## 3. DANE KLINICZNE

### 3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Konie.

### 3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie infekcji wywołanych przez nicienie lub stawonogi, takie jak:

Duże słupkowce:
*Strongylus vulgaris* (postacie dorosłe i stadia larwalne L4 bytujące w naczyniach krwionośnych)
*Strongylus edentatus* (postacie dorosłe i stadia larwalne L4 bytujące w tkankach)
*Strongylus equinus* (postacie dorosłe)

Małe słupkowce (w tym szczepy oporne na benzimidazol):
*Cyathostomum* spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)
*Cylicocyclus* spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)
*Cylicodontophorus* spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)
*Cylicostephanus* spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)
*Gyalocephalus* spp. (postacie dorosłe i osobniki w stadium larwalnym L4 bytujące w świetle przewodu pokarmowego)

Glisty:

*Parascaris equorum* (osobniki w stadium larwalnym L5 bytujące w świetle przewodu pokarmowego i postacie dorosłe)

Owsiki:
*Oxyuris equi* (stadia larwalne L4 i postacie dorosłe)

Nicienie:
*Onchocerca* spp. (mikrofilarie)

Gzy:
*Gasterophilus* spp. (stadia bytujące w jamie ustnej i żołądku)

### 3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u psów i kotów, ponieważ mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane.

### 3.4 Specjalne ostrzeżenia

U niektórych koni z silną inwazją mikrofilarii *Onchocerca* spp., po podaniu produktu, występował obrzęk i świąd. Reakcje te są najprawdopodobniej wynikiem masowego ginięcia mikrofilarii. Objawy te ustępują w ciągu kilku dni, jednakże wskazane może być zastosowanie leczenia objawowego.
Należy unikać stosowania następujących praktyk, które powodują wzrost ryzyka narastania oporności, oraz mogą w ostateczności powodować nieskuteczność terapii:

- zbyt częste i powtarzane stosowanie produktów przeciwpasożytniczych z tej samej grupy przez dłuższy czas,
- podawanie zbyt niskich dawek, co może być spowodowane niedokładnym określeniem masy ciała zwierzęcia, lub nieprawidłowym podaniem weterynaryjnego produktu leczniczego.

Przypadki, w których podejrzewa się oporność na produkty przeciwpasożytnicze powinny być dalej diagnozowane przy użyciu odpowiednich testów (np. testu redukcji liczby jaj wydalanych z kałem). Kiedy wynik testu/ów potwierdza oporność na dany produkt, należy zastosować inny preparat, tj. produkt należący do innej grupy i mający inny mechanizm działania.

W celu uzyskania właściwej kontroli pasożytów oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa rozwoju oporności na leki przeciwrobacze należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii dotyczącej właściwych programów dawkowania i zarządzania stadem. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że weterynaryjny produkt leczniczy jest nieskuteczny, właścicielowi zwierzęcia zaleca się zasięgnięcie porady lekarza weterynarii.

Notowano wystąpienie oporności na iwermektynę w przypadku zakażeń *Parascaris equorum.* Dlatego stosowanie tego weterynaryjnego produktu leczniczego powinno być oparte na lokalnych danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości nicieni oraz uwzględniając informacje dotyczące ograniczania narastania oporności na leki przeciwpasożytnicze.

### 3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Ponieważ iwermektyna silnie wiąże się z białkami osocza należy zwrócić szczególną uwagę stosując ją u zwierząt chorych, lub których stan odżywienia jest powiązany z niskim stężeniem białek osocza.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego nie należy palić, jeść ani pić.
Po zastosowaniu weterynaryjnego produktu leczniczego należy umyć ręce.

Ten weterynaryjny produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry i oczu. W związku z tym użytkownik powinien unikać kontaktu weterynaryjnego produktu leczniczego ze skórą i oczami.
Po przypadkowym kontakcie należy przemyć skórę lub oczy dużą ilością wody. Po przypadkowym połknięciu lub przedostaniu się do oka, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:

Nie dotyczy.

Inne środki ostrożności:

Należy przestrzegać środków ostrożności, aby psy i/lub koty nie miały dostępu do pozostałości pasty lub zużytego opakowania ze względu na możliwość występowania działań niepożądanych związanych z toksycznością iwermektyny.

Ten weterynaryjny produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u koni. Stężenie iwermektyny w tym produkcie może mieć negatywny wpływ na koty, psy (w szczególności owczarki szkockie collie, owczarki staroangielskie oraz spokrewnione z nimi rasy lub krzyżówki), jak również na żółwie morskie i lądowe.
Reakcje te mogą wystąpić w przypadku spożycia przez zwierzęta pozostałości pasty lub dostępu do zużytych strzykawek.

### 3.6 Zdarzenia niepożądane

Konie:

Nieznane.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej**.**

### 3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża i laktacja:
Może być stosowany podczas ciąży lub laktacji.

### 3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Iwermektyna nasila działanie GABA agonistów.

### 3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie doustne.
Dawkowanie:
Jedna podziałka strzykawki/100 kg masy ciała (w oparciu o zalecane dawkowanie 0,2 mg iwermektyny na kg masy ciała).
Strzykawka zawierająca 6,42 g pasty pozwala na odrobaczenie konia o masie 600 kg. Strzykawka zawierająca 7,49 g pasty pozwala na odrobaczenie konia o masie 700 kg.

Sposób podania:
Pasta podawana jest doustnie.
Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia. Jama

ustna zwierzęcia powinna być wolna od pokarmu, aby ułatwić połykanie. Należy przekręcić pokrętło miernika na tłoku strzykawki, odpowiednio do dawki uwzględniającej masę ciała konia. Koniec cylindra strzykawki należy wsunąć w przestrzeń międzyzębową (przerwa pomiędzy przednimi i tylnymi zębami) i umieścić pastę u nasady języka. Wsunąć tłok strzykawki do samego końca, umieszczając pastę u nasady języka. Natychmiast po podaniu należy podnieść głowę konia na kilka sekund, aby zapewnić połknięcie.

### 3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Po podaniu dawki większej niż 1,8 mg/kg (9- krotna wartość dawki zalecanej), obserwowano łagodne i przemijające objawy (opóźniona reakcja źrenicy na światło i depresja). Inne objawy, obserwowane po podaniu większych dawek, obejmowały: nadmierne rozszerzenie źrenicy, ataksję, drżenie, otępienie, śpiączkę oraz śmierć zwierzęcia. Mniej ciężkie objawy miały charakter przejściowy. Chociaż nie są znane specyficzne odtrutki, korzystne może być leczenie objawowe.

### 3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

### 3.12 Okresy karencji

Tkanki jadalne: 34 dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

## 4. DANE FARMAKOLOGICZNE

### 4.1 Kod ATCvet:

QP54AA01

### 4.2 Dane farmakodynamiczne

Iwermektyna należy do klasy makrocyklicznych laktonów endektocydów. Związki należące do tej klasy wiążą się selektywnie i z dużym powinowactwem z receptorami kanałów jonowych bramkowanych glutaminianem, w komórkach nerwowych i mięśniowych bezkręgowców. Prowadzi to do wzrostu przepuszczalności błony komórkowej na jony chlorkowe z hiperpolaryzacją komórek nerwowych lub mięśniowych, co skutkuje paraliżem i śmiercią nicieni oraz insektów. Związki należące do tej klasy mogą również oddziaływać na kanały chlorkowe bramkowane przez inne ligandy, takie jak te bramkowane przez neuroprzekaźnik kwas gamma-aminomasłowym (GABA).

Margines bezpieczeństwa dla związków tej klasy związany jest z brakiem u ssaków chlorkowych kanałów jonowych bramkowanych glutaminianem. Makrocykliczne laktony mają małe powinowactwo do innych chlorkowych kanałów jonowych bramkowanych ligandem oraz nie przechodzą łatwo przez barierę krew-mózg.

### 4.3 Dane farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym zalecanej dawki u koni, średnia wartość maksymalnego stężenia w osoczu ($C_{max}$) wynosząca 33 ng/ml była osiągana w ciągu 24 godzin.

Po podaniu iwermektyna jest dobrze wchłaniana do krążenia ogólnoustrojowego. Jedynie około 2% produktu wydalane jest z moczem, główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem.

Iwermektyna łatwo przenika do mleka.

## 5. DANE FARMACEUTYCZNE

### 5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

### 5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

### 5.3 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

### 5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Polietylenowa strzykawka z podziałką do odmierzania dawki w zewnętrznym pudełku tekturowym.

Wielkość opakowania:
Pudełko tekturowe zawierające 1 strzykawkę z 6,42 g pasty
Pudełko tekturowe zawierające 1 strzykawkę z 7,49 g pasty
Pudełko tekturowe zawierające 50 strzykawek po 7,49 g pasty

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

### 5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Weterynaryjny produkt leczniczy nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ iwermektyna jest BARDZO NIEBEZPIECZNA DLA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH.
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

## 6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ACME DRUGS s.r.l.

## 7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2326/14

## 8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21/01/2014

## 9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2026

## 10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).