[Version 9,10/2021] corr. 11/2022

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

GEOMYCIN F 1 g intrauterine tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Vsaka tableta vsebuje:

Učinkovina:
oksitetraciklinijev klorid 1 g

Pomožne snovi:

Kakovostna sestava pomožnih snovi in drugih sestavin
koruzni škrob
vinska kislina
natrijev hidrogenkarbonat
želatina
polioksietilen cetil eter
dietanolamid kokosove maščobne kisline
magnezijev stearat
smukec

Rumene podolgovate tablete.

3. KLINIČNI PODATKI

3.1 Ciljne živalske vrste

Krave, kobile, plemenske svinje, ovce in koze.

3.2 Indikacije za uporabo za vsako ciljno živalsko vrsto

Preprečevanje in zdravljenje puerperalnih infekcij genitalnih organov pri kravah, kobilah, plemenskih svinjah, ovcah in kozah, povzročenih z mikroorganizmi, občutljivimi na oksitetraciklin.
Intrauterina uporaba zdravila je posebno indicirana pri:
- zaostajanju posteljice (*retentio secundinarium*),
- endometritisu (*endometritis*),
- puerperalni piometri (*pyometra puerperalis*),
- zvijanju in prolapsu maternice (*inversio et prolapsus uteri*),
- splavu, težavnih porodih, poškodbah rodil,
- embriotomiji,
- infekciji s *Campylobacter fetus* (prej *Vibrio fetus*).

3.3 Kontraindikacije

Ne uporabite v primerih preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

3.4 Posebna opozorila

Jih ni.

3.5 Posebni previdnostni ukrepi pri uporabi

Posebni previdnostni ukrepi za varno uporabo pri ciljnih živalskih vrstah:

Priložena majhna tableta silikagela je namenjena odvzemu vlage v opremi in ni za uporabo. Tega zdravila se živalim ne sme dajati peroralno. Pri vstavljanju intrauterinih tablet je potrebna previdnost, da se ne povzroči dodatne infekcije. Pred dajanjem si je treba s toplo vodo in milom do ramen umiti roke, prav tako je treba umiti zunanje dele in okolico spolnih organov pri živalih.
Uporabi se lahko tudi čiste porodniške rokavice.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Po uporabi si je treba umiti roke.

Posebni previdnostni ukrepi za varovanje okolja:

Ni smiselno.

3.6 Neželeni dogodki

Krave, kobile, plemenske svinje, ovce in koze:
Niso znani.

Poročanje o neželenih dogodkih je pomembno, saj omogoča stalno spremljanje varnosti zdravila. Poročila je treba poslati, po možnosti preko veterinarja, bodisi imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, bodisi pristojnemu nacionalnemu organu prek nacionalnega sistema za poročanje. Glejte tudi navodilo za uporabo za ustrezne kontaktne podatke.

3.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Brejost:
Ne uporabite v celotnem obdobju brejosti.

Laktacija:
Lahko se uporablja v obdobju laktacije.

3.8 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Niso znane.

3.9 Poti uporabe in odmerjanje

Intrauterina uporaba.
Intrauterino tableto potisnite celo v uterus (kravam, kobilam). Če je maternični vrat nezadostno odprt ali rodila preozka, npr. pri plemenskih svinjah, tableto pred vnosom zdrobite.
Za profilakso vstavite 1 tableto, za zdravljenje pa 1 do 2.
Pri hudih stanjih ponovite zdravljenje po 48 urah.

Če v maternici ni tekoče vsebine ali je ni zadosti, lahko tableta lokalno draži. V takih primerih je treba vanjo pred vstavljanjem tablete s sterilnim katetrom intrauterino infundirati 200 do 400 ml čiste prekuhane vode.
Kadar je maternica polna tekoče vsebine, je slednjo treba pred intrauterinim vstavljanjem tablete odstraniti.

3.10 Simptomi prevelikega odmerjanja (ter morebitni ustrezni nujni ukrepi in protistrupi)

Ni znano.

3.11 Posebne omejitve uporabe in posebni pogoji uporabe, vključno z omejitvami glede

uporabe protimikrobnih zdravil in antiparazitikov, da se omeji tveganje za razvoj odpornosti

Ni smiselno.

3.12 Karenca

Krave: Meso in organi: 10 dni.
Mleko: 4 dni.

Kobile: Meso in organi: 10 dni.
Mleko: 4 dni.

Svinje: Meso in organi: 10 dni.

Ovce: Meso in organi: 10 dni.
Mleko: 4 dni.

Koze: Meso in organi: 10 dni.
Mleko: 4 dni.

4. FARMAKOLOŠKI PODATKI

4.1 Oznaka ATC vet:
QG51AA01.

4.2 Farmakodinamika

Oksitetraciklin je antimikrobna snov, ki jo proizvajajo kulture določenih sevov *Streptomyces rimosus.* Nahaja se v obliki rahlo grenkega, rumenkastega do rjavkastega kristalnega praška brez vonja, ki je zelo težko topen v vodi; zmerno topen v alkoholu; praktično netopen v kloroformu; topen v razredčenih kislinah in bazah.
Oksitetraciklin je antibiotik iz skupine tetraciklinov. V terapevtskih koncentracijah je bakteriostatičen, v višjih koncentracijah pa je lahko baktericiden. Ima širok antimikrobni spekter proti celi vrsti mikroorganizmov, vključno z aerobnimi, anaerobnimi, grampozitivnimi in gramnegativnimi bakterijami, mikoplazmami, rikecijami, klamidijami in nekaterimi protozoji. Dovzetne so vrste streptokokov, stafilokokov, *Pasteurellae, Brucellae* in *Corynebacterium*. Občutljive so mnoge, toda ne vse anaerobne bakterije. Občutljive so spirohete, kot so *Leptospira* spp. in *Borellia burgedorferi*. Mnogo mikoplazmičnih vrst je tudi občutljivih.
Njegova terapevtska serumska koncentracija je 0,3-1,5 mikrogramov/ml. *National committee for Clinical Laboratory Standards* (NCCLS) je predlagal, da naj veljajo za dovzetne tisti organizmi, ki imajo MIC 1,0 mikrogram/ml ali manj, za zmerno dovzetne tisti, ki imajo MIC 2,0 mikrogramov - 8,0 mikrogramov /ml in za odporne tisti, ki imajo MIC večji od 8,0 mikrogramov /ml.
Tetraciklini delujejo predvsem bakteriostatično z oviranjem proteinske sinteze, tako da se vežejo posebej na ribosome 30 S. Preprečujejo dostop aminoacila tRNA do akceptorskega mesta na mRNA-ribosomovem kompleksu. To preprečuje vezavo aminokislin na rastoče peptidne verige. Ta učinek se jasno kaže tudi v celicah sesalcev, čeprav so mikrobne celice selektivno bolj dovzetne zaradi višjih koncentracij, do katerih prihaja.
Tetraciklini so bolj aktivni pri pH 6-6,5.

4.3 Farmakokinetika

a) Absorpcija
Tablete za intrauterino dajanje so hitro topne in oksitetraciklin se hitro absorbira. V stiku s tekočo vsebino maternice se tvori znatna količina pene ogljikovega dioksida, ki se nato razširja po maternični votlini in mehansko odstranjuje patološko vsebino iz maternice, ob istočasni stimulaciji kontrakcij

maternice. Ogljikov dioksid pospešuje vstopanje oksitetraciklina v globlje plasti endometrija.

b) Distribucija
Koncentracije oksitetraciklina v endometriju 12, 24, 48 in 72 ur po intrauterinem dajanju 4 mg/kg so bile nad 4 mikrogramov/g, medtem ko je koncentracija v krvi znašala 0,21 mikrogramov/ml 12 ur po dajanju, 0,12 mikrogramov/ml 24 ur po dajanju, 0,0 mikrogramov/ml 48 ur po dajanju in 0,0 mikrogramov/ml 72 ur po dajanju. Stopnja materničnega izločanja oksitetraciklina 24 ur po intrauterinem dajanju je presegala 4 mikrograme/ml. V mleku je bilo 0,12 mikrogramov/ml; 48 ur po odmerjanju je bila koncentracija v mleku pod mejo merljivosti.

c) Presnova
Samo majhne količine oksitetraciklina se presnavljajo preko jeter v neaktivne metabolite. Večina zdravila se izloča nespremenjena preko ledvičnega in žolčnega sistema.

d) Izločanje
Tetraciklini se neovirano izločajo tako z žolčem, kot tudi z urinom. Koncentracija v žolču je 10 do 20 krat večja kot pa koncentracija v krvi. 60 do 70 % oksitetraciklina se nespremenjeno izloča z urinom. Izločanje preko črevesja je tudi pomembno, navadno znaša 10 do 20 % celo pri parenteralnem odmerjanju. Izloča se tudi z mlekom in slino.

5. FARMACEVTSKI PODATKI

5.1 Glavne inkompatibilnosti

Niso znane.

5.2 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 18 mesecev.

5.3 Posebna navodila za shranjevanje

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

5.4 Vrsta in sestava stične ovojnine

Vsaka intrauterina tableta je pakirana v dvojnem traku iz Al/PE, skupaj z manjšo tableto silikagela, ki ni za uporabo in služi odvzemu vlage.
Vsaka škatla vsebuje 10 intrauterinih tablet.

5.5 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi, ki nastanejo pri uporabi teh zdravil

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke.

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo pri uporabi tega zdravila, je treba odstraniti po sistemu vračanja zdravil v skladu z lokalnimi zahtevami oziroma morebitnimi nacionalnimi sistemi zbiranja, ki se uporabljajo za zadevno zdravilo.

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

GENERA SI d.o.o.

7. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0156/001

8. DATUM PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 15.12.1992

9. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

18.10.2024

10. RAZVRSTITEV ZDRAVIL ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Na veterinarski recept.

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo v zbirki podatkov Unije o zdravilih (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).