ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Mastijet Fort zawiesina dowymieniowa dla bydła

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 8 g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:

Substancje czynne:

Tetracykliny chlorowodorek	200 mg
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu)	250 mg
Bacytracyna	2000 j.m.
Prednizolon	10 mg

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników
Magnezu stearynian
Parafina ciekła lekka

Żółta oleista zawiesina.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło (krowy w okresie laktacji).

3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie klinicznych i podklinicznych zapaleń wymienia u krów w okresie laktacji, wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracyklinę, neomycynę i bacytracynę, między innymi: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus* spp., *Klebsiella* spp.

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować chusteczek do higieny strzyków w przypadku widocznych i niezagojonych ran.

3.4 Specjalne ostrzeżenia

Brak.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego powinno uwzględniać wyniki badania wrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, terapia powinna uwzględniać lokalne (regionalne, poziom fermy) informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości docelowych bakterii. Niewłaściwe stosowanie produktu może zwiększać częstotliwość występowania bakterii opornych na tetracyklinę, bacytracynę lub neomycynę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Osoby uczulone na tetracykliny, neomycynę, bacytracynę i prednizolon powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
Należy umyć ręce po zastosowaniu chusteczek do higieny strzyków. Jeżeli podejrzewa się lub występuje nadwrażliwość na alkohol izopropylowy, należy stosować rękawiczki ochronne.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Nie dotyczy.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Bydło (krowy w okresie laktacji):
Nieznane.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Może być stosowany w okresie laktacji.


3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

3.9 Droga podania i dawkowanie

Zawartość tubostrzykawki dowymieniowej należy wprowadzić do chorej ćwiartki wymienia, po uprzednim dokładnym zdojeniu oraz oczyszczeniu i odkażeniu okolicy ujścia strzyku.
Po podaniu weterynaryjnego produktu leczniczego, wymię należy dokładnie rozmasować.
Jeśli jest to konieczne, zabieg należy powtórzyć po 24 godzinach.

Przed podaniem, należy dokładnie zdoić wymię. Strzyk i ujście kanału strzykowego należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować przy użyciu załączonej chusteczki. Do każdego strzyku należy użyć oddzielnej chusteczki. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia końcówki tubostrzykawki dowymieniowej. Odłamać koniec nasadki i wprowadzić ostrożnie 5 mm końcówki tubostrzykawki dowymieniowej (B) lub usunąć całą nasadkę (C) i wprowadzić ostrożnie całą końcówkę tubostrzykawki dowymieniowej do kanału strzykowego. Podać całą zawartość tubostrzykawki dowymieniowej do ćwiartki wymienia. Rozprowadzić produkt przy pomocy delikatnego masażu strzyku i wymienia.



3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

W trakcie prowadzonych badań oraz stosowania produktu w praktyce klinicznej wykazano bezpieczeństwo wielokrotnego stosowania zalecanej dawki produktu. Nie obserwowano występowania niepożądanych objawów mogących mieć związek z zastosowaniem produktu u krów otrzymujących 2 tubostrzykawki dowymieniowe do naprzeciwległych ćwiartek wymienia po 4 kolejnych udojach (4 x 2 tubostrzykawki dowymieniowe, co 12 godzin). Wykazano dobrą tolerancję produktu u gatunku docelowego.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Tkanki jadalne: 30 dni.
Mleko: 5 dni.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet: QJ51RV01.

4.2 Dane farmakodynamiczne

Zawarte w weterynaryjnym produkcie leczniczym tetracyklina i neomycyna działają na syntezę białek w komórce bakteryjnej.
Tetracyklina powoduje chelatowanie jonów wapniowych i magnezowych (zaburzenie przepuszczalności błony cytoplazmatycznej) oraz uszkadza rybosomy i hamuje wiązanie aminokwasów z RNA (hamowanie biosyntezy białka bakteryjnego i proliferacji komórki bakteryjnej).
Neomycyna zaburzając informację genetyczną m-RNA powoduje syntezę „fałszywych" białek i prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.
Bacytracyna hamuje tworzenie peptydoglikanu ściany komórek bakterii.
Tetracyklina wykazuje głównie działanie bakteriostatyczne, a w większych stężeniach także bakteriobójcze. Neomycyna i bacytracyna działają bakteriobójczo. Prednizolon wykazuje działanie przeciwzapalne.
Tetracyklina wykazuje działanie przeciwko większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Działanie neomycyny skierowane jest głównie przeciwko tlenowym bakteriom Gram-ujemnym. Bacytracyna działa przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, ze szczególnym uwzględnianiem streptokoków. Połączenie trzech antybiotyków wykazuje szerokie spektrum działania przeciwko drobnoustrojom biorącym udział w patogenezie zapaleń gruczołu mlekowego. W warunkach *in- vitro* wykazano działanie synergistyczne antybiotyków zawartych w produkcie Mastijet Fort.
Prednizolon poprzez swoje działanie powoduje zmniejszenie obrzęku gruczołu mlekowego objętego procesem chorobowym.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Po podaniu dowymieniowym weterynaryjnego produktu leczniczego (do dwóch ćwiartek wymienia, po jednej tubostrzykawce dowymieniowej na ćwiartkę, przez 4 kolejne dni), tetracyklina, neomycyna i prednizolon ulegały w nieznacznym stopniu wchłanianiu do krwiobiegu, osiągając niskie stężenie. Bacytracyna osiągała w surowicy poziom poniżej wykrywalności (0,003 IU/ml) w trakcie całego okresu pobierania próbek. Średnie najwyższe stężenia poszczególnych substancji czynnych były następujące: tetracyklina - 0,25 μg/ml, neomycyna - 0,25 μg/ml, prednizolon – 11 ng/ml.
Wyniki prowadzonych badań wykazują, że w przypadku prowadzenia w trakcie terapii udojów, skuteczne koncentracje antybiotyków (MIC) w mleku utrzymują się od 2 (neomycyna i bacytracyna) do 5 (tetracyklina) udojów po ostatnim podaniu produktu.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

5.3 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 °C).
Nie zamrażać.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Tubostrzykawka dowymieniowa z LDPE zawierająca 8 g produktu.
Pudełko tekturowe zawierające 20 tubostrzykawek dowymieniowych w opakowaniu z folii wielowarstwowej (PET/Al/PE) oraz 20 chusteczek do higieny strzyków nasączonych roztworem 70% alkoholu izopropylowego i wody oczyszczonej, pakowanych pojedynczo w saszetki z folii wielowarstwowej (papier/PE/aluminium/żywica jonomerowa).

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

387/97

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/10/1997.

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).